

יולי 2020

## Tramadex® OD 100, 200, 300 Prolonged release tablets

צוות רפואי נכבד,

חברת דקסל בע"מ מבקשת להודיעיכם על עדכון בעלונים לרופא ולצורך של התכשירים  
**טרמדקס® OD 100, 200, 300.**

בהודעה זו מפורטים העדכנים המהווים החומרה במידע הבטיחותי בלבד. למידע מלא, יש לעיין בעלונים העלונים לרופא ולצורך נשלחו לפרסום במאגר התרופות שבאתר משרד הבריאות וניתן לקבלם מודפסים ע"י פניה לבעל הרישום: דקסל בע"מ, רח' דקסל 1, אור עקיבא 3060000, ישראל, טל': 04-6364000.

### הרכב התכשירים:

Each prolonged release tablet contains Tramadol hydrochloride 100mg, 200mg, 300mg respectively.

### התוויה מאושרת:

Treatment of moderate to severe pain

העלון לרופא עודכן בתאריך יולי 2020. להלן העדכנים המהווים החומרה במידע הבטיחותי (מוסמנים באדום):

### **4.4 Special warnings and precautions for use**

#### CYP2D6 metabolism

Tramadol is metabolised by the liver enzyme CYP2D6. If a patient has a deficiency or is completely lacking this enzyme an adequate analgesic effect may not be obtained. Estimates indicate that up to 7% of the Caucasian population may have this deficiency. However, if the patient is an ultra-rapid metaboliser there is a risk of developing side effects of opioid toxicity even at commonly prescribed doses. General symptoms of opioid toxicity include confusion, somnolence, shallow breathing, small pupils, nausea, vomiting, constipation and lack of appetite. In severe cases this may include symptoms of circulatory and respiratory depression, which may be life threatening and very rarely fatal. Estimates of prevalence of ultra-rapid metabolisers in different populations are summarised below:

Population	Prevalence %
African/Ethiopian	29%
African American	3.4% to 6.5%
Asian	1.2% to 2%
Caucasian	3.6% to 6.5%
Greek	6.0%
Hungarian	1.9%
Northern European	1% to 2%

### Post-operative use in children

There have been reports in the published literature that tramadol given post-operatively in children after tonsillectomy and/or adenoidectomy for obstructive sleep apnoea, led to rare, but life threatening adverse events. Extreme caution should be exercised when tramadol is administered to children for post-operative pain relief and should be accompanied by close monitoring for symptoms of opioid toxicity including respiratory depression.

### Children with compromised respiratory function

Tramadol is not recommended for use in children in whom respiratory function might be compromised including neuromuscular disorders, severe cardiac or respiratory conditions, upper respiratory or lung infections, multiple trauma or extensive surgical procedures.

These factors may worsen symptoms of opioid toxicity.

...

### **4.6 Fertility, pregnancy and lactation**

#### Fertility:

No fertility studies have been conducted with Tramadex OD.

#### Pregnancy:

Tramadol should not be used during pregnancy unless clearly necessary. In humans, there is insufficient data available to appropriately assess the safety of tramadol use in pregnant women.

As with other opioid analgesics:

- Tramadol crosses the placental barrier.
- Chronic use of tramadol may induce – at any dosage – a withdrawal syndrome in newborns.
- At the end of pregnancy, high dosages, even for short-term treatment, may induce respiratory depression in the newborn.

Animal studies have not shown any teratogenic effects, but at high doses, foetotoxicity due to maternotoxicity appeared (see section 5.3).

#### Breast Feeding:

Approximately 0.1% of the maternal dose of tramadol is excreted in breast milk. In the immediate post-partum period, for maternal oral daily dosage up to 400 mg, this corresponds to a mean amount of tramadol ingested by breast-fed infants of 3% of the maternal weight-adjusted dosage. For this reason tramadol should not be used during lactation or alternatively, breast-feeding should be discontinued during treatment with tramadol. Discontinuation of breast-feeding is generally not necessary following a single dose of tramadol. If long-term treatment after birth is necessary, breastfeeding is contraindicated (see section 4.3).

...

### **4.8 Undesirable effects**

#### Psychiatric disorders

Rare: hallucinations, confusional state, sleep disturbance, nightmares, anxiety, delirium.

#### Eye disorders

Rare: vision blurred, miosis.

#### Renal and urinary disorders

Rare: micturition problems (dysuria and urinary retention).

...

העלון לצריך עדכן בתאריך יולי 2020. להלן העדכנים המהווים החמרה במידע הבטיחותי (מסומנים באדום):

... **ازהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה**

היעוץ רפואי או ברוקח לפני הטיפול בטרמಡקס OD.

ספר לרופא אם אתה סובל מהתמכרות לתרופה אחרת, נמצא טיפול גמilia מתרופה אחרת או שיש לך תלות בתרופה אחרת. תרופה זו עלולה לגרום לתלות نفسית או פיזית (התמכרות) בשימוש לטוויה ארוך. **במטופלים עם נטייה להתמכרות לתרופות, יש להשתמש בתרופה זו רק לפרק זמן קצרים מאוד וחתה השגחה רפואית קפדינית.**

טרמડול עבר מטבוליזם (חילוף חומרים) בכבד באמצעות אנזים. חלק מהאנזים קיימים שוניםiban זה אשר יכול להשפיע עליהם 다르יכם שונות. חלק מהאנזים יתכן שישיכר הכאב לא יהיה מספק, ולהקלקם יותר סיכוי גבוה יותר לחותות תופעות לוואי חמורות. אם אתה מבחין באחת מתופעות הלועאי הבאות, הפסיק את השימוש בתרופה ופנה מיד לקבالت עזרה רפואית: נשימה איטית או שטחית, הבלבול, ישנוונות, אישונות קטנים, בחילה או הקאה, עצירות, חוסר תיאבו.

... **ילדים ומתבגרים**

השימוש בתרופה זו אינו מומלץ ילדים מתחת לגיל 14.

שימוש ילדים עם בעיות נשימה: טרמડול אינו מומלץ לשימוש ילדים עם בעיות נשימה מכיוון שהתרסמים של הרעלת טרמડול יכולים להיות חמורים יותר ילדים אלו.

תגובהות בין תרופתיות

אם אתה לוקח, אם לך תרופה אחרת עשויה לך חותה, **תרופות אחרות כולן תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה**, ספר על כך לרופא או לרוקח. במקרהך אם אתה לוקח את התרופות הבאות, **מכיוון שעולות להיות תגובה בין תרופתיות עם טרמಡקס OD:**

- קרבמאצפין (משמש לטיפול באפילפסיה)
- בופרנורפין, נלבונפין, פנטזוצין (משככי כאבים אחרים)
- אלכוהול
- נלטרקוזון (משמש לטיפול בגמilia מאלכוהול או מסמים)

תרופה זו עלולה לגרום לפרכויסים במינונים טיפוליים ובמיוחד כאשר נלקחת במינונים גבוהים ובשילוב עם תרופות אחרות הכוללות:

- בופורפין (משמש לטיפול בהפסקת עישון).
- מפלוקווין (טיפול במלריה).

הסיכון לתופעות לוואי עולה אם:

- אתה נוטל תרופות העולות לגרום לעוויות (התקפי פרכויסים), כגון נוגדי דיכאון או אנט-פסיכוטיים מסוימים. **הסיכון להתקף עשוי לעלות אם אתה נוטל טרמಡקס OD בו זמנית.** הרופא יאמר לך אם טרמಡקס OD מתאים לך.
- אתה נוטל נוגדי דיכאון מסוימים. **טרמಡקס OD** עשוי להגיב עם תרופות אלו ואתנה עשוי לחותות תסמינים כגון: התכווצויות שריריים בלתי רצוניות וקצביות, כולל שרירים השולטים על תנועת העיניים, אי שקט, הזעה מוגברת, רעד, רפלקסים מוגזרים, מתח מוגבר בשරירים, טמפרטורת גוף מעל 38°C.

... **הירין, הנקה ופוריות**

אין להשתמש בתרופה אם אתה בהירין אלא אם זה הכרחי לחלווטין.

אם אתה בהירין או מניקה, חושבת שאתה עשוי להיות בהירין או מתכוננת להיכנס להירין, היועצי לרופא או ברוקח לפני השימוש בתרופה.

טרמડול מופרש להלב אם. על כן, אין ליטול **טרמಡקס OD** יותר מפעם אחת במהלך ההנקה. או לחילופין, אם את נוטלת **טרמಡקס OD** יותר מפעם אחת, عليك להפסיק להנקה.

היוועץ ברופא או ברוקח לפני שימוש בתרופה כלשהי.

#### נהיגה ושימוש במכונות

היוועץ ברופא או ברוקח אם אין בטוח אם זה בטיחותי עבורך לנוכח בזמן נטילת התרופה.

#### 3. כיצד תשתמש בתרופה?

**מטופלים קשישים (מעל גיל 75)** – **במטופלים קשישים (מעל גיל 75)** הפרשת טרמડול מהגוף עשויה להיות מעוכבת. אם זה נכון לגביך, הרופא עשוי להמליץ על הארכת המרווחים בין המנות.

אם אתה מפסיק את נטילת התרופה אין להפסיק לחתת את התרופה בפתרונות מבל שהרופא הורה לך על כן. אם ברצונך להפסיק לשימוש בתרופה, היוועץ תחילת ברופא, במילויו אם השתמשת בתרופה לתקופה ארוכה. הרופא שלך ייעז לך איך ומתי להפסיק, זה יכול להיות באמצעות הורדת המינון בהדרגה כדי להפחית את האפשרות לפתח תופעות לוואי (تسمיני ג밀יה).

לעתים נדירות, כאשר חלק מהמטופלים מפסיקים לחתת טרמדקס OD לאחר שימוש ארוך טווח, הם סובלים מתסמני גAMILIA. הם עלולים לסבול מהתופעות הבאות: אי שקט, חרדה, עצבנות או רעד, היפראקטיביות וקושי להירדם.

תופעות אלו בדרך כלל נעלמות תוך מספר ימים. ספר לרופא בהופעת תסמינים אלו.

#### 4. תופעות לוואי

כמו בכל תרופה, השימוש בטרמדקס OD עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשימת תופעות הלואן. יתכן שלא תסבול מאף אחת מהן.

**כל התופעות עשויה לגרום לתגובה אלרגיות, אך תשובות אלרגיות חמורות הן נדירות מאוד.** פנה לרופא מיד בהופעה פתאומית של צפיפות בנשימה, קשי נשימה, התנפחות העפעפים, הפנים או השפתיים, פריחה או גרד (בעיקר אם ההשפעה על כל הגוף).

**תופעות לוואי שכיחות** (תופעות שמופיעות ב 10-100 משתמשים מתוך 100):

- עצירות
- הזעה
- יובש בפה
- כאב ראש
- הקאה
- עייפות
- נמנום

**תופעות לוואי נדירות** (תופעות שמופיעות ב 10-10,000 משתמשים מתוך 10,000):

- חולשת שרירים
- שינוים בתאIRON
- חוסר תחושה, גרד או תחושת עקצוץ, רעד
- קצב לב או נשימה איטיים
- טשטוש ראייה
- קשיים במתן שתן
- שינוים במצב הרוח (כגון תחושת שמחה בלתי רגילה)
- שינוים בפעולות (כגון ירידה בפעולות) ושינויים בחשיבותה
- הזריות (ראיות או שמיות דברים)
- הבלבול
- הפרעות שינה, סיוטי לילה

- **תగובות אלרגיות**
- **החומרת אסתמה**
- **תלות בתרופה (התמכרות או תלות בתרופה זו) עלולה לגרום בהפסקת הטיפול בפתאומיות, תסמיini גמילה יכולם להופיע (ראה בסעיף 3 "אם אתה מפסיק את נטילת התרופה").**
- **התקפים אפילפטיים**
- **עליה באנדמי כבד במספר מקריםבודדים התכווצות אישונים (מיוזיס)**
- **בלבול שגלי וירידה במזдуות (דלירים)**
- **חרדה**
- ...