

لقيترا 5 ملغ

لقيترا 10 ملغ

لقيترا 20 ملغ

أقراص مطلية



يحتوي كل قرص مطلية على:

فاريدينافيل (كـ هيدروكلوريد تريبيدرات) 5 ملغ أو 10 ملغ أو 20 ملغ

Vardenafil [as hydrochloride trihydrate] 5 mg or 10 mg or 20 mg

المواد غير الفعالة ومواد التحسس: أنظر الفقرة 6 «معلومات إضافية».

اقرأ النشرة بتمعن حتى نهايتها قبل إستعمال الدواء. تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء. إذا توفرت لديك أسلطة إضافية، راجع الطبيب أو الصيدلي.

وصف هذا الدواء لعلاج لا تطهيره للأخرين. فهو قد يضرهم حتى ولو بدا ذلك أن حالتهم الطبية مشابهة لحالتك.

(1) لأي غرض مخصوص الدواء؟

لقيترا مخصوص لعلاج العجز الجنسي (erectile dysfunction) لدى الرجال.

إن واحد من عشرة رجال بالغين على الأقل يعاني أحياناً من العجز الجنسي، أي، صعوبة في تحقيق أو الحفاظ على انتصاب القضيب التناسلي. قد يعود ذلك لعوامل جسدية أو نفسية، أو مزيج لكلا العواملين. على أي حال، بسبب حدوث تغيرات في العضلات وفي الأوعية الدموية، لا يصل ما يكفي من الدم إلى العضو التناسلي وذلك لجعله قاسياً وباقئاً قاسياً.

الفصيلة العلاجية: ينتهي لقيترا إلى فصيلة الأدوية المسماة مثبطات الإنزيم PDE5.

إن تثبيط الإنزيم يؤدي إلى إرخاء العضلات في جدار الأوعية الدموية للعضو التناسلي، تاثير الذي يمكن من جريان الدم إلى العضو التناسلي وبذلك يتحقق انتصاب القضيب.

يعلم لقيترا فقط عند تواجد إثارة جنسية، وهو يمكن بقاء القضيب منتصب لزمن كافي من أجل القيام بإتصال جنسي مقنع.

(2) قبل إستعمال الدواء إذا:

لا يجوز إستعمال الدواء إذا:

• كنت حساساً (الergic) لل المادة الغالبة فاريدينافيل أو لكل واحد من المركبات الإضافية التي يحتويها الدواء. لقائمة المركبات غير الفعالة، انظر الفقرة 6 «معلومات إضافية».

• كنت تتناول أدوية التي تحتوي نترات، مثل چايسيريل تري نيترات لعلاج الذبحة الصدرية، أو مانحات أوكسيد النيتروز مثل أميل نيتريت. إن تناول هذه الأدوية مع

لقيترا قد يؤثر بشكل جيد على ضغط دمك.

• كنت تتناول ريتونافير أو إينديانيافير، أو دورة تيروزونيل أو إينتراكونازول، أدوية مضادة للفطريات.

• تجاوزت عمر 75 سنة وتتناول كيتوكونازول أو إينتراكونازول، أدوية مضادة للفطريات.

• كنت تعاني من مشكلة خطيرة في القلب أو في الكبد.

• كنت تخضع للإبلاط الكلوية.

• اجتررت مؤخراً سكتة أو توبة قلبية (خلال النصف سنة الأخيرة).

• كنت تعاني من حالة يشتراك فيها فقدان للرؤية نتيجة تضرر عصب الرؤية، وهو يمكن بقاء القضيب منتصب لزمن كافي من أجل القيام بإتصال جنسي مقنع.

non-arteritic ischemic optic neuropathy (NAION) optic neuropathy.

• كنت تتناول روبيسيجوات، يستعمل هذا الدواء لعلاج ارتفاع ضغط الدم الشرياني (أي، ارتفاع ضغط الدم في الرئتين) وإرتفاع ضغط الدم في الرئتين (HIV).

لحوادث تختفي إنصاصمية مزمنة (أي، ارتفاع ضغط الدم الرئوي، الذي يعتبر ثانوي لخثرة دموية). مثلاً لقيترا، تزيد من تأثيرات

المستحضر روبيسيجوات في تخفيف ضغط الدم. بلغ طبيبك إذا كنت تتناول روبيسيجوات أو إذا لم تكن واثقاً.

تحذيرات خاصة تتعلق بإستعمال الدواء:

حدث مع الطبيب أو الصيدلي قبل تناول لقيترا.

• قيل تناول لقيترا، إحدى طبيبيك إذا:

• وجدت لديك مشكلة في القلب، إن القيام بعلاقات جنسية قد يكون خطيراً بالنسبة لك.

• كنت تعاني من نقص غير منتظم (اضطراب في نظم القلب) أو من أمراض قلبية أو الشفتين وضيق في التنفس.

• وجدت لديك حالة حساسية تؤثر على شكل العضو التناسلي. يشمل هذا الأمر حالات تسمى تزويد غير كافي من الدم، المعروفة باسم fibrosis priapism (ارتفاع ضغط الدم في الرئتين) وإرتفاع ضغط الدم في الرئتين (الان�性). هذه تشمل فقر الدم المنجل، الورم النخاعي المتعدد ولوكيميها.

• وجد لديك مرض الذي قد يسبب حدوث إنتصاب غير ذاتي (ارتفاع ضغط الدم في الرئتين) وإرتفاع ضغط الدم في الرئتين (ECG).

• كنت تعاني من قرحة في المعدة (تسمى أيضاً قرحة معدية أو قرحة هضمية).

• وجدت مسكنة وتنبب السنجق الإنتصابي)، بما في ذلك لقيترا 10 ملغ أقراص ذوبانية (أنترايزنام)، توقف عن تناول لقيترا ووجه حالاً إلى طبيبك.

• كنت تعاني من تدلي مفاجئ في الرؤية أو من فقدان مفاجئ للرؤية، توقف عن تناول لقيترا ووجه حالاً إلى طبيبك.

• الأطفال والمرأهقون:

لقيترا غير مخصوص لاستعمال لدى الأطفال أو مراهقين دون عمر 18 سنة.

• التداخلات/التفاعلات بين الأدوية:

إذا كنت تتناول، أو إذا تناولت مؤخراً، أدوية أخرى، بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبية وإضافات غذائية، إحدى للطبيب أو الصيدلي عن ذلك. يجب إبلاغ الطبيب أو الصيدلي بالأشخاص إذا كنت تتناول.

• تحدث مع الطبيب بدون تناول لقيترا.

• دواء لعلاج اضطرابات نظم القلب (الان�性) مثل كيندين، بروكایتياميد، أميدورون أو سوتالول.

• ريتونافير أو إينديانيافير، أدوية لعلاج الـ HIV (الإيدز). تحدث مع الطبيب بدون تناول لقيترا.

• كيتوكونازول أو إينتراكونازول، أدوية مضادة للفطريات.

• إريثروميسين أو كاربوليستات، مضادات حيوية من نوع الماكروبلات.

• حجاجات ألفا، نوع دواء يستعمل لعلاج ارتفاع ضغط الدم وتضخم البروستات (متلازمة البروستات الحميد).

• روبيسيجوات لعلاج أنواع معينة من ارتفاع ضغط الدم الرئوي - لا يجوز تناول لقيترا، لتفاصيل إضافية، انظر الفقرة 2 «لا يجوز إستعمال الدواء إذا».

لا يجوز إستعمال لقيترا أقراص مطلية بمشاركة أية علاج آخر للعجز الجنسي، بما في ذلك لقيترا 10 ملغ أقراص ذوبانية.

• إستعمال الدواء والطعام:

بالإمكان تناول لقيترا مع أو بدون طعام، لكن يفضل ليس بعد وجبة ثقيلة أو غنية بالدهن، لأن ذلك من شأنه أن يؤخر من تأثير الدواء.

لا شرب حصير الچريپ فروت عند إستعمال لقيترا، لأن ذلك قد يعرقل من التأثير الإعتمادي للدواء.

• استعمال الدواء واستهلاك الكحول:

يمكن أن يفاجأ المشروب الكحولي الصعبويات في إنتصاب العضو الذكري.

• الحمل والإبراض:

لقيترا غير مخصوص لاستعمال من قبل النساء.

• السياقة واستعمال المركبات:

قد يسبّب لقيترا إلى بعض الأشخاص الشعور بدوار أو يؤثر على الرؤية لديهم. إذا كنت تشعر بدوار أو في حال تأثر روئتك بعد تناول لقيترا، فلا تقوم بالقيادة ولا تشغّل آية أجهزة أو آية مراكين.

• كيفية إستعمال الدواء؟

يجب دائماً إستعمال المستحضر حسب تعليمات الطبيب. عليك الاستفهام من الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكن واثقاً بخصوص المقدار الدوائي وطريقة العلاج.

المقدار الدوائي وطريقة العلاج يحددان من قبل الطبيب فقط. المقدار الدوائي الموصى به عادة هو 10 ملغ.

يجب تناول قرص واحد حوالي 25 حتى 60 دقيقة قبل ممارسة شفط جنسى.

بساعدة الإبرة الجنسية، من شأنك الوصول للإنتصاب خلال 25 دقيقة حتى 4-5 ساعات بعد تناول لقيترا.

لا يجوز تناول أقراص طبلية من لقيترا مع آية أشكال مقدار دوائي أخرى من لقيترا (مثلاً، لقيترا 10 ملغ أقراص ذوبانية).

لا يجوز تناول لقيترا أكثر من مرة واحدة في اليوم.

إحدى طبيبك إذا كنت تعقدق بأي لقيترا أقوى من اللازم. من الجائز أن يقترح الطبيب الإنفاق إلى شكل مقدار دوائي بديل من لقيترا بعيار دوائي آخر، كامر يتعلق بكمي تأثير على علبه.

لا تتجاوز المقدار الدوائي الموصى به.

طريقة التناول يجب بلع قرص واحد مع كأس من الماء. لا تتوفر معلومات بخصوص السحق/الشطر/المضغ.

إذا تناولت بالخطأ مقداراً دوائياً أكبر علىك مراجعة الطبيب.

إن الرجال الذين يتناولون أكثر مما ينبغي من لقيترا قد يعانون من أعراض جانبية أكثر أو قد يعانون من ألم شديد في الظهر.

إذا تناولت المقدار الدوائي على العتمة، يجب شخيص طابع الدواء والتتأكد من المقدار الدوائي في كل مرة تتناول فيها دواء. ضع النظارات الطبية إذا لزم الأمر ذلك.

إذا توفّرت لديك أسلطة إضافية حول إستعمال الدواء، إستثمر الطبيب أو الصيدلي.

(4) الأعراض الجانبية:

كما بكل دواء، إن إستعمال لقيترا قد يسبب أعراض جانبية عند بعض المستعملين. لا تندهن من قائمة الأعراض الجانبية. من الجائز لا تعاني أي منها.

غالبية الأعراض هي طفيفة أو متقطعة.

توقف عن إستعمال لقيترا وإتصل بطبيبك حالاً إذا كنت تعاني من إنخفاض جزئي، ماجي، مؤقت أو دائم للرؤيا، فقدان الرؤيا، بعين واحدة أو بكتيدهما.

(5) الأعراض الجانبية إضافية:

هناك بخلاف عن إنخفاض مفاجئ في السمع أو فقدان مفاجئ للسمع.

بلغ عن حالات موت مفاجئ، نبض سريع أو متغير، نوبة قلبية، ألم في الصدر، ومشاكل في جريان الدم إلى أجزاء

في الدماغ ونزف في الدماغ وذلك لدى رجال استعملوا فاريدينافيل. غالبية الرجال الذي قالوا من هذه الأعراض الجانبية، عانوا من مشكل في القلب قبل إستعمال هذا

الدواء، لا يمكن التحديد فيما إذا كانت هذه الأحداث متعلقة بشكل مباشر بفاردينافيل.

إن احتمال المعانة على عرض جانبي موصوف بالقول، مثلاً، بـ فاريدينافيل.

أعراض جانبية شائعة جداً (very common): (من شأنها أن تؤثر على أكثر من 1 من بين 10 مستعملين):

(6) صداع:

أعراض جانبية شائعة (common): (من شأنها أن تؤثر على حتى 1 من بين 10 مستعملين):

(7) دوار:**(8) توted:****(9) سيلان:****(10) صعوبات هضمية:****(11) إنتفاخ الأنف:**

أعراض جانبية غير شائعة (uncommon): (من شأنها أن تؤثر على حتى 1 من بين 100 مستعمل):

(12) إضطراب في النوم:**(13) خدر وخال في الشعور بالملمس:****(14) الميل:**

تأثيرات على الرؤيا، إحصار في العين، تأثيرات على رؤيا الألوان، ألم وإنزعاج في العين، حساسية للضوء

طنين في الأذنين، فرقع (دوار توردي)

(15) بيضق النفس:**(16) إيجناق الأنف:**

ارتفاع المحمض (حرقان)، إنتفاخ جدار المعدة (gastritis)، ألم في البطن، إسهال، تقيؤ، غثيان، جفاف الفم

(17) إرتفاع المحمض:

ارتفاع نسب إنزيمات الكبد في الدم لديك

(18) طفح، أحمراء الجلد:

تأثيرات على القلب (مثل نوبة قلبية، تغيرات في نبض القلب أو نوبة صدرية)

(19) ضغط دم مرتفع أو منخفض:

انتصاب مطول لقضيب التناسلي

(20) الشعور بوحكمة عامة:

أعراض جانبية نادرة (rare): (من شأنها أن تؤثر على حتى 1 من بين 1,000 مستعمل):

(21) رد فعل تحسسي:**(22) قلق:****(23) إغماء:****(24) فقدان الذاكرة:****(25) إختناق:****(26) ارتفاع الضغط داخل العين (جلوكونا)، زيادة التمع:**

تأثيرات على القلب (مثل نوبة قلبية، تغيرات في نبض القلب أو نوبة صدرية)

(27) ضغط دم مرتفع أو منخفض:

انتصاب مطول لقضيب التناسلي

(28) حساسية الجلد لضوء الشمس:

انتصاب مؤلم لقضيب التناسلي

(29) ألم في الصدر:

انخفاض مؤقت في جريان الدم إلى أجزاء من الدماغ

(30) ارتفاع المحمض:

أعراض جانبية بارزة (frequency): (أعراض لا يمكن تقييم شيوعها من المعلومات المتوفّرة):

(31) دم في البول (hematuria):

نفخ من العضو التناسلي (نفخ من القضيب الذكري)

(32) وجود دم في السائل المنوي (hematospermia):

موت مفاجئ

(33) نفخ في الدم:

أعراض جانبية بارزة جداً (very rare): (من شأنها أن تؤثر على أقل من 1 من بين 10,000 مستعمل):

إذا ظهر عرض جانبي، إذا تناولت إحدى الأعراض الجانبية، أو عندما تعاني من عرض جانبي لم يذكر في هذه النشرة، عليك إستشارة الطبيب.

بالإمكان تبليغ عن أعراض جانبية لوزارة الصحة بواسطة الضغط على الرابط "تبليغ عن أعراض جانبية عقب علاج دوائي" الموجود على الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة (www.health.gov.il).

العنوان: https://sideeffects.health.gov.il

• **(34) كثافة تخزين الدواء؟**

• تحذير: تجنب التسمم يجحف حفظ هذا الدواء وكل دواءً يكتفى ببرتقالي إلى برتقالي - رمادي، معلمة بـ "BAYER" في جانب واحد وـ "5" في الجانب الثاني.

• تحذير: لقيترا 10 ملغ: أعراض مطالية، متقطعة، باردة، بلون برتقالي إلى برتقالي - رمادي، معلمة بـ "BAYER" في جانب واحد وـ "10" في الجانب الثاني.

• تحذير: لقيترا 20 ملغ: أعراض مطالية، متقطعة، باردة، بلون برتقالي إلى برتقالي - رمادي، معلمة بـ "BAYER" في جانب واحد وـ "20" في الجانب الثاني.

• تتوفر الأعراض ضمن لوبيات (بليستر)، بعلب ذات 4، 8، 12، 45، 45240 قرص.

من الجائز أن تستورك كافة أحجام الملي.

• صاحب الامتياز وعنوانه: باريساني، م.ض، شارع هاشاراش 36، هود هشارون 45240

• اسم المنتج وعنوانه: باير فارما آي.جي، ليفركتون، ألمانيا.

• أقرت وزارة الصحة صحة هذه التغيرة ومحظها وذرخها في أيار 2016 وتم تحديثها بموجب تعليمات وزارة الصحة في شباط 2020.

• رقم سجل الدواء في سجل الأدوية الحكومي في وزارة الصحة:

• لقيترا 5 ملغ: 129 13 30773 00

• لقيترا 10 ملغ: 129 14 30774 00

• لقيترا 20 ملغ: 129 15 30775 00