

كل تحميلاً مهبلية تحتوي على براستيرون (prasterone) بجرعة 6.5 مل.

اقرئي النشرة يعنين حتى نهايتها قبل استعمال الدواء. تختصر هذه النشرة على معلومات ملخصة عن الدواء. إذا كان لديك أسلنة إضافية، توجه إلى

وصف هذا الدواء من أجل علاجك. لا تؤملي باعطائه إلى آخرين. فهو قد يسبب ضرر لمن هنّ حتى إذا بدأوا أن يحالئن الطبيبة ملائمة.

1. لأي غرض مخصوص الدواء؟

يُستخدم إيتراروسا لعلاج ضمور (تقوّف) الفرج والميول لدى النساء بعد سن اليأس الواتي يعاني من اعراض متعددة حتى وخيمة.

الفصيلة العلاجية: هرمونات جنس ومحذلات أخرى لجهاز النساء النسائية.

كيف يعمل إيتراروسا:

يُستعمل إيتراروسا لتنحيف اعراض سن اليأس في الميول مثل الجفاف أو التهيج. تحدث هذه بسبب انخفاض مستوى الإستروجين في جسمك. يحدث

هذا بشكل طبيعي بعد سن اليأس.

يمكن طبقي بجرعات متعددة ترقى الفرج والميول من خلال استبدال الإستروجينات التي يتم انتاجها بشكل طبيعي قبل اليأس من قبل الميول

عند النساء. يتم إدخال المستحضر داخل الميول، بحيث يتحمّل الهرمون حينما يكون ضروريًا. قد يفعّل هذا الأمر من عدم الراحّة في الميول.

2. قبل استعمال الدواء

استعمال العلاج الهرموني البديل (HRT) له اختارات (احتمالات خطر) يجبأخذها بالحسبان عند اتخاذ

القرار بخوض العلاج أو الامتنار به.

الخبرة في علاج النساء الواتي بلغ سن اليأس ابكر من المعتاد (عقب قليل مبغي أو عملية جراحية) لا يزال محدوداً. إذا كنت تخبرين سن اليأس

مبكراً، قد تكون الاختارات في العلاج الهرموني البديل مختلفة. رجاء استشيري طببيك.

قبل بدء الاستعمال (أو استئناف الاستعمال) بالعلاج الهرموني البديل، سوف يسألك طببيك حول تاريخ عائلتك الطبي. قد يقرّ طببيك القيام

بهذه الاختارات في استعمال إيتراروسا، عليك الدور لمعرفة توصيات روتينية لدى طببيك (على الأقل كل 6 أشهر). في هذه الفحوصات، تحدثي مع طببيك

بعض الاختبارات والاختبارات من استمرار استعمال إيتراروسا.

بعد الحصول على النصائح التي روتينية، حسب توصية الطبيب.

لا يجوز استعمال الدواء إذا:

كان أحد الحالات التالية صحيحة بالنسبة لك، ألم تكوني متقدمة بخصوص أحدي النقاط أدناه استشيري الطبيب قبل استعمال إيتراروسا.

• كنت تعانين أو عانيت في مرة من المرات من سرطان ثدي، أو إذا كان هناك شك بذلك;

• كنت تعانين أو عانيت من نزيف مهبلي غير مبرر.

• كنت تعانين أو عانيت في مرة من المرات من خثرة دم في الوريد (خثار)، مثلاً في الرجلين (خثار في وريدي عيني) أو في الرئتين (الصمم رئوي);

• كنت تعانين أو عانيت مؤخراً من منسج ينجم عن خثارات دم في الشريانين، مثل نوبة قلبية، سكتة أو وجع صدرية (angina pectoris);

• كنت تعانين أو عانيت من منسج ينجم عن خثارات دم في المراتب، كثرة أو وجع صدرية;

• كنت تعانين أو عانيت من مكثة دم دائرة التي تدعى فرفوفة، وهي روتينية;

• كنت تعانين أو عانيت من مكثة دم دائرة التي يتحمّلها الدواء (انطري بند).

إذا ظهرت أحد الحالات الآتية أثناء استعمال إيتراروسا، يجب إيقاف استعمال الدواء وتوجه إلى الطبيب فوراً.

تحذيرات خاصة بخصوص استعمال الدواء

قبل الملاج إيتراروسا، أخبري الطبيب إذا كان لديك في مرة من المرات أحدي المشاكل التالية، لأنها قد تعود أو تتفاقم أثناء العلاج بإيتراروسا. إذا

كان كذلك، يرجى للشخص الذي يعطيك في أوقات متقاربة أكثر:

• أداء لقحة في الرحم.

• نمو بطaine الرحم خارج الرحم (endometriosis) أو تراخيص بطaine الرحم;

• احتصار زان الأنصابية بسرطان حساس للإستروجين (مثلًا، أم، اختار أو جدة كان لديها سرطان ثدي).

فرط ضغط المهبل.

• اضطرابات كبد، مثل ورم حميد في الكبد;

• حجارة في كبد المرأة.

• شقيقة أو أمراض وعيه.

• مرض جهاز المناعة الذي يؤثر على أعضاء كثيرة في الجسم (ثنية حمامية مجموعة، SLE systemic lupus erythematosus،

• صرع.

• رؤوس.

• مرض ينبع من داء الدهن في الدم (دهن ثالثة);

• احتباس سائل غبغ ملئ كلب أو كلبة.

نوكيا عن استعمال إيتراروسا إلى الطبيب فوراً.

إذا احتجت أحد الحالات المذكورة في البند "لا يجوز استعمال الدواء إذا":

• كل واحدة من الحالات المذكورة في البند "لا يجوز استعمال الدواء إذا".

• اضطرابات زان الأنصابية بسرطان حساس للإستروجين (مثلًا، أم، اختار أو جدة كان لديها سرطان ثدي);

• اضطرابات كبد، مثل ورم حميد في الكبد;

• إدمان على الكحول.

• إذا احتجت في حال:

• ارتفاع كبير في ضغط الدم (قد تكون الأعراض المأس، تعب، دوخة);

• الأم وأس شبه الشقيقة التي تحدث لأول مرة;

• إذا احتجت علامات لخترة، مثل:

- انتفاخ مؤقت في الرجلين;

- الم ألم في المعدة.

- صعوبات تفتق.

المزيد من المعلومات، اطلبني خبرات دم في الوريد ("أختار").

ملحوظة: إيتراروسا ليست وسيلة منع حمل. في حال مرور أقل من 12 شهر على الطمث الآخر لديك أو إنك دون جيل 50، قد لا تزالين بحاجة لاستعمال

العلاج الهرموني البديل والهرمن.

إيتراروسا لم يحصل للبحث لدى النساء مريضات أو مرضن في الماضي بالسرطان.

فقط سماكة بطaine الرحم وسرطان بطaine الرحم

إن تناول أدوية أخرى تؤدي إلى نزيف مهبلي يزيد طوله من الزمان قد يزيد الاحتياط تأثير سرطان بطaine الرحم. إيتراروسا لا

يبيّن بطaine الرحم، إلا أنّه ينبع في تأثير سرطان بطaine الرحم الذي شهد لدى كل النساء الواتي تعالجون بـإيتراروسا لمدة خلال التجارب السريرية.

لهم، لذلك فإنّه ينبع في تأثير سرطان بطaine الرحم.

إذا كنت تعانين من آفة أو لديك بقع دم، شكل عادي للطلق، ولكن عليك حجز دور لدى الطبيب، قد تكون هذه علامة على أن بطaine الرحم الخاصة

بك قد أصبحت مسؤولة.

تبيّن الاختبارات التالية على آفة عدوة تعلقي كلاع هرموني بديل موجودة في تيار الدم. ولكن، إيتراروسا امتصاص قليل جداً

لا يرجع ذلك إلى احتصار زان الأنصابية بسرطان بطaine الرحم.

إذا كنت تعانين من آفة أو لديك بقع دم، شكل عادي للطلق، ولكن عليك حجز دور لدى الطبيب، قد تكون هذه علامة على أن بطaine الرحم الخاصة

بك قد أصبحت مسؤولة.

تبيّن الاختبارات التالية على آفة عدوة تعلقي كلاع هرموني بديل موجودة في تيار الدم. ولكن، إيتراروسا امتصاص قليل جداً

لا يرجع ذلك إلى احتصار زان الأنصابية بسرطان بطaine الرحم.

إذا كنت تعانين من آفة أو لديك بقع دم، شكل عادي للطلق، ولكن عليك حجز دور لدى الطبيب، قد تكون هذه علامة على أن بطaine الرحم الخاصة

بك قد أصبحت مسؤولة.

لا يرجع ذلك إلى احتصار زان الأنصابية بسرطان بطaine الرحم.

إذا كنت تعانين من آفة أو لديك بقع دم، شكل عادي للطلق، ولكن عليك حجز دور لدى الطبيب، قد تكون هذه علامة على أن بطaine الرحم الخاصة

بك قد أصبحت مسؤولة.

في تجربة إيتراروسا، لم يتحقق تأثير تعلقي كلاع هرموني بديل يزيد من احتصار سرطان بطaine الرحم.

إذا كنت تعانين من آفة أو لديك بقع دم، شكل عادي للطلق، ولكن عليك حجز دور لدى الطبيب، قد تكون هذه علامة على أن بطaine الرحم الخاصة

بك قد أصبحت مسؤولة.

لا يرجع ذلك إلى احتصار زان الأنصابية بسرطان بطaine الرحم.

إذا كنت تعانين من آفة أو لديك بقع دم، شكل عادي للطلق، ولكن عليك حجز دور لدى الطبيب، قد تكون هذه علامة على أن بطaine الرحم الخاصة

بك قد أصبحت مسؤولة.

لا يرجع ذلك إلى احتصار زان الأنصابية بسرطان بطaine الرحم.

إذا كنت تعانين من آفة أو لديك بقع دم، شكل عادي للطلق، ولكن عليك حجز دور لدى الطبيب، قد تكون هذه علامة على أن بطaine الرحم الخاصة

بك قد أصبحت مسؤولة.

لا يرجع ذلك إلى احتصار زان الأنصابية بسرطان بطaine الرحم.

إذا كنت تعانين من آفة أو لديك بقع دم، شكل عادي للطلق، ولكن عليك حجز دور لدى الطبيب، قد تكون هذه علامة على أن بطaine الرحم الخاصة

بك قد أصبحت مسؤولة.

لا يرجع ذلك إلى احتصار زان الأنصابية بسرطان بطaine الرحم.

إذا كنت تعانين من آفة أو لديك بقع دم، شكل عادي للطلق، ولكن عليك حجز دور لدى الطبيب، قد تكون هذه علامة على أن بطaine الرحم الخاصة

بك قد أصبحت مسؤولة.

لا يرجع ذلك إلى احتصار زان الأنصابية بسرطان بطaine الرحم.

إذا كنت تعانين من آفة أو لديك بقع دم، شكل عادي للطلق، ولكن عليك حجز دور لدى الطبيب، قد تكون هذه علامة على أن بطaine الرحم الخاصة

بك قد أصبحت مسؤولة.

لا يرجع ذلك إلى احتصار زان الأنصابية بسرطان بطaine الرحم.

إذا كنت تعانين من آفة أو لديك بقع دم، شكل عادي للطلق، ولكن عليك حجز دور لدى الطبيب، قد تكون هذه علامة على أن بطaine الرحم الخاصة

بك قد أصبحت مسؤولة.

لا يرجع ذلك إلى احتصار زان الأنصابية بسرطان بطaine الرحم.

إذا كنت تعانين من آفة أو لديك بقع دم، شكل عادي للطلق، ولكن عليك حجز دور لدى الطبيب، قد تكون هذه علامة على أن بطaine الرحم الخاصة

بك قد أصبحت مسؤولة.

لا يرجع ذلك إلى احتصار زان الأنصابية بسرطان بطaine الرحم.

إذا كنت تعانين من آفة أو لديك بقع دم، شكل عادي للطلق، ولكن عليك حجز دور لدى الطبيب، قد تكون هذه علامة على أن بطaine الرحم الخاصة

بك قد أصبحت مسؤولة.

لا يرجع ذلك إلى احتصار زان الأنصابية بسرطان بطaine الرحم.

إذا كنت تعانين من آفة أو لديك بقع دم، شكل عادي للطلق، ولكن عليك حجز دور لدى الطبيب، قد تكون هذه علامة على أن بطaine الرحم الخاصة

بك قد أصبحت مسؤولة.

لا يرجع ذلك إلى احتصار زان الأنصابية بسرطان بطaine الرحم.

إذا كنت تعانين من آفة أو لديك بقع دم، شكل عادي للطلق، ولكن عليك حجز دور لدى الطبيب، قد تكون هذه علامة على أن بطaine الرحم الخاصة

بك قد أصبحت مسؤولة.

لا يرجع ذلك إلى احتصار زان الأنصابية بسرطان بطaine الرحم.

إذا كنت تعانين من آفة أو لديك بقع دم، شكل عادي للطلق، ولكن عليك حجز دور لدى الطبيب، قد تكون هذه علامة على أن بطaine الرحم الخاصة

بك قد أصبحت مسؤولة.

لا يرجع ذلك إلى احتصار زان الأنصابية بسرطان بطaine الرحم.

إذا كنت تعانين من آفة أو لديك بقع دم، شكل عادي للطلق، ولكن عليك حجز دور لدى الطبيب، قد تكون هذه علامة على أن بطaine الرحم الخاصة

بك قد أصبحت مسؤولة.

لا يرجع ذلك إلى احتصار زان الأنصابية بسرطان بطaine الرحم.

إذا كنت تعانين من آفة أو لديك بقع دم، شكل عادي للطلق، ولكن عليك حجز دور لدى الطبيب، قد تكون هذه علامة على أن بطaine الرحم الخاصة

بك قد أصبحت مسؤولة.

لا يرجع ذلك إلى احتصار زان الأنصابية بسرطان بطaine الرحم.

إذا كنت تعانين من آفة أو لديك بقع دم، شكل عادي للطلق، ولكن عليك حجز دور لدى الطبيب، قد تكون هذه علامة على أن بطaine الرحم الخاصة

بك قد أصبحت مسؤولة.

لا يرجع ذلك إلى احتصار زان الأنصابية بسرطان بطaine الرحم.

إذا كنت تعانين من آفة أو لديك بقع دم، شكل عادي للطلق، ولكن عليك حجز دور لدى الطبيب، قد تكون هذه علامة على أن بطaine الرحم الخاصة

بك قد أصبحت مسؤولة.

لا يرجع ذلك إلى احتصار زان الأنصابية بسرطان بطaine الرحم.

إذا كنت تعانين من آفة أو لديك بقع دم، شكل عادي للطلق، ولكن عليك حجز دور لدى الطبيب، قد تكون هذه علامة على أن بطaine الرحم الخاصة

بك قد أصبحت مسؤولة.

لا يرجع ذلك إلى احتصار زان الأنصابية بسرطان بطaine الرحم.

إذا كنت تعانين من آفة أو لديك بقع دم، شكل عادي للطلق، ولكن عليك حجز دور لدى الطبيب، قد تكون هذه علامة على أن بطaine الرحم الخاصة

بك قد أصبحت مسؤولة.

لا يرجع ذلك إلى احتصار زان الأنصابية بسرطان بطaine الرحم.

إذا كنت تعانين من آفة أو لديك بقع دم، شكل عادي للطلق، ولكن عليك حجز دور لدى الطبيب، قد تكون هذه علامة على أن بط