

>ZMPEL 1 מיקרוגרם

כמוסות רכות

החומר הפעיל וcomaתו:

כל כמוסה של זמפלר 1 מיקרוגרם (מ"ג) מכילה:
פאריקלציטול 1 מיקרוגרם (מ"ג)
paricalcitol 1 microgram (mcg)

חוורמים בלתי פעילים ואלרגניים – ראה סעיף 6 "מידע

נוסף" בעילון זה.

קרא בעיון את העילון עד סופו בטרם תשמש בתרופה.

עלון זה מכיל מידע מתקיים על התרופה. אם יש לך שאלות

נספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח.

תרופה זו נרשות לטיפול במחלת/עובר. אל תעביר אותה

לאחרים. היא עלולה להזקק להם אפילו אם נראה לך כי

מחלמת/מצב הרפואית דומה.

1. מה מיועדת התרופה?

התרופה מיועדת למשמעות וטיפול בפעילות יתר משנית של יותרת בלוטת התריס במטופלים מסוימים מייסיק כלית כרונית (מחלת כליות כרונית בשלב 3 או 4) או במטופלים הסובלים מחוסר תפקוד כליתי (מחלת כליות כרונית בשלב 5), ועובדרים טיפול המודיאליזה או דיאליזה בשלב (דיאליזה פריטונאלית).

קובוצה רפואיית: נוגד פעילות של יותרת בלוטת התריס.

תרופה זו ניתן צורה סינטטית של ויטמין D פעיל. ויטמין D

עלילתי לטיפול התрисן של רקמות רבות בגוף, כולל

יותרת בלוטת התריס והעכמתה. באופןים עם תפקוד כליתי

תקין, צורה זה של ויטמין D פעיל מושחת באופן טבעי על

די הכלכליות, ואולם באנשים עם של כלית, יצור ויטמין D

פעיל יותר באופן נורמי.

לפיכך, זמפלר מספק מקור לויטמין D פעיל כאשר הגוף אינו

מייצר מספיק ויטמין D פעיל, ומסייעת למנוע את ההשלכות

של הרחמן יותרת מוג�עת נוכחות של ויטמין D פעיל, ככלمر רמות גבוהות

של הרחמן יותרת בלוטת התריס עלול לגרום לביעור עצם.

זמפלר מושחת ממטופלים מבוגרים עם מחלת כליות כרונית

(בשלבים 1-3).

2. לפני שימוש בתרופה

א אין להשתמש בתרופה אם:

• אהה רגיש (אלרגיה) לחומר הפעיל פאריקלציטול או לכל אחד מהמרכיבים הננספים אשר מכילה התרופה נסוף".

• יש לך רמות גבוהות מאוד של סידן או של ויטמין D

בדם.

הרופא שלך יוכל לך אם מצבים אלו חלים עלייך.

ażhorot miyudot haengutot li-shimush batrufah:

• לפני הטיפול בזכפלר, חשוב להזכיר את ציריכת כמהות

ההורן בתזונה שלך.

יתכן ויתהforder צורך בטיפול התרופה הקשורות זהה על מנת

להסדר את רמות ההורן: בMITTED וברקח ההורפה יצרך להתחאים בסיס סידן הקשורות זורן, יתכן והרופא יצטרך להתחאים את המינון שלך.

• במטופלים מסוימים עם מחלת כליות כרונית בשלב 3 או 4, נצפתה עלייה בדם ברמותו של חומר הנקרוא קראטינין.

יחד עם זאת, עלייה זו אינה מסקנת ירידיה בפעולות הכלינית.

ב. בדיקות ומוקע

• במשך תקופת הטיפול בתרופה זו, יש לבצע בדיקות דם

על מנת לעקוב אחר הטיפול.

ג. ילדים ומתבגרים

תרופה זו אינה מיועדת לילדים ומתבגרים מתחת לגיל 18.

ד. קשיים

ישנו ניסיון מוגבל ברגע שמשמש זמפלר במטופלים בגיל 65

ומעל. באופן כללי, לא נצפו הבדלים בייעילות או בבטיחות

במטופלים בגיל 65 ומעלה בהשוואה למטופלים צעירים יותר.

אם אתה לוקה, או לך תקופת זמן קצרה לאחר תרופה כלל

תרופה ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או

לרוקח.

תרופות מסוימות יכולות להוביל להשဖע על פעילות זמפלר או

להעלות את הסיכון לתופעות לוואי.

במיוחד יש לידע את הרופא אם אתה לוקה:

• תרופות המשמשות לטיפול ביוזומים פטיריים או פטרת

הפה והגרון (כגון: קטנוקואולז)

• תרופות המכילות סידן לטיפול ברכות גבוהות של כולסטרול

(כגון: קולסטראטמין)

• תרופות לטיפול בעוריות לב או לח דם (כגון: digoxin ומשתנים)

• תרופות המכילות מוגבל ברגע לשימושם על פועלות זמפלר או

רמת סידן בדם

• תרופות המכילות סידן או ויטמין D כולל תוספי תזונה

ומולטי ויטמינים שנינן לרכיבים לא מרשם רופא

• תרופות המכילות מגנים או אלומיניום (כגון: סוגים

משמעות זרחה)

ה. שימוש בתרופה וழמוך

נתן לטיפול זמפלר עם או ללא אוכל.

ג. הרירן והנקה

אם הנrkן בהריון או מניקה, היועץ ברופא או ברוקח לפני

נטילת זמפלר.

אם סידיק מידי שמנע ברגע שמשמש בפאrikalzitrol בנטדים

ב беременн. בשימוש בבני אדם הסיכון האפשרי אינו ידוע.

על כן, אין להשתמש בפאrikalzitrol בהריון אלא אם כן

יש בו צורך ברור.

לא ידוע אם פאrikalzitrol עבר לחלב האם. יש להיוועץ

ברופא לפני הנקה בעת נטילת זמפלר.

ד. נהיגה ושימוש במכונות:

זמפלר לא אמור להשיפע על יכולת נהוג או להפעיל

מכונות.

ה. מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של זמפלר

התרופה מכילה כמהות מוגבל (אלוראול), בכמות

שלortal מ-100 מ"ג לכל כמוסה. כמות זו עלולה לשנות או

העלות את השפעתן של תרופות אחרות הזרקן או באנשים הסובלים מחלה נדירה, דבר זה עלול להפגיע

בגברים מוחית או מחלת נשים מניקות וילדים.

3. כיצד תשמש בתרופה?

יש להשתמש בתכשיר תמיד בהתאם להורוקח או הרופא.

עליך לבדוק אם יש לך יש לטבול את הקפסולות בשמלותן.

למנון ואופן הטיפול יקבע על ידי הרופא בלבד.

אין לכתוש, לרסק או לולווע את הקפסולות.

אין ליבור על המגה מומלחצת.

keep the capsules in their original containers.

את המינון המתאים עבורך.

לאחר תחילת הטיפול עם זמפלר, בדרך כלל ישנו צורך

בתאמת מינון, כתלות בתגובהך לטיפול.

ה. מלחת כבד

אם יש לך מלחת כבד להזקק הנrkן עד מתונה, אין צורך בהתחמת

המינון. אולם, אין ניסיון במטופלים עם מלחת כבד חמורה.

אם נטلت בטעות מינון גבוהה יותר

נטילת זמפלר במינון גבוה יותר מהנדרש יכולת לגוף עליליה.

ברמות סידן גבוהים יתיר או אום בטעות בעילון יולדת להרחקה או אם

הנrkן מרים אותה מוחית או מחלת נשים מניקות.

או לחדר מינון של בית חולים והבא את אריזת התרופה איתך.

טטע מינון מינון גובה יותר

טטע מינון מינון גובה יותר