

لا يجوز إلقاء الأدوية في مياه الصرف الصحي أو في سلة النفايات البيئية. إسال الصيدلي عن كثافة التخلص من الأدوية التي لم تُعد قيد الاستعمال. هذه الوسائل متساهم في الحفاظ على البيئة.

6. معلومات إضافية:

يحتوي الدواء بالإضافة إلى المادة الفعالة أيضًا على:

Lactose, pregelatinized maize starch, Sodium starch glycolate, magnesium stearate.

كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العبوة: قرص باللون الأبيض الضارب إلى السكري، مع خط للنطر في كل الجانبين. أحجام العبوة التي تمت المصادقة عليها: 0.7، 10 أو 20 قرصًا في العبوة. قد لا تُسوق جميع أحجام العبوات.

المصنّع/صاحب الأمانة وعنوانه: ك. ص ط للصناعات الكيميائية. م.ض.، هايكيمـا 3، كربـات مـلـاخـي.

هذه النشرة فحصت وأقررت من قبل وزارة الصحة في 08/2015 وتم تحديثها بموجب تعليمات وزارة الصحة في 07/2020. رقم تسجيل الدواء في سجل الأدوية الرسمي في وزارة الصحة:

1370930171

من أجل التبسيط ولتسهيل القراءة، تمت صياغة هذه النشرة بصيغة المذكرة. على الرغم من ذلك، فإن الدواء مخصص لكلا الجنسين.

الأعراض الجانبية الأكثر شيوعًا التي تم التبليغ عنها لدى البالغين والآباء الذين عمرهم أكثر من 12 عامًا هي:

• نauseas

• صداع

• زيادة في الشهية

• مصعوبة في النوم

الأعراض الجانبية الأكثر شيوعًا التي تم التبليغ عنها لدى الأولاد الذين تتراوح أعمارهم بين 2-12 عامًا هي:

• صداع

• عصبية

• تعب

أعراض جانبية نادرة جدًا (قد تظهر لدى شخص واحد كحد أقصى من بين 10,000 شخص) تمت مشاهتها أيضًا خلال فترة استعمال لوراتادين:

• رد فعل حساسية خطير (يشمل الانفاس)

• دوار

• اختلال

• نظم قلبٍ متسرع أو غير منتظم

• غثيان

• جفاف الفم

• اضطرابات في الجهاز الهضمي

• مشاكل في الكبد

• تساقط الشعر

• طفح جلدي

• تعب

أعراض جانبية مدى شيوخها غير معروفة:

• ارتفاع الوزن

إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقم أحد الأعراض الجانبية أو إذا

عانيت من عرض جانبي لم يذكر في هذه النشرة، فعليك استشارة الطبيب.

التبليغ عن الأعراض الجانبية:

بالإمكان التبليغ عن أعراض جانبية لوزارة الصحة بواسطة الضغط على الرابط "التبليغ عن أعراض جانبية عقب العلاج الدوائي" الموجود في الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة (www.health.gov.il) والذي يوجه إلى الاستمارة المتصلة للتبلغ عن أعراض جانبية، أو عن طريق الدخول إلى الرابط:

<https://sideeffects.health.gov.il/>

5. كيف يجب تخزين الدواء؟

امتنع التسمم! هذا الدواء، وكل دواء آخر، يجب حفظه في مكان مغلق بعيدًا عن متناول أيدي الأطفال وأو الأطفال الرضيع و المجال رؤيتهم، وذلك سترعى التسمم. لا تسبب التقيؤ بدون تعليمات صريحة من الطبيب.

لا يجوز استعمال لوراتاديم بعد تاريخ انتهاء الصلاحية (exp.) المدون على العبوة. يشير تاريخ انتهاء الصلاحية إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.

ظروف التخزين: يجب التخزين في درجة حرارة أقل من 25 درجة مئوية.

لا يجوز تناول هذا الدواء إذا لاحظت أي تغيير في شكل القرص.

