

## ريتالين 10 ملг أقراص

تحتوي كل قرص على: ميتيل فينيدين هيدروكلورايد 10 ملг  
Methylphenidate Hydrochloride 10 mg

## ريتالين 20 SR 20 ملг أقراص

تحتوي كل قرص على: ميتيل فينيدين هيدروكلورايد 20 ملг  
Methylphenidate Hydrochloride 20 mg

### (2) قبل إستعمال الدواء

بسوق الدواء بموجب وصفة طبيب فقط

#### تحذيرات إضافية

من شأن ريتالين أن يعطي نتيجة إيجابية خطأهنة في فحوص استعمال الأدوية، بما في ذلك الفحوص التي تجرى في مجال الرياضة

قد يحصل لدى بعض الأطفال الذين يتناولون ريتالين لفترة طويلة تباطؤ في النمو لكنهم عرضوهن من ذلك عادة عند إيقاف العلاج (انظر أيضًا فقرات: "فتراء العلاج")

لدى بعض المعالجين، من شأن ريتالين أن يؤدي إلى إزعاج في البطن. فقد الشهية للطعام وصعوبات في النوم، خاصة في بداية العلاج يمكن أن يساعد الطبيب في تقليل تلك الأعراض وذلك بتخفيض المقدار الدوائي من ريتالين أو بتغيير أوقات تناول الأقراص

إذا حدث لديك خال فتراء العلاج بـ ريتالين أو بعد التوقف عن العلاج حالات متلازمة توبي (حالة من حركات جسم ونطق غير مسيطر عليها أو خلجان)

إذا كانت لديك سوابون عاليته لهذا الإضطراب، فربما قد يزداد صريح قد يؤثر على نجاح العلاج طبعاً على الجينين وذلك إذا قشت تناوله خلال فتراء العلاج.

إذا اضطررت إلى إيقاف العلاج بـ ريتالين، يرجى استشارة الطبيب. يتناقض معك الطبيب حول المخاطر والفائدة من تناول الدواء خلال فتراء العلاج.

إذا يجوز الإرضاع خلال فتراء العلاج بـ ريتالين يمكن لمادة المعلقة في ريتالين أن تنتفخ إلى حليب الأم

السيادة واستعمال الماكينات خلال فتراء العلاج بـ ريتالين يجب الحذر أثناء السيادة، تشغيل الماكينات أو تنفيذ المهام التي تتطلب القدرة على أن تعرف كيفية تأثير الدواء علىك.

قد يؤدي هذا الدواء إلى هياق، دوار، تعرق، ضبابية الرؤية أو أعراض جانبية أخرى في الجهاز العصبي المركزي التي يمكنها أن تضعف من القدرة على التركيز لدى بعض الأشخاص.

إذا كنت تعاني من تلك الأعراض، فلا تفعل سباقية المركبات، تشغيل الماكينات أو القيام بأي منشط يرتبط بدور سبعة أو الذي قد يشكل خطراً.

بالنسبة للأطفال يجب تخييرهم من ركوب الدراجات أو اللعب بالقرب من الشارع وما شابه.

معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء

ريتالين 10 ملغ أقراص: يحتوي الدواء على المكونات التالية: توجه لطبيتك قبل تناول هذا الدواء.

ليك عدم تحمل لسكريات معينة، توجه لطبيتك قبل تناول هذا الدواء.

يحتوي الدواء على نشاء الجんطنة، يحتوي هذا الدواء على نسب منخفضة جداً من الأدوية الكثولين، إن شاء الحقيقة.

إذا كنت تعاني من شاء الحقيقة، إذا وجدت لديك حساسية للقمح (يشكل مغایر عن مرض السيليك)، فلا يجوز تناول الدواء.

ريتالين 20 ملغ أقراص: يحتوي الدواء على المكونات التالية: توجه لطبيتك قبل تناول هذا الدواء.

إن لديك عدم تحمل لسكريات معينة، توجه لطبيتك قبل تناول هذا الدواء.

**(3) كافية استعمال الدواء؟**

يجب دائمًا استعمال المستحضر بحسب تعليمات الطبيب. عليك الاستبصار من الطبيب أو الصيادي إذا تم تكينه بآفة أو مرض في الجسم.

**المقدار الدوائية:**

المقدار الدوائي وفرقة العلاج يحددان من قبل الطبيب بحسب احتياجات المُعالج واستجاعاته للعلاج.

لا يجوز تغيير المقدار الدوائي بدون استشارة الطبيب.

إذا كنت تعقدت بأن تأثير الدواء أقوى أو أضعف من اللازم، يجب استشارة الطبيب المُعالج.

لا يجوز تجاوز المقدار الدوائي الموصى به.

متى وكيفية تناول ريتالين 10 ملغ أقراص مع أو بدون طعام.

يجب تناول ريتالين 10 ملغ أقراص مرة أو مرتين في اليوم (مثلاً أثناء وجبة الفطور وأوجبة

الغداء، أي تقسم المقدار الدوائي اليومي بين إعطاء في الصباح وإعطاء في الظهر).

بلغ كل طبيب، طبيب الأسنان أو الصيادي الذي يعتني بك بذلك تناول ريتالين.

#### بعد إستعمال الدواء

لا يجوز إستعمال الدواء:

إذا كنت حساساً ( لديك حساسية زائدة ) لل المادة الفعالة ميتيل فينيدين 6

«معلومات إضافية» بعض أمراض رد الفعل التحسسي يمكن أن تشمل ضيق نفس، صفير أو صعوبات في التنفس، إنفاس، تهيج، الشفتين، اللسان وأجزاء أخرى

من الجسم، طفح حكة أو طفح جلدي (شرى).

لا يجوز تناول ريتالين إذا كنت تعاني من الحالات الطبية التالية:

• فترات من القلق، التوتر أو قلة الهدوء

• مثلازمة توبي (حالة من حركات جسم ونطق غير مسيطر عليها أو خلجان)

• إرتفاع شفط داخل العين (چلوكوما)

• فرط نشاط الغدة الدرقية (thyroid) أو مشاكل أخرى في الغدة الدرقية

• مشاكل في القلب مثل تهيج قلبية، نبض غير منتظم، آلام في الصدر (angina)، ضغط عالٍ

• ضغط عالٍ من نوع جد (ارتفاع ضغط الدم أو اضطراب الأوعية الدموية الشريانية (انسداد الشريان)، الذي قد يسبب الماء في الراعبين والرجلين)

• ورم نادر في الغدة الكظرية (adrenal gland) الذي يعرّف باسم ورم خلايا الكروموماتين أو الصبلي.

إذا كنت غير قادر فيما إذا كنت تعاني من إحدى الحالات الطبية التي فصلت أعلاه، إسأل الطبيب.

لا يجوز تناول ريتالين إذا كنت تتناول من فصيلة مشطيات متوكرين (أوكسيدار

MAO)، إن تناول ريتالين سوية أو أدوية من فصيلة مشطيات متوكرين (أوكسيدار

رد فعل خطير الذي يشمل إرتفاع مفاجئ بحرارة الجسم، إرتفاع ضغط الدم بشكل حاد، وتشنجات.

إسأل الطبيب إذا كنت غير قادر فيما إذا كنت تتناول واحداً من تلك الأدوية.

تحذيرات خاصة تتعلق بإستعمال الدواء:

بلغ الطبيب إذا كنت حساساً لأي دواء آخر، طعام، مواد صبغية أو مواد حافظة.

يرجع الطبيب بمعرفة فيما إذا لديك ميل في أن تتطور لديك حساسية.

بلغ الطبيب إذا كنت تعاني من عدم تحمل للكوكايين أو لجلوكوتين (انظر أيضًا فقرة: «معلومات

الاتصالات/الاتصالات بين الأدوية»).

إذا كنت تعاني من بعض الأدوية المضادة للأختلاجات (اللiver cirrhosis أو التهاب

الكبد)، يجب تناول ريتالين قبل تناولها سوية.

يقلل رفع نسق الصير لديهم مستوى منخفض من الإصبعاء ويشعرن بالملل بسهولة

قد يواجهوا صعوبة في تقطيع علتهم الشخصية أو العصبية في العمل.

#### العلاج بالمضادات

العلاج بالمضادات:

2

يجب بلع القرص مع كأس مليئة من الماء.

#### REFERENCES

إذا كان المقدار الدوائي عبارة عن نصف قرص، فيجب الإكمان سطر افراص ريتالين ١٠ مل.

متى، وكيفية تناول ديتالين **SR 20** ملء أقراصه؟

يجب تناول أقراص ريتالين SR 20 ملغ حلاًّ بعد وجبة الطعام ويفضل بـ

**يجب بـلـ القـرـصـ بشـكـلـهـ الكـامـلـ معـ المـاءـ.**

٦ يجوز مرض أو سحو المرض.  
ليس بالإمكان شطر أقراص ريتالين SR 20 ملغ.  
• ضعفه

- طفح جلدي. حكة
- ارتفاع مفاجئ بـ

إذا كانت الاختلالات تسبب لك إزعاج في المطبخ، فالإمكان تناولها مع الطعام، لكن يحب الحرث على تناولها دائمًا بنفس الطريقة (أي: دائمًا مع الطعام أو دائمًا من دون طعام).

- حالة دائمة لوجود أعراض ومتقلبات بضغط الدم التي قد تؤدي إلى مشكلات صحية خطيرة.

وهكذا سيكون تأثير الدواء ممثلاً على الدوام.

لدى بعض المرضى من شأن ربطة العنق أن يسبب قلة النوم. استشر الطبيب حول التوقيت

الصحيح خلال اليوم لتناول المقدار الدوائي الأخير من ريتالين.  
الحنجرة ورphanج. إنفاس الحدود. الالم في  
• نزف أو كدمات غير عادية في الجلد

- إهراق شاهزاد، ضيق تنفس أثناء القيام بمنشآت بدنية.
- اهتزاز لاراده للجسم (علامات لرحة).

يجب مواصلة تناول ريتالين للفترة الزمنية التي أوصاك بها الطبيب.

هذا الدواء سساعد على تنظيم الأعراض، لكنه لا يشفى. يقوّم الطبيب بفحص تحسّن الوضع وذلك للتأكد من أن الدواء يعمل كما ينبغي وهو يتناقش معك حول السؤال إلى

- إذا كنت غير واثقاً، تحدث مع الطبيب.
- متر يجب الإستمراة بالعلاج.

فترة علاج ADHD تختلف بين مت والعاج وآخر. خلال فترة علاج ADHD مِن الجهاز أن يحصل الطبيب بالتوقف عن إنتاجه، وبالتالي، فهو قادر على إنتاجه مثلاً في نهارات

الأسواع وأذان العطل المدرسية (ذلك العطل هو عطل يومياً إذا كانت هناك إجازات برتقاب شهرين) وذلك بحسب مواعيد إجازة كل فصل.

التي تحدث أحياناً عندما يتناول الأطفال هذا الدواء لفترة من الزمن.

- تضليل الطالب لدى الأطفال
- إغراض معلماً على الاتجاه
- إمكانات حماوة الاتجاه
- تحفيز إنجذاب نفسك (تكمير إنجذابي أو محاولة الاتجاه بما في ذلك بعض أسلوبات التعلم)
- بعض المظاهر المرتبطة بالشخصية التي يتصورها الآخرين
- بعض المظاهر المرتبطة بعمر المتعلم
- بعض المظاهر المرتبطة بالبيئة التي يعيش فيها المتعلم

الصياغة المختلطة على فوائل مبنية من المحرمات الدوائية فحسب، حيث ينبع قيمتها من انتشار المرض في المجتمع.

ساعات بث تناول الخبرة المعاونة القائمة والمعلم، بما بالنسبة لنفس اليوم في اليوم التالي - يجب العودة فوراً للتناول العادي.

أي حذف تناول جماعتين سوية على المدى القصير من الجريمة المنسبة إذا قفت بفعل ذلك فات قد ينبع من إدخاله أعراض جانبية.

إعراض-جانبانية-مشاعرية جدأً (أعراض تظاهر لدى أكثر من مستعمل 1 من بين 10):  
• يحب المماطلة على إعلانه على طلاقه  
• إذا كنت تست夠م ذذنوك لدى من يحب تناوله وذوق استثنائه المفضلي.

• بالمشهدة للاكتئاب المستحضرات المنشطة، هذه الهواة قد تسبب الإهمان سوء الاستعمال  
• نقص مؤقت في تزويد الدم للدماغ (reversible ischemic neurological deficit)،  
• فقدان الشهية للطعام  
• مشكلات في الأذن والسمع

**رسالاتي 10 ملء ارقام** هي مكان توفر لك جميع المعلومات حول الامتحانات والمسابقات المدرسية، كل يوم في موقعنا الإلكتروني.

- عدم القدرة على النوم
- جفاف الفم
- في حال توقفت عن تناول الدواء
- من أجل سويفايتيس فاما اين بايرس
- الم في الحجرة، ضيق تنفس
- رضاعتين 20 SR
- اسمه الامثل

- انتهاج الوجه والحنجرة، أحصار الجلد. ظهور بقع حمراء وكبيرة على الجلد خالٍ من أي تغيرات. تسبّب ألمًا شديدًا.
- انتهاج الوجه والحنجرة، أحصار الجلد. ظهور بقع حمراء وكبيرة على الجلد خالٍ من أي تغيرات. تسبّب ألمًا شديدًا.
- يُرجح التهاب ملتحمة شائكة [أعراض ظهرت لدى 10-11% مستعملين من بين 100] في حال توافق تحسين حالتك الصحية في حال توافق تحسين حالتك الصحية في حال توافق تحسين حالتك الصحية في حال توافق تحسين حالتك

- قيل إيفاق العلاج تماماً يحتاج الأمر لجراء مراقبة طبية بعده إيقاف العلاج.
- تضخم اللثتين لدى الرجال
- التسخير ينثر رائد
- فالتسخير ينثر رائد
- نصخن اللثتين في الأقول
- ينطليون 20 ملء عراض:

تم إعدادها في تاريخ ٢٠٢٠/١٢/٣  
من أجل سهولة وسهولة القراءة، تم صياغة هذه النشرة بصيغة المذكرة على الرغبة

- الم: في الصدد إلزاق موت مهاجري
- إصطيادهم في التهديد
- إصطيادهم في التهديد

• صدغ من ذلك، فإن الدواء مخصص لعلاج الجنسين SH RIT TAB APL MAY20 V10