

أقرت وزارة الصحة صيغة
هذه النشرة ومحتوها
فحص ورخص من قبلها
نشرة للمستهلك بموجب أنظمة الصيدلة
(مستحضرات) - ١٩٨٦
يسوق الدواء بدون وصفة طبيب

أكامول ٢٥٠ ملغ

التركيب

كل عبوة شخصية تحتوي على:
باراسيتامول (Paracetamol) ٢٥٠ ملغ
لقائمة المواد غير الفعالة في المستحضر أنظر
الفقرة ٦ - «معلومات إضافية».

اقرأ النشرة بتمعن حتى نهايتها قبل
إستعمالك للدواء. تحتوي هذه النشرة على
معلومات موجزة عن الدواء. إذا توفرت لديك
أسئلة إضافية، راجع الطبيب أو الصيدلي.
الدواء مخصص للأطفال من عمر ٤ سنوات
وما فوق. عليك تناول الدواء على الشكل
الصحيح. إستشر الصيدلي إذا كنت بحاجة
لمعلومات إضافية.

يجب مراجعة الطبيب إذا استمرت السخونة
لأكثر من ٣ أيام أو إذا لم تزول الأعراض خلال
٥ أيام، رغم إستعمال الدواء.

١) لأي غرض مخصص الدواء؟

الدواء مخصص لتسكين الآلام ولتحفيض
السخونة.

الفصيلة العلاجية:

مسكن للألام وخافض للسخونة.

٢) قبل إستعمال الدواء

☒ لا يجوز إستعمال الدواء إذا:

• وجدت حساسية للباراسيتامول أو لأحد
مكونات الدواء الأخرى (أنظر الفقرة ٦).

تحذيرات خاصة تتعلق بإستعمال الدواء
• إذا تطورت لديك في الماضي أعراض جانبية
جلدية نتيجة تناول مستحضرات تحتوي
باراسيتامول، فلا يجوز تناول مستحضرات
تحتوي باراسيتامول، كي لا تسبب ثانية
أعراض جلدية خطيرة.

• يحتوي المستحضر على باراسيتامول، الذي
قد يسبب ضرراً في الكبد عندما:

◦ يعطى بجرعات دوائية أعلى من الموصى
بها أو لفترة مطولة

◦ عندما يتم شرب المشروبات الكحولية
خلال العلاج

◦ عند تناول أدوية إضافية تؤثر على نشاط
الكبد

◦ لا يجوز إستعمال هذا الدواء في أوقات
متقاربة بدون استشارة الطبيب.

◦ لا يجوز تناول أدوية إضافية لتحفيض
السخونة وتسكين الآلام أو أدوية للزكام
بدون استشارة الطبيب أو الصيدلي وذلك
لمنع حدوث فرط الجرعة الدوائية أو التسمم
بالباراسيتامول.

◦ لا يجوز تناول أدوية إضافية من «فصيلة
أكامول» و/أو مستحضرات إضافية تحتوي
باراسيتامول.

◦ يجب الإمتناع عن تناول جرعة دوائية عالية
(حتى ولو كانت الجرعة الدوائية ضمن
الحدود الموصى بها) من هذا الدواء أثناء
الصوم.

◦ إذا كنت حساساً لأي طعام أو لأي دواء،
يجب إبلاغ الطبيب بذلك قبل تناول الدواء.

■ يجب إستشارة الطبيب قبل بدء العلاج
إذا كنت تعاني أو عانيت في الماضي من:

◦ مرض كبدي أو خلل في وظيفة الكبد.

◦ خلل في وظيفة الكلية

◦ الإدمان على الكحول

◦ إذا كنت في فترة الحمل أو مرحلة

الحمل والإرضاع

إذا كنت في فترة الحمل أو مرحلة

إستشارة الطبيب قبل البدء بإستعمال هذا

الدواء.

■ الإستعمال لدى الأطفال

هذا الدواء مخصص للأطفال من عمر ٤ سنوات،
أنظر الفقرة ٣.

على الوالدين إبلاغ الطبيب المعالج عن كافة

الأعراض الجانبية كذلك عن كل دواء إضافي

يُعطى للطفل.

٣) كيفية إستعمال الدواء؟

عليك الإستيقاظ من الطبيب أو الصيدلي إذا

لم تكن واثقاً.

الجرعة الدوائية الإعتيادية في حال عدم

وجود تعليمات أخرى من الطبيب:

أطفال بأعمار ٦-١٢ سنة:

٢-٢ عبوة شخصية من أكامول ٢٥٠ ملغ كل

٤-٦ ساعات حسب الحاجة.

لا يجوز تناول أكثر من ٨ عبوات شخصية في اليوم (٢ غرام باراسيتامول).

أطفال بأعمار ٤-٦ سنين:

عبوة شخصية واحدة من أفكامول ٢٥٠ ملغ كل ٤-٦ ساعات حسب الحاجة.

لا يجوز تناول أكثر من ٤ عبوات شخصية في اليوم (١ غرام باراسيتامول).

لا يجوز تجاوز الجرعة الدوائية الموصى بها.

عليك مراجعة الطبيب إذا استمرت السخونة لأكثر من ٣ أيام أو في حال عدم زوال الأعراض خلال ٥ أيام، رغم إستعمال الدواء.

طريقة الإستعمال

لا يجوز تناول الدواء مع الطعام. يجب فتح عبوة شخصية من أفكامول ٢٥٠ ملغ، وتفرغ محتواها مباشرة لداخل الفم، على اللسان، ومن ثم البلع. لا حاجة إلى الماء.

إذا تناولت جرعة دوائية مفرطة أو إذا بلع طفل بالخطأ من الدواء، يجب التوجه حالاً إلى الطبيب أو لغرفة الطوارئ في المستشفى وأحضر علبة الدواء معك. لا تسبب التقيؤ بدون تعليمات صريحة من الطبيب! حتى ولو كنت تشعر بشكل جيد رغم تناولك جرعة دوائية مفرطة، فإن العلاج الفوري هو ضروري، بسبب الخطورة للتطور ضرر خطير للكبد. قد يؤدي فرط التناول إلى الأعراض التالية: غثيان وقيء، إسهال، فقدان الشهية للطعام، آلام بطنية، إنتفاخ، تعرق زائد، ألم أو حساسية في أعلى البطن. من الجائز أنها لا تعكس شدة الضرر للكبد.

لا يجوز تناول أدوية في العتمة! يجب تشخيص طابع الدواء والتأكد من الجرعة الدوائية في كل مرة تتناول فيها دواء. ضع النظارات الطبية إذا لزم الأمر ذلك.

٤) الأعراض الجانبية

كما بكل دواء، إن إستعمال أفكامول ٢٥٠ ملغ قد يسبب أعراضًا جانبية عند بعض المستعملين. لا تذهب من قائمة الأعراض الجانبية. من الجائز ألا تعاني أيًا منها.

أعراض جانبية خطيرة:

يجب التوقف عن العلاج ومراجعة الطبيب حالاً:

• في حال ظهور ردود فعل تحسسية شديدة، مثل إنتفاخ الأطراف، طفح وحكة، إنتفاخ الوجه، الشفتين، اللسان و/أو الحنجرة الأمر الذي قد يسبب صعوبات في التنفس أو في البلع.

• باراسيتامول يمكن أن يسبب، في حالات نادرة، ظهور أمراض جلدية حادة علاماتها يمكن أن تكون: أحمرار، طفح، حويصلات أو إصابة جلدية واسعة.

أعراض جانبية جلدية حادة يمكن أن تظهر أيضاً حتى لو تناولت في الماضي مستحضرات تحوي المركب الفعال باراسيتامول ولم تعاني من أعراض جانبية.

إذا ظهرت أعراض جانبية جلدية، يجب التوقف عن العلاج ومراجعة الطبيب بشكل فوري.

• في حال ظهور علامات لتغيرات في جهاز الدم مثل: أنزفة، رضوض، تطور التهابات بسهولة أكبر.

إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقمت إحدى الأعراض الجانبية، أو عندما تعاني من عرض جانبي لم يذكر في هذه النشرة، عليك إستشارة الطبيب.

٥) كيفية تخزين الدواء؟

تجنب التسمم! يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء في مكان مغلق، بعيداً عن متناول أيدي الأطفال و/أو الرضع وبذلك تتفادي إصابتهم بالتسمم. لا تسبب التقيؤ بدون تعليمات صريحة من الطبيب.

٦) معلومات إضافية

يحتوي الدواء بالإضافة للمادة الفعالة أيضاً:

Sorbitol, talc, basic butylated methacrylate polymer, strawberry flavor, vanilla flavor, magnesium oxide light, sodium carmellose, sucralose, magnesium stearate, hypromellose, stearic acid, sodium dodecyl sulfate, titanium dioxide, simeticone.

كل عبوة شخصية من أفكامولي أفكامول ٢٥٠ ملغ تحتوي أيضاً:

سكروز ١٠ ملغ

صوديوم ٢٦،٣٩-٢٦ ملغ

سوربيتول ٦٠ ملغ

سكرالوز ٣ ملغ

كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العلبة: تحتوي علب أفكامولي على أكياس ألومنيوم بكل كيس توجد حبيبات بلون أبيض أو بلون مائل إلى الأبيض (almost white).

المستحضر مرخص للتسويق بالأحجام التالية:

٢٤،٢٢،٢٤،٢٠،١٦،١٢،٨،٢،٤٨،٤٠،٣٦،٣٢،٢٤،٢٠،١٦،١٢،٨،٢،٥،٩٦ أكياس في العلبة، لكن من الجائز ألا

تسوق بالفعل كافة أحجام العلب.

المنتج:

تيفع للأدوية والمستحضرات الطبية م.ض.،

ص.ب. ٣١٩٠، بيتح - تكتاف.

صاحب الإمتياز:

أبيك للتسويق م.ض.، ص.ب. ٨٠٧٧، نتانيا.

أقرت وزارة الصحة بصيغة هذه النشرة

ومحتواها فحص ورُخص في تشرين الأول

٢٠١٣

رقم سجل الدواء في سجل الأدوية الحكومي

في وزارة الصحة:

٦٤٤-٣٣٤-٥١-١٤٨

من أجل سهولة وتهجين القراءة، تمت صياغة هذه النشرة بصيغة المذكرة. على الرغم من ذلك،

فإن الدواء مخصص لكلا الجنسين.