

نشرة للمستهلك بموجب أنظمة الصيدالة (مستحضرات) - 1986

يُسوّق الدواء وفق وصفة طبيب فقط

إسوپريم إس.كي. 40 ملغ

إسوپريم إس.كي. 20 ملغ

كبسولات صلبة

كبسولات صلبة

المادة الفعالة

كل كبسولة تحتوي على:

إيزوميپرازول 40 ملغ
(ك إيزوميپرازول صوديوم)

كل كبسولة تحتوي على:

إيزوميپرازول 20 ملغ
(ك إيزوميپرازول صوديوم)

esomeprazole 40 mg
(as esomeprazole sodium)

esomeprazole 20 mg
(as esomeprazole sodium)

مواد غير فعالة ومثيرة للحساسية: أنظر البند "معلومات مهمة عن قسم من مركبات الدواء" والبند 6 "معلومات إضافية".

اقرأ النشرة بتمعن حتى نهايتها وذلك قبل البدء باستعمال الدواء. تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء. إذا كانت لديك أسئلة إضافية، فتوجه إلى الطبيب أو إلى الصيدلي.
هذا الدواء وصف لعلاج مرضك. لا تعطه للآخرين؛ لأنه قد يضرّ بهم، حتى لو بدا لك تشابه بين مرضك ومرضهم.

1. لم أعد هذا الدواء؟

لدى البالغين، إسوپريم إس.كي. 20 ملغ و- 40 ملغ معدة:

لعلاج الحرقة مع أو بدون التهاب المريء الناجم عن تيار مرتد لحموضة المعدة.

يقلل إسوپريم إس.كي. إنتاج الحموضة ويساعد في شفاء المريء عن طريق تخفيف الألم والالتهاب.

لعلاج التقرحات في القسم العلوي من الأمعاء أو من المعدة الناجمة عن جرثومة الملوية البوابية (*Helicobacter pylori*). يعالج إسوپريم إس.كي. حالات العدوى بالدمج مع المضادات الحيوية المناسبة، ويؤدي إلى شفاء التقرح ومنع عودته.
لشفاء قرحة المعدة الناجم عن تناول مستحضرات مضادة للالتهابات غير ستيرويدية (NSAIDs)، مثل مستحضرات لعلاج التهاب المفاصل (الروماتيزم).

لمنع تكوّن تقرحات في المعدة، إذا كانت من الممكن أن تتطور لديك نتيجة تناول مستحضرات مضادة للالتهابات غير ستيرويدية، مثل مستحضرات لعلاج التهاب المفاصل (الروماتيزم).

علاج مستمر وطويل بـ إسوپريم إس.كي. كبسولات لمنع حدوث نزف متكرر لقرحة المعدة أو للإثني عشر، بعد علاج أولي بـ إسوپريم إس.كي. داخل الوريد.

لدى المراهقين من سن 12 عامًا، إسوپريم إس.كي. 20 ملغ معدة:

• لعلاج الحرقة مع أو بدون التهاب المريء الناجم عن تيار مرتد لحموضة المعدة. يقلل إسوپريم إس.كي. إنتاج الحموضة ويساعد في شفاء المريء عن طريق تخفيف الألم والالتهاب.

لعلاج التقرحات في القسم العلوي من الأمعاء أو من المعدة الناجمة عن جرثومة الملوية البوابية (*Helicobacter pylori*). يعالج إسوپريم إس.كي. حالات العدوى بالدمج مع المضادات الحيوية المناسبة، ويؤدي إلى شفاء التقرح ومنع عودته.

لدى المراهقين من سن 12 عامًا، إسوپريم إس.كي. 40 ملغ معدة:

• لعلاج الحرقة مع أو بدون التهاب المريء الناجم عن تيار مرتد لحموضة المعدة. يقلل إسوپريم إس.كي. إنتاج الحموضة ويساعد في شفاء المريء عن طريق تخفيف الألم والالتهاب.

المجموعة العلاجية: مثبت لمضخة البروتون (مضخة الحموضة في المعدة).

2. قيل استعمال الدواء

• X يُمنع استعمال الدواء إذا:

- وجدت لديك حساسية (حساسًا) للمادة الفعالة أو لأحد المركبات الأخرى التي يحتويها الدواء (المفصلة في الفصل 6).
- كان معروفًا وجود حساسية لمستحضر آخر من مجموعة مثبتات مضخة البروتون (وهي مستحضرات لعلاج أعراض شبيهة بالقرحة مثل بانتوپرازول، لانسوپرازول، راببيازول، أو ميبرازول).
- كنت تتعالج بمستحضر الذي يحتوي على نلفيناثير (دواء لعلاج فيروس نقص المناعة البشري - HIV).

تحذيرات خاصة متعلقة باستعمال الدواء إسوبريم إس.ك.

! قبل بدء العلاج بـ إسوبريم إس.ك، أخبر الطبيب إذا:

- كنت تعاني أو عانيت في الماضي من خلل خطير في أداء وظيفة الكبد.
- كنت تعاني أو عانيت في الماضي من خلل خطير في أداء وظيفة الكلى.
- عانيت في الماضي من رد فعل جلدي بعد علاج بدواء شبيه بـ إسوبريم إس.ك. الذي يُخفّض من حموضة المعدة.
- كنت على وشك إجراء فحص دم معين (كروموجرانين A Chromogranin).

قد يحجب إسوبريم إس.ك. أعراض أمراض أخرى. لذلك، إذا حصل لك واحد مما يلي قبل أن تبدأ العلاج بـ إسوبريم إس.ك. أو أثناء العلاج بـ إسوبريم إس.ك، يجب التوجه فوراً إلى الطبيب:

- كنت تعاني من انخفاض غير واضح في الوزن أو إذا كانت لديك صعوبات في البلع
- كنت تعاني من ألم في البطن أو صعوبات في الهضم
- كنت تتقيأ طعاماً أو دمًا
- كان لديك براز أسود (براز دموي)

إذا كنت تتناول الدواء بحسب الحاجة (وفقاً لتعليمات الطبيب)، أبلغ رجاءً الطبيب المُعالج. كذلك، عليك إبلاغ الطبيب المُعالج إذا طرأ أي تغيير في الأعراض.

هناك ارتفاع في خطورة حدوث كسور في عظام الفخذ، رسغ اليد والظهر وذلك عند الاستعمال المتواصل لمدة سنة وأكثر. أبلغ الطبيب رجاءً إذا تم تشخيصك كمريض بمرض تخلخل العظام (هشاشة العظام – المصابون بالمرض معرضون للكسور أكثر) أو إذا كنت تتناول كورتيكوستيروئيدات.

- إذا كان لديك طفق جلدي، خاصة في المناطق المعرضة للشمس، بلغ الطبيب رجاءً في أسرع وقت ممكن لأنه من المحتمل أن تضطر إلى وقف العلاج بـ إسوبريم إس.ك. إذا شعرت بأعراض مرضية أخرى، مثلآلام المفاصل، يُرجى أيضاً تبليغ الطبيب.

ردود فعل بين الأدوية

- ! إذا كنت تتناول أدوية أخرى أو إذا تناولت مؤخراً أدوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبية ومكملات غذائية، فأخبر الطبيب أو الصيدلي بذلك. وذلك لأن إسوبريم إس.ك. يمكن أن يؤثر على طريقة عمل أدوية معينة، وكذلك أدوية معينة يمكن أن تؤثر على طريقة عمل إسوبريم إس.ك.
- يُمنع تناول إسوبريم إس.ك. إذا كنت تتعالج بمستحضر يحتوي على نلفيناثير (دواء لعلاج فيروس نقص المناعة البشري (HIV)).

أخبر الطبيب أو الصيدلي إذا كنت تتناول:

- أتازانافير (لعلاج فيروس نقص المناعة البشري – HIV)،
- أدوية لعلاج العدوى الفطرية (كيتوكونازول أو إيتراكونازول وفوريكونازول)،
- مستحضرات مضادة للاكتئاب (سيتالوبرام، إمبيرامين أو كلوميبرامين)،
- إرلوتينيب (دواء لعلاج السرطان)،
- أدوية مهدئة (ديازيبام)،
- أدوية للصرع (فينيتوين). إذا كنت تتناول فينيتوين، سوف يضطر طبيبك إلى متابعة علاجك عند بدء العلاج بـ إسوبريم إس.ك. وعند انتهائه.
- أدوية لتميع الدم (وارفارين). سوف يضطر طبيبك إلى متابعة علاجك عند بدء العلاج بـ إسوبريم إس.ك. وعند انتهائه.
- كلوبيدوجريل (دواء يُستعمل لمنع التخثرات الدموية)،
- أدوية لمشاكل في القلب (ديجوكسين)،
- إذا كنت تتناول علاجاً بالأدوية لمرض السل (ريفامبيسين)،
- مستحضر لعلاج الاكتئاب: St. John's Wort (*Hypericum perforatum*)،
- أدوية المعدة لعلاج مرض شرايين في القدمين، الذي يؤدي إلى عرج غير دائم (سيلوستازول)،
- ميتوتريكسات (دواء الذي يُستعمل بجرعات مرتفعة لعلاج السرطان). إذا كنت تتناول جرعة مرتفعة من ميتوتريكسات، من الممكن أن يوصيك طبيبك بالتوقف بشكل مؤقت عن العلاج بـ إسوبريم إس.ك،
- دواء لعلاج رفض نسيج مزروع بعد زرع أعضاء (تاكروليموس)،
- أدوية معينة لعلاج أورام خبيثة (مثل إيرلوتينيب)،
- أدوية لتسريع تفرغ المعدة (سيزايريد) في العلاج المشترك مع إسوبريم إس.ك،

إذا كنت تحصل على إسوبريم إس.كي.سويًا مع كلاريندروميسين وأموكسيسيللين لعلاج قرحة الناجمة عن جرثومة الملوية البوابية ، فمن المهم أن تخبر الطبيب بخصوص أي دواء آخر تتناوله.

! استعمال إسوبريم إس.ك والغذاء

يمكن تناول الكبسولة مع الطعام أو على معدة فارغة.

! الحمل والإرضاع

إذا كنت حاملاً، تعتقدين بأنك حامل أو تخططين أن تحملي، يجب استشارة الطبيب قبل تناول هذا الدواء. ليس معروفاً فيما إذا كان إسوبريم إس.كي.ينتقل إلى حليب الأم. لذلك، يُمنع استعمال إسوبريم إس.كي. إذا كنت مرضعة.

! السياقة واستعمال الماكينات

ليس من المفروض أن يؤثر إسوبريم إس.كي. على قدرتك على السياقة أو استعمال الماكينات. لكن، من الممكن أن تحدث أعراض جانبية مثل دوام أو تشوش الرؤية. إذا كنت تعاني من هذه الأعراض الجانبية، فيُمنع عليك السياقة واستعمال الماكينات.

! معلومات مهمة عن قسم من مركبات الدواء

تحتوي الكبسولات على سكروز (نوع معين من السكر). إذا أخبرك الطبيب بأنك لا تستطيع هضم سكريات معينة، عليك استشارة الطبيب قبل تناول هذا الدواء.

إسوبريم إس.كي. 20 ملغ – تحتوي كل كبسولة على ما يقارب 20.0 - 22.9 ملغ سكروز.
إسوبريم إس.كي. 40 ملغ – تحتوي كل كبسولة على ما يقارب 40.0 - 45.8 ملغ سكروز.

3. كيف تستعمل الدواء؟

يجب استعمال المستحضر دائماً حسب تعليمات الطبيب. يجب عليك الفحص مع الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكن متأكدًا فيما يتعلق بالجرعة وبطريقة العلاج بالمستحضر. الجرعة وطريقة العلاج سيحددهما الطبيب، فقط.

سيشرح لك الطبيب بخصوص تناول الدواء (عدد الكبسولات ومتى عليك تناولها). قوة الكبسولة وفترة العلاج يتم تحديدهما من قبل الطبيب وفقاً للمرض الذي تعاني منه.

إذا كنت تتناول الدواء لفترة طويلة (خاصة لأكثر من سنة)، من المحتمل أن يرغب طبيبك في إجراء فحوصات معينة. إذا طلب منك الطبيب تناول الدواء بحسب الحاجة، أخبر الطبيب إذا كان لديك تغيير في الأعراض.

يُمنع تجاوز الجرعة الموصى بها.

طريقة الاستعمال

- يمكن تناول الكبسولة في أي ساعة خلال اليوم.
- يمكن تناول الكبسولة مع الطعام أو على معدة فارغة.
- يجب بلع الدواء كاملاً مع نصف كأس من الماء، يُمنع مضغ أو سحق أجزاء الكبسولة.
- تحتوي الكبسولة على جزيئات مطلية (coated granules) لمنع تفكك الدواء من قبل الحمض في المعدة ولذلك من الضروري عدم سحق الجزيئات.
- المرضى الذين يواجهون صعوبة في بلع الكبسولة، بإمكانهم فتح الكبسولة ووضع مكوناتها في نصف كأس من الماء (يُمنع استعمال مياه غازية أو أي سائل آخر). يجب الخلط جيداً قبل الشرب (ستحصل على محلول غير صافٍ). بالإمكان الشرب حالاً أو خلال 30 دقيقة على الأكثر. يجب شطف الكأس بالماء والشرب وذلك من أجل التأكد من تناول بقية الدواء. تحتوي القطع الصلبة على دواء – يُمنع مضغها أو سحقها.

المسنون

لا حاجة لملاءمة الجرعة للمسنين.

إذا تناولت عن طريق الخطأ، جرعة أعلى أو إذا قام طفل بابتلاع كمية من الدواء عن طريق الخطأ فتوجه فوراً إلى الطبيب أو إلى غرفة الطوارئ في المستشفى، وأحضر علبة الدواء معك.

إذا نسيت تناول هذا الدواء في الوقت المحدد، فيجب تناول جرعة حال تذكرك ذلك. لكن، إذا تذكرت قريباً من وقت تناول الجرعة التالية، فيُمنع تناول الجرعة التي نسيتها، بل قم بتناول الجرعة التالية في وقتها المحدد.

كيف تستطيع أن تساهم في نجاح العلاج؟

عليك إكمال العلاج الموصى به من قبل الطبيب.

حتى إذا طرأ تحسن على حالتك الصحية، يُمنع التوقف عن العلاج بالدواء بدون استشارة الطبيب. يجب الحرص على تطبيق تعليمات تناول الدواء بدقة واسأل الطبيب في حال وجود أي شك.

يُمنع تناول الأدوية في الظلام! تحقق من المصق على عبوة الدواء ومن الجرعة الدوائية في كل مرة تتناول فيها دواء. ضع النظارات الطبية إذا كنت بحاجة إليها.

4. الأعراض الجانبية

كما بكل دواء، قد يسبب استعمال إسوبريم إس.كي. أعراضًا جانبية لدى قسم من المستخدمين. لا تصدم عند قراءة قائمة الأعراض الجانبية. من المحتمل ألا تعاني من أيٍّ منها.

الأعراض الجانبية التي تقتضي اهتمامًا خاصًا:

أوقف العلاج وتوجه فورًا إلى الطبيب في الحالات التالية:

- أصوات صفير فجائية في التنفس، ضيق تنفس، انتفاخ الشفتين، اللسان والحجرة أو الجسم، طفح جلدي، إغماء أو صعوبات في البلع – هذه علامات لرد فعل تحسسي حاد.
- احمرار في الجلد مصحوب بحويصلات أو تقشر. من المحتمل أيضًا حدوث حويصلات وحالات نزف من الشفتين، العينين، الفم، الأنف والأعضاء التناسلية. هذه ممكن أن تكون متلازمة ستيفن جونسون أو انحلال البشرة النخري السمي (toxic epidermal necrolysis).
- اصفرار الجلد واصفرار بياض العينين، بول داكن اللون وإرهاق قد تكون أعراض لمشاكل في الكبد. هذه الأعراض نادرة وتؤثر على أقل من 1 – 1,000 شخص.

أعراض جانبية شائعة، تظهر في فترات متقاربة (تؤثر على حتى مستعمل واحد من بين 10):

- صداع
- إسهال، ألم بطن، إمساك، غازات
- حالات غثيان وتقيؤات

أعراض جانبية غير شائعة (تؤثر على حتى مستعمل واحد من بين 100):

- انتفاخ الرجلين والكاحلين
- مشاكل في النوم (أرق)
- دوار، شعور بالوخز ("دبابيس وإبر")
- نعاس
- شعور بالدوار (فيرتيغو)
- جفاف في الفم
- تغييرات في فحوصات الدم لوظائف الكبد
- طفح جلدي، حويصلات وحكة في الجلد
- كسور في الحوض، في رسغ اليد أو في العمود الفقري (عند استعمال إسوبريم إس.كي. بجرعات مرتفعة ولفترة طويلة)
- ارتفاع في إنزيمات الكبد

أعراض جانبية نادرة (تؤثر على حتى مستعمل واحد من بين 1,000):

- مشاكل في الدم مثل انخفاض في الخلايا البيضاء أو الصفائح – التي ممكن أن تؤدي إلى ضعف، كدمات أو زيادة في خطورة حصول حالات عدوى.
- مستويات منخفضة من الصوديوم في الدم - يمكن أن تتسبب ضعف عام، تقيؤات وتقلصات
- تملل، ارتباك، اكتئاب
- تغييرات في المذاق
- مشاكل في العينين مثل تشوش الرؤية
- ضيق تنفس مفاجئ (تضييق القصبة الهوائية)
- عدوى في الفم
- عدوى فطرية التي قد تؤثر على الأمعاء
- مشاكل في الكبد، بما في ذلك يرقان الذي يمكن أن يؤدي إلى اصفرار الجلد، بول داكن اللون وإرهاق
- تساقط الشعر
- طفح جلدي عند التعرض للشمس
- آلام مفاصل
- آلام عضلات
- شعور بالمرض وانعدام الطاقة
- تعرق زائد

أعراض جانبية نادرة جدًا (تؤثر على حتى مريض واحد من بين 10,000):

- ظهور مفاجئ لطفح جلدي شديد، حويصلات أو تقشر الجلد. من الممكن أن يكون هذا الأمر مصحوبًا بسخونة مرتفعة وآلام مفاصل (حمامة متعددة الشكل، متلازمة ستيفن جونسون أو انحلال البشرة النخري السمي - toxic epidermal necrolysis).
- تغييرات في تعداد الدم، بما في ذلك ندرة المحببات (Agranulocytosis – انخفاض في خلايا الدم البيضاء)
- عدوانية
- هلوسة
- مشاكل خطيرة في الكبد، التي تؤدي إلى فشل في عمل الكبد وإلى التهاب في الدماغ
- ضعف عضلي
- مشاكل خطيرة في الكلى
- تضخم الثديين لدى الرجال

أعراض جانبية نسبة شيوها غير معروفة (لا يمكن تحديد تواترها من المعلومات المتوفرة):

- نسب مغنيزيوم منخفضة في الجسم: قد تكون هذه المشكلة خطيرة. نسب مغنيزيوم منخفضة في الجسم ممكن أن تحدث لدى أشخاص معينين الذين تناولوا مستحضرات طبية من مجموعة مثبط مضخة البروتون (مضخة الحموضة في المعدة) مثل إسوبريم إس.كي. على الأقل لثلاثة أشهر. إذا انخفضت نسب المغنيزيوم، من المحتمل ظهور علامات نسب لسب المغنيزيوم المنخفضة.

الرجاء إبلاغ طبيبك بشكل فوري إذا كنت تشعر بالعلامات التالية:

- دوام
- توهان
- إرهاق
- اختلاجات
- ارتفاع في وتيرة القلب
- تقلصات عضلية لا إرادية
- نسبة منخفضة من المغنيزيوم في الدم، يمكن أن تؤدي إلى نسبة منخفضة للكالسيوم في الدم و/ أو إلى نسبة منخفضة من البوتاسيوم في الدم.

إذا طُلب منك تناول إسوبريم إس.كي. لفترة طويلة، يستطيع طبيبك فحص مستويات المغنيزيوم في جسمك قبل أو أثناء العلاج مع إسوبريم إس.كي.

- التهاب في الأمعاء (الذي يسبب الإسهال)
- طفح جلدي، الذي يكون عادة بالدمج مع آلام المفاصل

في حالات نادرة جدًا، قد يؤثر إسوبريم إس.كي. على كريات الدم البيضاء وأن يسبب فشلًا مناعيًا. إذا كنت تعاني من عدوى مع علامات مثل سخونة مع هبوط شديد في الحالة العامة أو سخونة مصحوبة بعلامات عدوى موضعية مثل حالات صداع وآلم في الرقبة، الحنجرة أو الفم أو صعوبات في التبول، عليك استشارة الطبيب بأسرع وقت ممكن من أجل استبعاد إمكانية حدوث نقص في خلايا الدم البيضاء (ندرة المحببات - Agranulocytosis) وذلك بواسطة فحص دم. عليك إبلاغ الطبيب بأنك تستعمل إسوبريم إس.كي.

إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقم أحد الأعراض الجانبية أو إذا عانيت من أعراض جانبية غير مذكورة في النشرة، عليك استشارة الطبيب.

التبليغ عن الأعراض الجانبية

من الممكن تبليغ وزارة الصحة عن أعراض جانبية من خلال الضغط على الرابط "التبليغ عن أعراض جانبية نتيجة لعلاج دوائي" الموجود على الصفحة الرئيسية في موقع وزارة الصحة (www.health.gov.il) الذي يحولك إلى استمارة عبر الإنترنت للتبليغ عن الأعراض الجانبية، أو عبر دخول الرابط:

<https://sideeffects.health.gov.il>

5. كيف يخزن الدواء؟

- تجنّب التسمّم! يجب حفظ هذا الدواء، وكلّ دواء آخر، في مكان مغلق، بعيدًا عن متناول أيدي ومجال رؤية الأولاد و/أو الأطفال، وهكذا تتجنّب التسمّم. لا تسبّب التقبُّر بدون تعليمات صريحة من الطبيب.
- يُمنع تناول الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية (exp. date) الظاهر على العبوة. تاريخ انتهاء الصلاحية ينسب إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.
- شروط التخزين
- يُمنع تخزين هذا الدواء بدرجة حرارة تزيد عن 30 C°. يجب حفظ هذا الدواء في العلبة الأصلية للحماية من الرطوبة.
- يُمنع تخزين أدوية مختلفة في عبوة واحدة.

6. معلومات إضافية

بالإضافة إلى المادة الفعالة، يحتوي الدواء، أيضًا:

محتوى الكبسولة:

Sugar spheres (containing maize starch and sucrose), methacrylic acid-ethyl acrylate copolymer, methyl cellulose, talc, triethyl citrate, titanium dioxide, glycerol monostearate, polysorbate 80,

غلاف الكبسولة:

Hypromellose, titanium dioxide (E171), purified water, potassium chloride, carrageenan, iron oxide red

جسم الكبسولة:

Hypromellose, titanium dioxide (E171), purified water, potassium chloride, carrageenan, iron oxide red

حبر الطباعة:

Black ink

كيف يبدو الدواء وماذا تحوي العبوة:

كبسولات إسوبريم إس.كي. 20 ملغ: كبسولة صلبة ذات لون زهري فاتح غير شفاف، مع الأحرف ES مطبوعة على غلاف الكبسولة، والرقم 20 مطبوع على جسم الكبسولة. تحتوي الكبسولة على جزيئات كروية.

كبسولات إسوبريم إس.كي. 40 ملغ: كبسولة صلبة ذات لون زهري غير شفاف، مع الأحرف ES مطبوعة على غلاف الكبسولة، والرقم 40 مطبوع على جسم الكبسولة. تحتوي الكبسولة على جزيئات كروية.

تحتوي كل عبوة على 28 كبسولة (4 شرائط من 7 كبسولات).

صاحب التسجيل وعنوانه:

صاحب التسجيل: كي. إس. كيم انترنشنال م.بض شارع يغال ألون 94، تل- أيبب

اسم المنتج وعنوانه:

Esteve Pharmaceuticals,
S.A C/ Sant Martí 75-97,
Polígono Industrial,
Martorelles, 08107
Barcelona, Spain

تمّ تحديد صيغة هذه النشرة من قِبل وزارة الصحة وتمت ملاءمة محتواها لنشرة المستحضر الأصلي والمصادقة عليه من قِبل وزارة الصحة في آب 2017 ويتم تحديثها في نوفمبر 2019.

رقم تسجيل الدواء في سجل الأدوية الرسمي في وزارة الصحة:

إسوبريم إس.كي. 20 ملغ: 162-75-35708

إسوبريم إس.كي. 40 ملغ: 162-76-35709

لتبسيط قراءة هذه النشرة وتسهيلها ورد النص بصيغة المذكّر. مع هذا فالدواء معدّ لكلا الجنسين.