

עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים (תכשירים) התשמ"ו – 1986

התרופה משווקת על פי מרשם רופא בלבד

טרמפיה™ מזרק/מזרק עט מוכן לשימוש, 100 מ"ג

כל מזרק או מזרק עט מוכן לשימוש מכילים:

גוסלקומב 100 מ"ג/1 מ"ל

Guselkumab 100 mg/1 ml

חומרים בלתי פעילים ואלרגניים בתכשיר - ראה סעיף 6 "מידע נוסף"

קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש בתרופה. עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח.

תרופה זו נרשמה לטיפול עבורך. אל תעביר אותה לאחרים. היא עלולה להזיק להם אפילו אם נראה לך כי מצבם הרפואי דומה.

1. למה מיועדת התרופה?

טרמפיה מיועדת לטיפול במחלת ספחת (פסוריאזיס) רובדית בדרגת חומרה בינונית עד קשה במטופלים בוגרים המועמדים לטיפול סיסטמי או פוטותרפיה.

קבוצה תרפויטית: מעכבי אינטרלוקינים

טרמפיה מכילה את החומר הפעיל גוסלקומב שהינו סוג של חלבון הנקרא נוגדן מונוקלונלי. התרופה פועלת על ידי חסימת הפעילות של חלבון הנקרא IL-23, אשר נוכח ברמות גבוהות באנשים הסובלים מפסוריאזיס.

התרופה יכולה לשפר את מצב העור ומראה הציפורניים ולהפחית תסמינים כגון קשקשת, השרת קשקשים, קילופים, גרד, כאב ותחושת שריפה.

2. לפני השימוש בתרופה

✘ אין להשתמש בתרופה אם:

• הינך אלרגי לגוסלקומב או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה (כמפורט בסעיף 6). אם הינך חושב שאתה עלול להיות אלרגי, היוועץ ברופא לפני השימוש בתרופה.

• הינך סובל מזיהום פעיל, לרבות שחפת פעילה.

⚠ אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה:

⚠ לפני הטיפול בטרמפיה ספר לרופא אם:

• הינך מטופל בגין זיהום שאתה סובל ממנו.

• הינך סובל מזיהום שאינו חולף או שהזיהום שב וחוזר.

• הינך סובל משחפת או אם היית במגע קרוב עם אדם הסובל משחפת.

• אם הינך חושב שיש לך זיהום או שהינך סובל מתסמיני זיהום (ראה מטה תחת סעיף "שים לב לזיהומים ותגובות אלרגיות").

• קיבלת לאחרונה או שהינך מתכנן לקבל חיסון במהלך הטיפול עם טרמפיה.

אם אינך בטוח אם אחד הסעיפים מעלה רלוונטי עבורך, היוועץ ברופא, ברוקח או באחות לפני השימוש בתרופה.

⚠ שים לב לזיהומים ותגובות אלרגיות

טרמפיה עלולה לגרום לתופעות לוואי חמורות הכוללות תגובות אלרגיות וזיהומים. עליך לעקוב אחר סימנים של מצבים אלו בתקופת השימוש בטרמפיה. יש להפסיק את השימוש בטרמפיה ולדווח לרופא מיד או לפנות לעזרה רפואית מיידית, אם הינך מבחין בסימנים כלשהם המעידים על תופעות אלרגיות חמורות אפשריות או זיהום.

סימני זיהומים יכולים לכלול חום או תסמינים דמויי שפעת; כאבי שרירים; שיעול; קוצר נשימה; תחושת צריבה/שריפה בעת מתן שתן או מתן שתן בתדירות גבוהה מהרגיל; כיח דמי; ירידת משקל; שלשול או כאב בטן; עור חמים, אדמומי או כאוב או פצעים על הגוף ששונים ממחלת הפסוריאזיס.

תגובות אלרגיות חמורות, שיכולות לכלול את התסמינים הבאים: נפיחות של הפנים, השפתיים, הפה, הלשון או הגרון, קושי בבליעה או קשיי נשימה וחרלת, נצפו בשימוש עם טרמפיה (ראה סעיף "תופעות לוואי חמורות" בפרק 4 "תופעות לוואי").

⚠ שימוש בילדים ומתבגרים

טרמפיה איננה מומלצת לשימוש בילדים ובמתבגרים מתחת לגיל 18, היות ולא נחקרה בקרב קבוצות גיל אלו.

⚠ תגובות בין תרופתיות

אם אתה לוקח, או אם לקחת לאחרונה, תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח.

כמו כן, אם לאחרונה קיבלת חיסון או שהינך עומד לקבל חיסון, יש ליידע את הרופא. אין לקבל חיסונים מסוג מסוים (חיסון חי) בעת הטיפול בטרמפיה.

⚠ הריון והנקה

• אין להשתמש בתרופה בהריון היות והשפעת התרופה בנשים בהריון איננה ידועה. ההמלצה לנשים בגיל הפריין הינה להמנע מכניסה להריון, ולהשתמש באמצעי מניעה במהלך הטיפול בתרופה ולפחות 12 שבועות לאחר לקיחת המנה האחרונה של טרמפיה.

שוחחי עם הרופא אם הינך בהריון, חושבת שאת עשויה להיות בהריון או מתכננת הריון.

• שוחחי עם הרופא אם הינך מניקה או מתכננת להניק. את והרופא תגיעו להחלטה האם להניק או להשתמש בטרמפיה.

⚠ נהיגה ושימוש במכוונות

לא סביר כי טרמפיה תשפיע על יכולתך לנהוג ולהפעיל מכוונות.

⚠ מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה

התרופה מכילה סוכרוז. ראה גם פרק 6 - "מידע נוסף".

3. כיצד תשתמש בתרופה?

תמיד יש להשתמש לפי הוראות הרופא.

עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אינך בטוח.

באיזה מינון ניתנת התרופה ולאיזה פרק זמן?

המינון ואופן הטיפול יקבעו על ידי הרופא בלבד. המינון המקובל הינו:

• המינון של התרופה הינו 100 מ"ג (תכולת מזרק או מזרק עט אחד מוכן לשימוש) הניתן בהזרקה מתחת לעור. הטיפול ינתן על ידי רופא או אחות.

• המנה השנייה תינתן 4 שבועות לאחר מתן המנה הראשונה. לאחר מכן, תינתן מנה כל 8 שבועות.

בתחילה, הרופא או האחיות יזריקו לך את התרופה. עם זאת, ייתכן שתחליט יחד עם הרופא שלך כי תוכל להזריק את התרופה עצמאית. במקרה זה, תקבל הדרכה לגבי הדרך הנכונה להזריק טרמפיה. יש לשוחח עם הרופא או האחיות במקרה ויש לך איזשהן שאלות הנוגעות להזרקה עצמית של התרופה. חשוב לא להזריק עצמאית את התרופה עד אשר קיבלת הדרכה מתאימה מהרופא או האחיות.

לתיאור מפורט של הנחיות השימוש יש לקרוא את סעיף "אופן השימוש" בהמשך.

יש להשתמש בתרופה זו בזמנים קצובים כפי שנקבע על ידי הרופא המטפל. יש להתמיד בטיפול כפי שהומלץ על ידי הרופא.

אם נטלת או קיבלת בטעות מינון גבוה יותר או שקיבלת את התרופה מוקדם ממה שהרופא רשם:

צור קשר מיד עם הרופא.

אם בטעות בלע ילד מן התרופה, פנה מיד לרופא או לחדר מיון של בית חולים והבא ארזית התרופה איתך.

אם שכחת ליטול את התרופה:

צור קשר עם הרופא.

אם הינך מפסיק את הטיפול בתרופה:

אין להפסיק את הטיפול בתרופה ללא התייעצות עם הרופא. אם הינך מפסיק את הטיפול, תסמיני הפסוריאזיס עלולים לחזור.

אין לעבור על המנה המומלצת

אין ליטול תרופות בחושך! בדוק התווית והמנה בכל פעם שהינך נוטל תרופה. הרכב משקפיים אם הינך זקוק להם.

אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היוועץ ברופא או ברוקח.

4. תופעות לוואי

כמו בכל תרופה, השימוש בטרמפיה עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשימת תופעות הלוואי. ייתכן ולא תסבול מאף אחת מהן.

תופעות לוואי חמורות (מופיעות ב- 10–1 משתמשים מתוך 1,000)

ספר לרופא או פנה לקבלת עזרה רפואית מיידית אם מופיעה אחת מתופעות הלוואי הבאות:

תגובות אלרגיות חמורות אפשריות – הסימנים יכולים לכלול:

• קושי בנשימה או בבליעה.

• נפיחות באזור הפנים, השפתיים, הלשון או הגרון.

• גרד חמור בעור, עם פריחה אדומה או בולטת.

תופעות לוואי נוספות

תופעות הלוואי הבאות הינן קלות עד בינוניות. אם אחת מתופעות לוואי אלו הופכת לחמורה פנה לרופא מיידית.

תופעות לוואי שכיחות מאוד (מופיעות ביותר ממשתמש אחד מעשרה)

• זיהומים בדרכי הנשימה העליונות

תופעות לוואי שכיחות (מופיעות ב- 10–1 משתמשים מתוך 100)

• כאב ראש

• כאבי מפרקים (ארתרלגיה)

• שלשול

• דלקת המעי (גסטרואנטריטיס)

• אדמומיות, גירוי או כאב באתר ההזרקה

• חרלת (סרפדת)

• זיהומים פטרייתיים בעור, למשל בין האצבעות

• זיהום הרפס סימפלקס

תופעות לוואי שאינן שכיחות (מופיעות ב- 10–1 משתמשים מתוך 1,000)

• תגובה אלרגית

• פריחה בעור

אם הופיעה תופעת לוואי, אם אחת מתופעות הלוואי מחמירה, או כאשר אתה סובל מתופעת לוואי שלא הוזכרה בעלון, עליך להתייעץ עם הרופא.

דיווח על תופעות לוואי

ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי עקב טיפול תרופתי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות (www.health.gov.il) המפנה לטופס המקוון לדיווח על תופעות לוואי

<https://sideeffects.health.gov.il>.

5. איך לאחסן את התרופה?

• מנע הרעלה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעלה. אל תגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא.

• אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (Exp. Date). המופיע על גבי האריזה. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו חודש.

• אחסן בקירור 2°C - 8°C. אין להקפיא.

• יש להגן מאור.

• אין לנער.

• אין להשתמש בתרופה אם הינך מבחין כי התמיסה עכורה, שינתה את צבעה או שמכילה חלקיקים גדולים.

לפני השימוש, הוצא את הקרטון מחוץ למקרר. יש להשאיר את המזרק או המזרק עט בתוך הקרטון עד להשגת טמפרטורת חדר על ידי המתנה של 30 דקות.

• תרופה זו מיועדת לשימוש חד פעמי בלבד.

6. מידע נוסף

נוסף על החומר הפעיל התרופה מכילה גם:

Sucrose, L-Histidine, L-Histidine monohydrochloride monohydrate, Polysorbate 80, Water for injection

תכולת סוכרוז - 79 מ"ג.

כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה:

טרמפיה הינה נוזל להזרקה צלול וחסר צבע עד גוון צהבהב בהיר. כל קופסה מכילה מזרק או מזרק עט אחד מוכן לשימוש.

בעל הרישום וכתובתו: ג"י-סי הלת' קר בע"מ, קיבוץ שפיים 6099000, ישראל.

יצרן: סילג בע"מ, הוצ'סטרה 201-8200, שפהאוזן, שוויץ.

נערך ביולי 2020.

מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות:

160-54-35346

לשם הפשטות ולהקלת הקריאה, עלון זה נוסח בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.

אופן השימוש:

להלן הוראות שימוש נפרדות עבור מזרק מוכן לשימוש ולאחר מכן הוראות שימוש נפרדות עבור מזרק עט מוכן לשימוש.

אופן השימוש מזרק מוכן לשימוש טרמפיה:

במידה ורופאך יחליט כי הינך או מי שמטפל בך יכול להזריק לך טרמפיה בביתך, יהיה עליך לעבור הדרכה מידי איש צוות רפואי בנוגע לשימוש נכון, הכנה והזרקת טרמפיה באמצעות המזרק המוכן לשימוש (ראה איור 1), לפני שתוכל להזריק את התרופה בעצמך.

טרמפיה מגיעה כמזרק חד מנתי מוכן לשימוש המכיל מנה של 100 מ"ג. כל מזרק מוכן לשימוש ניתן לשימוש חד פעמי בלבד. יש להשליך את המזרק המשמש (ראה שלב 3) לאחר שימוש אחד גם אם איננו ריק לחלוטין. אין לעשות שימוש חוזר במזרק טרמפיה מוכן לשימוש.

אין לנסות להזריק טרמפיה באופן עצמי בטרם קיבלת הדרכה מאיש צוות רפואי בנוגע לשימוש הנכון במזרק התכשיר.

יש לקרוא את הנחיות השימוש במזרק המוכן לשימוש לפני כל הזרקה. ייתכן וההנחיות יתעדכנו מעת לעת. עלון זה איננו מחליף התייעצות עם הרופא בנוגע למצבך הרפואי או הטיפול שלך.

טרמפיה מזרק מוכן לשימוש מיועד להזרקה תת עורית, **ולא** להזרקה תוך שרירית או הזרקה לווריד. לאחר ההזרקה, המחסט תחזור לגוף המזרק וינעיל במקום.

תנאי אחסון

יש לאחסן במקרר (2°C-8°C). אין להקפיא.

יש להרחיק מהישג ידם של ילדים.

אין לנער את מזרק טרמפיה.

יש לשמור בארזית הקרטון המקורית להגנה מאור ונזק מכני.

חלקי המזרק המוכן לשימוש

לפני השימוש:

ראה איור 2.

לאחר השימוש:

ראה איור 3.

ליצור ההזרקה תזדקק לציוד הבא:

1 מזרק טרמפיה מוכן לשימוש

ציוד שאיננו נכלל בארזית מזרק טרמפיה:

1 ספוגית/מגבון טבול באלכוהול

1 כדור צמר גפן או פד גאזה

1 אגד מידבק

1 מכל איסוף לחפצים חדים (ראה שלב 3).

1. הכנה להזרקה

בדיקת הקופסה (ראה איור 4)

הוצא את קופסת מזרק הטרמפיה מהמקרר.

יש להשאיר את המזרק בתוך הקופסה ולהניח אותו על משטח ישר בטמפרטורת החדר למשך **30 דקות** לפני השימוש.

אין לחמם את המזרק המוכן לשימוש בכל דרך אחרת.

בדוק את תאריך התפוגה ('EXP') שעל גב הקופסה. במידה ותאריך התפוגה חלף, **אין** להשתמש במזרק.

אין להשתמש בטרמפיה במידה והקופסה איננה שלמה/איננה סגורה היטב. עליך ליצור קשר עם הרופא או הרוקח שסיפק לך את התרופה.

בחירת אתר ההזרקה (ראה איור 5)

בחר את אחד מהאזורים הבאים להזרקה:

• **קדמת הירך** (מומלץ)

• אזור הבטן התחתונה, במרחק של לפחות חמישה סנטימטרים מהטבור.

• אחורי החלק העליון של הזרוע (רק במידה ואתה מקבל את הזריקה מידי איש צוות רפואי או מטפל).

אין להזריק לעור רגיש, פגוע, אדום, קשה, עבה, קשקשי או נגוע בפסוריאזיס. אין להזריק לאזורים עם צלקות או סימני מתיחה.

ניקוי האזור המיועד להזרקה (ראה איור 6)

שטוף ידיך ביסודיות באמצעות סבון ומים חמים. נגב את האזור המיועד להזרקה באמצעות מגבון עם אלכוהול ואפשר לו להתייבש. **אל** תיגע באזור זה שוב, ואל תנשוף עליו לפני ההזרקה.

בדיקת הנוזל שבמזרק (ראה איור 7)

הוצא את המזרק של טרמפיה מהקופסה.

בדוק את הנוזל שבמזרק בחלון התצוגה. יש לוודא כי הנוזל שבמזרק צלול עד צהבהב במקצת. הנוזל עשוי להכיל מספר חלקיקים זעירים, שקופים למחצה או לבנים. ייתכן ותראה גם בועת אוויר אחת או יותר. זהו מצב תקין.

אין להשתמש במידה והנוזל שינה צבעו או עכור או מכיל חלקיקים גדולים. אם אינך בטוח, עליך ליצור קשר עם הרופא או הרוקח שסיפק לך את התרופה.

2. הזרקת טרמפיה באמצעות מזרק מוכן לשימוש

הסרת מכסה המחסט (ראה איור 8)

אחוז בגוף המזרק ביד אחת ומשוך במכסה המחסט החוצה באמצעות היד השנייה. אתה עשוי להבחין בטיפת נוזל בקצה המחסט - זהו מצב נורמלי.

יש להזריק טרמפיה בתוך 5 דקות מרגע הסרת מכסה המחסט.

אין להחזיר את מכסה המחסט, היות וזה עלול לפגום במחסט.

אין לגעת במחסט ואין לאפשר מגע של המחסט עם משטח כלשהו.

אין להשתמש במזרק במידה והוא נפל. במקרה זה עליך ליצור קשר עם הרופא או הרוקח שסיפק לך את התרופה.

מיקום האצבעות והחדרת המחסט (ראה איור 9)

יש למקם את האגודל, האצבע והאמה **ישירות מתחת לעוגן האצבעות** כפי שניתן לראות בתמונה.

אין לגעת בעוגן האצבעות או באזור שמעליו, היות והדבר עלול להפעיל את מנגנון הבטיחות של המחסט.

צבטן קלות ביד השנייה את העור באתר ההזרקה. יש למקם את המזרק בזווית של 45 מעלות לעור.

חשוב לצבוט מספיק עור על מנת לאפשר **הזרקה מתחת לעור** ולא לתוך השריר.

החדר את מחט המזרק בתנועה מהירה.

שחרור הצביטה ומיקום היד (ראה איור 10)

השתמש בידיך החופשית על מנת לאחוז בגוף המזרק המוכן לשימוש.

לחיצה על בוכנת המזרק (ראה איור 11)

יש למקם את האגודל של היד השנייה על בוכנת המזרק **ולחוץ עד הסוף עד לעצירת הבוכנה**.

שחרור האגודל מהבוכנה (ראה איור 12)

מגן הבטיחות יכסה את המחסט וינעל במקום, תוך הוצאת המחסט מהעור.

3. לאחר ההזרקה

השלכת המזרק (ראה איור 13)

השלך את המזרק המשומש של טרמפיה לתוך מכל המיועד לחפצים חדים.

אין להשליך את מזרק טרמפיה לאשפה הביתית.

אין לבצע שימוש חוזר במחטים ומזרקים.

בדוק את אתר ההזרקה (ראה איור 14)

ייתכן ותבחין בכמות מזערית של דם או נוזל באזור ההזרקה, מצב זה הינו נורמלי, הנח צמר גפן או פד גאזה על אזור ההזרקה ולחץ עד להפסקה מוחלטת של הדימום. **אין** לשפשף את האזור. במידת הצורך, הדבק אגד מידבק על האזור.

למידע נוסף פנה לרופא או לרוקח שלך.

אופן השימוש מזרק עט מוכן לשימוש טרמפיה:

אביזר לשימוש חד פעמי

חשוב

במידה ורופאך יחליט כי הינך או מי שמטפל בך יכול להזריק טרמפיה בביתך, יהיה עליך לעבור הדרכה מידי איש צוות רפואי בנוגע לשימוש נכון, הכנה והזרקת טרמפיה באמצעות המזרק עט המוכן לשימוש, לפני שתוכל להזריק את התרופה בעצמך.

יש לקרוא את הנחיות השימוש במזרק עט המוכן לשימוש לפני כל הזרקה. ייתכן וההנחיות יתעדכנו מעת לעת. עלון זה איננו מחליף התייעצות עם הרופא בנוגע למצבך הרפואי או הטיפול שלך.

יש לקרוא גם את העלון לצרכן של טרמפיה בתשומת לב לפני ההזרקה. במידה ויש לך שאלות פנה לרופא או לאחות.

תנאי אחסון

יש לאחסן במקרר (2°C-8°C). אין להקפיא.

יש להרחיק מהישג ידם של ילדים.

אין לנער את מזרק עט טרמפיה בכל זמן שהוא.

חלקי המזרק עט המוכן לשימוש (ראה איור 15)

הציוד לו תזדקק:

1 ספוגית/מגבון טבול באלכוהול

1 כדור צמר גפן או פד גאזה

1 אגד מידבק

1 מכל איסוף לחפצים חדים (ראה שלב 3).

1. הכנה להזרקה

בדיקת הקופסה (ראה איור 16)

הוצא את קופסת מזרק עט הטרמפיה מהמקרר.

יש להשאיר את המזרק עט בתוך הקופסה ולהניח אותו על משטח ישר בטמפרטורת החדר למשך 30 דקות לפני השימוש.

אין לחמם את המזרק עט המוכן לשימוש בכל דרך אחרת.

בדוק את תאריך התפוגה ('EXP') שעל גב הקופסה. במידה ותאריך התפוגה חלף, אין להשתמש במזרק עט.

אין להשתמש בטרמפיה במידה והקופסה איננה שלמה/איננה סגורה היטב. עליך ליצור קשר עם הרופא או הרוקח שסיפק לך את התרופה.

בחירת אתר ההזרקה (ראה איור 17)

בחר את אחד מהאזורים הבאים להזרקה:

• קדמת הירך (מומלץ)

• אזור הבטן התחתונה. אין להזריק לאזור המרוחק פחות מ-5 סנטימטרים מהטבור.

• אחורי החלק העליון של הזרוע (רק במידה ואתה מקבל את הזריקה מידי איש צוות רפואי או מטפל).

אין להזריק לעור רגיש, פגוע, אדום, קשה, קשקשי או לאזורים עם צלקות או סימני מתיחה.

שטיפת ידיים (ראה איור 18)

שטוף ידיך ביסודיות באמצעות סבון ומים חמים.

ניקוי האזור המיועד להזרקה

נגב את האזור המיועד להזרקה באמצעות מגבון עם אלכוהול ואפשר לו להתייבש. אל תיגע באזור זה שוב, ואל תנשוף עליו לפני ההזרקה.

בדיקת הנוזל שבמזרק עט (ראה איור 19)

הוצא את המזרק עט של טרמפיה מהקופסה.

בדוק את הנוזל שבמזרק עט בחלון התצוגה. יש לוודא כי הנוזל שבמזרק עט צלול עד צהבהב במקצת. הנוזל עשוי להכיל מספר חלקיקים זעירים, שקופים או לבנים. ייתכן ותראה גם בועת אוויר אחת או יותר. זהו מצב תקין.

אין להשתמש במידה והנוזל שינה צבעו או עכור או מכיל חלקיקים גדולים. אם אינך בטוח, עליך ליצור קשר עם הרופא או הרוקח שסיפק לך את התרופה.

2. הזרקת טרמפיה באמצעות מזרק עט מוכן לשימוש

סובב והסר את המכסה (ראה איור 20)

הרחק את ידיך ממגן המחסט לאחר הסרת המכסה.

יש להזריק טרמפיה בתוך 5 דקות מרגע הסרת המכסה.

אין להחזיר את המכסה, היות וזה עלול לפגום במחסט.

אין להשתמש במזרק עט במידה והוא נפל לאחר הסרת המכסה. במקרה זה עליך ליצור קשר עם הרופא או הרוקח שסיפק לך את התרופה.

מיקום המזרק עט על העור (ראה איור 21)

יש למקם את המזרק עט ישירות על העור (בזווית של כ-90 מעלות לאתר ההזרקה).

לחץ על ידית המזרק עט מטה (ראה איור 22)

התרופה מזורקת בזמן הלחיצה. בצע את הלחיצה במהירות הנוחה לך.

אין להרים את המזרק עט בזמן הלחיצה, מגן המחסט ינעל ולא יתקבל המינון המלא.

השלמת ההזרקה (ראה איור 23)

ההזרקה הושלמה ברגע שהידיט נלחצה עד הסוף מטה, נשמע צליל "קליק" והגוף הירוק איננו נראה לעין.

הרם את המזרק עט כלפי מעלה (ראה איור 24)

הפס הצהוב מעיד על כך שמגן המחסט נעול.

3. לאחר ההזרקה

השלכת המזרק עט המשומש (ראה איור 25)

השלך את המזרק עט המשומש של טרמפיה לתוך מכל המיועד לחפצים חדים מיד לאחר השימוש.

עם מילוי המכל יש לרוקנו בהתאם להנחיות שקיבלת על ידי הרופא או האחות.

בדוק את אתר ההזרקה (ראה איור 26)

ייתכן ותבחין בכמות מזערית של דם או נוזל באזור ההזרקה. הנח צמר גפן או פד גאזה על אזור ההזרקה ולחץ עד להפסקה מוחלטת של הדימום. אין לשפשף את האזור. במידת הצורך, הדבק אגד מידבק על האזור.

כעת ההזרקה הושלמה!

למידע נוסף פנה לרופא או לרוקח שלך.