

רופא/ה נכבד/ה
רוקח/ת נכבד/ת

חברת תרו מבקשת להודיעכם כי העלון לצרכן ולרופא של התכשיר Coumadin 1, 2, 2.5, 5 mg, tablets עודכנו.

בהודעה זו מצוינים רק הסעיפים בהם נעשו שינויים מהותיים בעלון לצרכן ובעלון לרופא. תוספות סומנו בצבע אדום, המחיקות סומנו בצבע כחול בקו-מחיקה. העלונים המעודכנים נשלחו למשרד הבריאות לצורך פרסומם במאגר התרופות שבאתר משרד הבריאות: www.health.gov.il וניתן לקבלם מודפסים על ידי פנייה לבעל הרישום: תרו תעשייה רוקחית בע"מ, רחוב הקיטור 14, ת.ד. 10347 מפרץ חיפה 2624761.

בברכה,
מרינה גולדמן
רוקחת ממונה

Coumadin 1, 2, 2.5, 5 mg, tablets

מרכיב פעיל:

Warfarin sodium 1, 2, 2.5, 5 mg

ההתוויה המאושרת לתכשיר:

Coumadin is indicated for the prophylaxis and/or treatment of venous thrombosis and its extension, and pulmonary embolis.
Coumadin is indicated for the prophylaxis and/or treatment of the thromboembolic complications associated with atrial fibrillation and/or cardiac valve replacement.
Coumadin is indicated to reduce the risk of death, recurrent myocardial infarction, and thromboembolic events such as stroke or systemic embolization after myocardial infarction.

עדכונים בעלון לצרכן:

תגובות בין-תרופתיות/אינטראקציות

יש ליידע את הרופא לפני שאתה לוקח את התרופות הבאות: מספר סוגים של תרופות המשמשות למניעת קרישת דם (כגון וורפרין, דיקומרול, פנפרוקומון, אצנוקומרול ופולואינדיון). ההשפעה של תרופות אלו עלולה להיות חזקה יותר כשנלקחות ביחד עם גלוקוזמין. מטופלים אשר נוטלים שילובים כאלה צריכים להיות מנוטרים בזהירות יתרה כאשר מתחילים או מסיימים טיפול עם גלוקוזמין.

תרופות אשר מגבירות את השפעת התרופה: יש ליידע את הרופא אם אתה לוקח: ויטמין K (בתוספי תזונה או בשמן כבד בקלה): ירידה פתאומית בצריכה של ויטמין K עלולה להגביר את ההשפעה של וורפרין;

תרופות אשר מפחיתות את השפעת התרופה: יש ליידע את הרופא אם אתה לוקח: ויטמין K (עליה בצריכה של ויטמין K עלולה להקטין את ההשפעה של וורפרין). בתוספי תזונה או בשמן כבד בקלה).

שימוש בתרופה ומזון

הימנע משתיית מיץ חמוציות או אשכוליות, או מנטילת מוצרי חמוציות או אשכוליות. אלו עלולים להגביר את השפעתה של התרופה.

תרו תעשייה רוקחית בע"מ

הקיטור 14,
ת.ד. 10347, מפרץ חיפה 2624761
טל: 04-8475700
פקס: 04-8727165

Interactions with food and food supplements

There are limited data on possible drug interactions with glucosamine, but increments in the INR parameter have been reported with oral vitamin K antagonists. Patients treated with oral vitamin K antagonists should therefore be closely monitored at the time of initiation or termination of glucosamine therapy.