

4. الأعراض الجانبية

كجمع الأدوية، قد يُنصح بتناول لوراستين أعراضًا جانبيةً لدى قسم من المستخدمين. لا تفزع عند قراءة قائمة الأعراض الجانبية، فمن المحتمل أن لا تتعارى مع أي منها. الأعراض الجانبية الأكثر انتشاراً التي تم الإبلاغ عنها لدى البالغين والأطفال فوق سن 12 عاماً هي:

- اغتسال
- صداع
- زيادة الشهية
- صعوبة في النوم.

الأعراض الجانبية الأكثر انتشاراً التي تم الإبلاغ عنها لدى الأطفال في سن 2-12 عاماً هي:

- صداع
- عصبية
- تعب

أعراض جانبية نادرة جداً (قد تؤثر في مستعمل واحد من بين 10,000)، كانت قد شوهدت أيضًا أثناء تسويق لوراتادين:

- رد فعل تحسسي حاد (يتضمن التورم)
- دوخة
- اختلاج
- وثيرة نظم قلب سريعة أو غير منتظمة
- غثيان
- جفاف الماء
- اضطرابات في الجهاز الهضمي
- مشاكل في الكبد
- تساقط الشعر
- طفح
- تعب

ونيرة العارض الجانبي التالي ليست معروفة:

- زيادة الوزن
- إذا ظهر عارض جانبي، إذا تفاقم أيٌّ من الأعراض الجانبية، أو إذا عانيت من عارض جانبي لم يذكر في النشرة، عليك استشارة الطبيب.

الإبلاغ عن الأعراض الجانبية.

يمكن إبلاغ وزارة الصحة بالأشعة الجانبية عبر الضغط على رابط "الإبلاغ عن الأعراض الجانبية بسبب العلاج الدوائي"، الموجود في الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة (www.health.gov.il)، الذي يوجهك إلى استماراة على الإنترنت للإبلاغ عن الأعراض الجانبية أو عبر الدخول إلى الرابط:

<https://sideeffects.health.gov.il>

5. كيف يُؤخذ لوراستين أعراض؟

- تجنب التسمم! يجب حفظ هذا الدواء، وكل دواء آخر، في مكان مغلق، بعيداً عن متداول أيدي ومحال رؤية الأولاد وأو الأطفال، وكذلك تجنب التسمم. لا تسبب التقيؤ دون تطليمات صريحة من الطبيب.
- يُنصح استخدام الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية (exp. date) الظاهر على العبوة. تاريخ انتهاء الصلاحية يناسب إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.

شروط التخزين: يُحفظ الدواء بدرجة حرارة تحت 25°C.

- لا يجوز تناول هذا الدواء إذا لاحظت تغييرًا أيًا كان في مظهر القرص.
- يُمنع إلقاء الأدوية في مياه الصرف الصحي أو حاوية القمامنة المنزلية. أسلال الصيدلي كيف عليك التخلص من الأدوية غير المستعملة. تساعد هذه الوسائل في الحفاظ على البيئة.

6. معلومات إضافية

- إضافة إلى المادة الفعالة، يحتوي الدواء أيضًا على:

Lactose monohydrate, maize starch, magnesium stearate.
يحتوي كل قرص على 71.3 ملغم لاكتوز (انظر أيضًا الفصل 2، "معلومات مهمة عن قسم من مكونات الدواء").

كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العبوة:

قرص بيضاء لونه أبيض مائل إلى الصفرة (off white)، وعليه رسمة قارورة مع قدر، خط شطر و "10" في جانب واحد، أما الجانب الآخر فهو أملس.

أحجام العبوة المسماة عليها: 7، 10، أو 20 قرصاً في العبوة. قد لا تنسّق كل أحجام العبوات.

صاحب التسجيل وعنوانه: باير إسرائيل م.ض، شارع هشارون 36، هود هشارون 45240.

اسم المنتج وعنوانه: شيريچ-يلاو، لايو. إن. في. بلجيكا، إيندومستريبارك 30، B-2220، هيسيل-أوب-دين-بريج.

تم تحرير النشرة في حزيران 2020.

رقم تسجيل الدواء في سجل الأدوية الرسمي في وزارة الصحة: 00-25-25872-00-133.

لتيسير قراءة هذه النشرة وتسهيلها ورد النصوص بصيغة المذكرة. على الرغم من ذلك، الدواء معد لأبناء كلا الجنسين.

نشرة للمستهلك بموجب أنظمة الصيادة (مستحضرات) - 1986

يُسوق الدواء دون وصفة طبية



لوراستين أعراض، 10 ملغ

يحتوي كل قرص على:
Loratadine 10 mg
لوراتادين 10 ملغم

للمقدمة الماء غير الفعالة انظر الفصل 6. انظر أيضًا الفصل 2 "معلومات مهمة عن قسم من مكونات الدواء".

تحذير هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء. إذا كانت لديك استفسارات إضافية، توجه إلى الطبيب أو الصيدلي.

عليك تناول المستحضر حسب التعليمات الواردة في بند الجرعة في هذه النشرة. استشر الصيدلي إذا كنت تحتاج إلى معلومات إضافية.

عليك التوجه إلى الطبيب في حال تفاقمت علامات المرض (أعراض) أو إذا لم تتحسن.

1. لم أعد هذا الدواء؟

يستخدم لوراستين أعراض لعلاج الركam التحسسي والآعراض المرافقة له، مثل السعال، سيلان الأنف أو حكة في الأنف، وحرقة في العينين أو حكة، ولعلاج حساسية الجلد - شرى (Urticaria).

كيف يعمل الدواء؟

يخفف لوراستين أعراض أعراض الحساسية بواسطة من تأثيرات مادة تدعى هيستامين، ينتجها جسمك عندما تعاني من حساسية المادة. ما

الفصيلة العلاجية: يحتوي الدواء على المادة الفعالة لوراتادين، التي تنتهي إلى مجموعة أدوية تسمى "مضادات الHistamine".

2. قبل استعمال الدواء

يمنع استعمال الدواء إذا:

- كنت حساساً (الديك حساسية) لloratadine، أو لأي واحد من المركبات الأخرى التي يحتوي عليها هذا الدواء (للمقدمة الماء غير الفعالة، انظر الفصل 6).

تحذيرات خاصة متعلقة باستعمال الدواء

- قبل العلاج بـLoratadine أعراض أخير الطبيب، الصيدلي أو الممرضة إذا:

- كنت تعاني من مرض في الكبد.

- كنت على وشك اجتياز خووصات حساسية الجلد. لا يجوز تناول لوراستين أعراض قبل يومين من هذه الفحوصات. ذلك لأن الدواء قد يؤثر في نتائج الفحص.

إذا كانت إحدى الحالات المذكورة أعلاه تتطابق عليك أو إذا لم تكون متأكداً، عليك استشارة الطبيب، الصيدلي أو الممرضة قبل تناول لوراستين أعراض.

الأطفال والمراهقون

لا يجوز إعطاء آخر ملائمة أكثر للأطفال الذين أعمارهم أقل من 6 سنوات، أو الأطفال الذين وزنهم أقل من 30 كغم. هناك طرق إعطاء آخر ملائمة أكثر للأطفال الذين أعمارهم أقل من 6 سنوات أو الذين وزنهم أقل من 30 كغم.

الأطفال دون سن عامين:

يجب هناك بيانات ثبتت أمان ونجاعة لوراستين أعراض لدى هذه الفئه العمرية.

التفاعلات/إرداد الفعل بين الأدوية:

إذا كنت تتناول، أو تناولت مؤخرًا أخرى أدوية أخرى، بما فيها أدوية بدون وصفة طيبة ومكملات غذائية، أخير الطبيب، الصيدلي أو الممرضة بذلك.

يكون احتلال خرث أعراض جانبية أعلى عند تناول لوراستين أعراض مع أدوية تؤثر في نشاط إنزيمات الكبد المسؤولة عن تفكيك الأدوية في الكبد. مع ذلك، لم تشاهد في التجارب السريرية أعراض جانبية، رغم أنه تم تناول أدوية تؤثر في هذه الإنزيمات.

استعمال الدواء والغذاء

يمكن تناول لوراستين أعراض مع أو من دون طعام.

استعمال الدواء واستهلاكه الكحولي

لم يثبت أن لوراستين أعراض يزيد من تأثيرات المشروبات الكحولية.

الحمل، الإرضاع، والخصوبة

إذا كنت حاملًا، تذكر أنك قد تكونين حاملًا، أو تخططين للحمل، عليك استشارة الطبيب أو الصيدلي قبل تناول هذا الدواء.

استنادًا إلى المعطيات المتوفرة، لم يشاهد ضرر لدى الجنين أو المولود بسبب تناول المستحضر. ولكن يحسن الامتناع عن استعمال المستحضر أثناء الحمل.

يُنصح المادة الفعالة في الدواء، لوراتادين، في حليب الأم، لهذا يجب الامتناع عن استعمال الدواء أثناء الرضاعة.

السيادة واستعمال الماكينات

في التجارب السريرية، تبين أن القدرة على القيادة لم تتضرر لدى المعالجين الذين تناولوا لوراستين. عند إعطاء لوراستين أعراض وقف الجرعة الموصى بها، لا يتوقف أن يُنصح بهم نعاسًا أو احتفاظ اليقطة.

مع ذلك، في أحيان نادرة جدًا، يشعر بعض الأشخاص بنعاس، الذي قد يؤثر في قدرتهم على القيادة أو تشغيل الماكينات.

معلومات مهمة عن قسم من مكونات الدواء

يحتوي الدواء على لاكتوز، لهذا إذا أخبرتك طبيبك أنك تعاني من عدم القدرة على تحمل سكريات معينة، اتصل بطبيبك قبل تناول هذا الدواء (انظر أيضًا الفصل 6 "معلومات إضافية").

3. كيف تستعمل لوراستين أعراض؟

عليك أن تفحص مع الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكون متأكداً فيما يتعلق بالجرعة وبطريقة العلاج بالمستحضر.

الجرعة الموصى بها عادة هي:

البالغون والأطفال بدءاً من سن 6 سنوات فصاعداً، الذين وزنهم أكثر من 30 كغم:

قرص واحد مرة في اليوم مع كأس من الماء، مع أو من دون طعام. من المهم معرفة وزن سبائك وذلك لضمان إعطائه الجرعة الدوائية الصحيحة. إذا كان لديك شك حول وزن الطفل، عليك معرفة وزنه قبل تناول المستحضر.

وزن الجسم 30 كغم أو أقل:

لا يجوز إعطاء لوراستين أعراض. هناك طريقة إعطاء أخرى ملائمة أكثر للأطفال الذين أعمارهم أقل من 6 سنوات أو الذين وزنهم 30 كغم أو أقل.

لوراستين أعراض ليس معداً للأطفال دون سن عامين أو الذين وزنهم 30 كغم أو أقل.

البالغون والأطفال مع مشاكل الكبد

إذا كنت تعاني من مشاكل في الكبد، عليك التوجه إلى الطبيب أو الصيدلي. قد يوصي لك بتناول الجرعة الموصى بها مررت يومين (يوم تناولها، ويوم لا تتناولها) مع كأس من الماء أو من دون طعام. إذا كانت هذه الحالة تتطابق عليك، اتبع تعليماتها.

يمنعتجاوز الجرعة الموصى بها.

طريقة تناول الأقراص:

يهدف خط الشطر الظاهر على الأقراص إلى مساعدةك على كسر القرص فقط لتسيير ابتلاعه، ولكن عليك تناول كل أجزاء القرص في الوقت ذاته.

إذا تناولت عن طريق الخطأ أعلى، توجه فوراً إلى الطبيب أو الصيدلي.

لا تتوتر حدوث مشاكل حادة، ولكن قد تعاني من صداع، نصفي سريع أو من التعب.

إذا تناولت جرعة مفرطة أو إذا قام طفل بابتلاع كمية من الدواء عن طريق الخطأ، توجه حاليًّا إلى الطبيب أو إلى غرفة الطوارئ التابعة للمستشفى مصطحبًا ملوكه عنوة الدواء.

إذا نسيت تناول الدواء في الوقت المحدد، عليك تناول جرعة فور تذكرك، ثم متابعة تناول هذا الدواء كالمعتاد. يمنع إطلاقاً تناول جرعة مضاعفة تعويضاً عن الجرعة المنوية.

يمنع تناول الأدوية في الظل! تتحقق من الملصق على عبوة الدواء ومن الجرعة الدوائية في كل مرة تتناول فيها دواء.

النظارات البصريّة إذا كنت بحاجة إليها.

إذا كنت لديك أسللة إضافية بالنسبة إلى استعمال الدواء فاستشير الطبيب أو الصيدلي.