

עלון לצריכן לפי תקנות הרוקחים  
(תקנירים התשמ"א - 1986)  
התרופה משווקת ללא מרשם רופא

## ספטדין תרחיז

נוול

הרכב:

החוורמים הפעילים ורכיבם:  
כלורhexידין דיגלוקונאט 4%

(Chlorhexidine Digluconate 4%)  
לשימוש החומרים הבלטי פעילים:

ראה סעיף 6 "מידע נסוף".

קרא בעין את העולן עד סופו בטרפם

תשמשם בתרופתך.

עלון זה מכיל מידע תמציתו על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח.

עליך להשתמש בתנשיך בצוואר נסונה. הייעוץ ברוקח אם הנך קוק למידע נסוף.

### 1. מה מיועדת התרופה?

התרופה מיועדת לשיטיפת ידיים וחיטוי העור לפוי פועלות פולשניות.

קבוצת הרופאים - תכשירים אנטיספטיים  
ואנטיבקטריאליים.

### 2. לפני שימוש בתרופה

- ☒ אין להשתמש בתרופה:  
• אם אתה רגש (אלרגי) לחומר הפעיל או לכל אחד מהמרכיבים הננספים אשר מכילה התרופה. לרשותם החומרים הבלטי פעילים -ראה סעיף 6 "מידע נסוף".  
• על רകמות המוח, קרום המוח והאזור התיכונה.

### ☒ אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה:

- יש להימנע מגע עם העיניים.  
במקרה של מגע, יש לשטוף עם הרבה מים.  
• אם הנך רגש למזון כלשהו או לתרופה כלשהי,  
עליך להודיע על כך לרופא לפני ניתילת התרופה.

### 5. איך לאחסן את התרופה?

• מנע הרעללה!  
תרופה זו רופאה אחריה יש לשזור במקומם  
סוגר מוחץ להישג ידם של ילדים / ואן תינוקות  
ועל ידייך תמנע הרעללה. אל תגרום להרתקה  
לאלו הווארה מפורשת מהרופה.

• אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התיפה  
(exp. date) המופיע על בקבוק הרופה.

תאריך התיפה מתיחס ליום האחרון של  
אתו חישוב.

• אחסן במקום קרייר, מתחום 1 - 25°c.

• מסור ריבת ומגע חידרת אויר ורטיבות.

• אחסן באוויר הطلق המקוררי.

• ניתן להשתמש במצב לאחר הפתיחה,  
עד שפג תוקף.

### 6. מידע נוסף:

נוסך על החומרם הפעילים התרופה מכילה  
גם:

Purified Water, Poloxamer, Lauramine  
Oxide, Isopropyl Alcohol, Ponceau 4R  
(E124), Fragrance

כיצד נאות התרופה ונוכח הארץ:

נדול אלול בעל בעג אדים.

תכולה: 100 מ"ל, 500 מ"ל.

היצרן ובצל הרישום:

בן-שמעון פולרוש בע"מ, פארק תעשייה משבג,  
ד.ג. משבג 2017400.

עלון זה נערך בתאריך 12.08.2020

מספר רישום התרופה בפנקס התרופות  
הממלכתי במשרד הבריאות: 112 44 29484 00

לשם הפשטות ולהקלת הקיראה, עלון זה נסוכ  
בלשון זכר, על אף זאת, התרופה מיועדת לבני  
שני המינים.

☒ אם אתה לוקת, או אם לך כתמתת לאחרונה,  
ומוטסוי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח.  
☒ מידע חשוב על תלוק המרכיבים של  
התרופה: חומר גלם זולני צבשי הנמצא  
בתנשיך עלול להatkית את הבגדים.

### 3. כיצד השתמש בתרופה?

עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח  
אם אין בטעו.

אוכן השימוש המקובל בדרך כלל הוא:  
כברוחן בברוגאייה: רטב את ידיים והרשוות,  
הורס 5 מיל' ספטדין תרחיז ושפשף למשך דקה.  
המשמש כבברשת לטלויים פורמייני. חזר על  
אותה פעולה למשך 2 דקות. שטוף ויבש היטיב  
לשיטפה ייחסי ידיים והרשוות את הדימים  
או העור, והוא 5 מיל' ספטדין תרחיז ושפשף  
למשך דקה. שטוף ויבש ייטיב.  
אין לעבורי על המנה המומלצת.

☒ איןobilusz  
ההרופה מיועדת לשימוש חיצוני בלבד.

אם תטלול מנת מנת יתר או אם בטשות בעל יולד מן  
ההרופה, פנה מיד לרופא או לחדר מין של בית

חולמים והבאזרחות התרופה אינה  
אינו ליטול תרופות בחושך בדק התוויות והמנה  
בכל פעוט שהורן נטל תרופה. הררכב משקפיים

אם הנך זוקק להרשות.

אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש  
בתרופה, הוושטן וברופא או לרוקח.

### 4. תופעות לוואי:

כמו בכל תרופה, השימוש בספטדין תרחיז עלול  
ל לגרום לתופעות לוואי בתחום המהמשכים.

אל תיבהל למקראי רישימת תופעות הללו:  
☒ של הפסיק את השימוש ולפנות לרופא:

• במרקחה של הרישיות בעור (נדיר)

תופעות לוואי וטיפות:

אדמדומיות וגירוי מקומי,  
אם אתה מטופשת הלאויא ממחירה, או כאשר

עליך להתkichן לוואי של הרופא.

תופעות לוואי בידיהם:

על העורם לדוחו להזעמת המטפל על כל תופעת

לוואי וכן כל תרופה נסופת הניתנתليل.

ראה לעיל תופעות לוואי מיוחדות שפורטו,