

بجري تسويق الدواء دون وصفة طبية

سيبتادين غسول

سائل

التركيب:

الماء الغالبة والتركيز:
غلوكونات كلور هكسيدين ٤% -(Chlorhexidine Gluconate 4%)
قائمة المواد غير الفعالة: انظر البند ٦ "معلومات إضافية".اقرأ النشرة بامان حتى نهايتها قبل استعمالك للدواء
تنتهي هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء، إذا كانت
 لديك أسئلة إضافية، توجه إلى الطبيب أو إلى الصيدلي.استخدم غلوكونات كلور هكسيدين بشكل صحيح.
استشر صيدلاني إذا كنت بحاجة إلى معلومات إضافية.

١. لماذا معد الدواء؟

مطهور لغسيل العينين وتطهير الجلد قبل العمليات المراحية.

الفصيلة العلاجية:

مستحضرات تطهير ومضادة لجراثيم.

٢. قبل استخدام الدواء

يمكن استخدام الدواء:

• إذا كانت لديك أسئلة أخرى فيما يتعلق باستخدام الدواء.
استشير الطبيب أو الصيدلي.٤. **الأعراض الجانبية:**
مثل أي دواء، يمكن أن يسبب استخدام سيبتادين غسول
أعراضًا جانبية لدى بعض المستخدمين.
لا تتفق لدى قراءة قائمة الأعراض الجانبية.
فقد لا تتعانى من أي منها.٣. **تحذيرات خاصة متعلقة باستخدام الدواء:**
 يجب الامتناع عن ملامسة العينين.
في حال الملمسة، يجب الغسل باستخدام الكثير من الماء.• إذا كانت لديك حساسية لطعم أو دواء أي كان.
على إبلاغ الطبيب قبل تناول الدواء.٤. إذا كنت تتناول أو تناولت مؤخرًا أدوية أخرى.
بما فيها أدوية دون وصفة طيبة ومكمّلات غذائية.
آخر الطبيب أو الصيدلي بذلك.

الأعراض الجانبية لدى الأولاد:

على الوالدين إبلاغ الطبيب المعالج بأي عرض جانبي.
وكتلك بأي دواء آخر يتناوله الولد. انظر أعلى نصائح
الأعراض الجانبية الخاصة.

٥. كيف تخزن الدواء؟

- امنع التسمم! يجب بحفظ هذا الدواء وأي دواء آخر في مكان مغلق بعيدًا عن متناول أيدي الأطفال / أو الرضع، وذلك لتفادي التسمم.
- لا تسبب التغير دون تعليمات صريحة من الطبيب.
- يمْنَع استخدام الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية (exp. Date) الظاهر على ظهر العبوة.
- تاريخ انتهاء الصلاحية هو اليوم الأخير من الشهر المشار إليه.
- احفظه في مكان بارد، في درجة حرارة تقل عن ٢٥ درجة مئوية.
- أغلقه بآشخاص، وامنع تسرُّب الهواء والرطوبة.
- احفظه في العبوة الأصلية.
- يمكن استخدام المنتج بعد فتحه، حتى تاريخ انتهاء الصلاحية.

٦. معلومات إضافية

فضلاً عن المواد الفعالة، يحتوي الدواء أيضًا على
Purified Water, Poloxamer, Lauramine Oxide, Isopropyl Alcohol, Ponceau 4R (E124), Fragrance

كيف يبدو الدواء، وماذا تحوي العبوة

P15132037-2
سائل شفاف ذو لون أحمر
المحتوى: ١٠٠ ملليلتر، ٥٠٠ ملليلتر.

المنتج وصاحب التسجيل:

بن شمعون فلوريش م.ض،، المنطقه الصناعية
مسفاغ، بربت متجر مسفاغ .٢٠٧٤٠٠

تم تحرير هذه النشرة في تاريخ ٢٠٠٨٠٢٠٢٠

رقم تسجيل الدواء في سجل الأدوية الرسمي
في وزارة الصحة: ٠٠٤٤٢٩٤٨٤

من أجل التيسير وتيسير القراءة، نempt مصايف هذه النشرة بصفة المنفرد.
على الرغم من ذلك، الدواء معد لابناء كلا الجنسين.

[١] معلومات هامة عن قسم من مكونات الدواء
قد تترك المادة الخام السائلة والغنية بالألوان
والموجدة في المستحضر يقعها على الملابس.

٢. كيف تستعمل الدواء؟

عليك أن تشخص مع الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكن متأكدًا.
طريقة الاستعمال المتبعة غالباً:

للستخدام في الجراحة: قم بتطهير اليدين والذراعين،
اضف ٥ ملليلتر من سيبتادين غسول، وأفرك يديك لمدة دقيقة.
استخدم فرشاة لتنظيف الأظافر.
كرر العملية لمدة دققتين. أغسل وجفف جيداً.

لانتظام الجرعة الدوائية الموصى بها.
يمْنَع الابتلاع. الدواء معد للستخدام الخارجي فقط.

إذا أفرطت في استخدام الجرعة الدوائية أو إذا أبتلع
اللول بالخطأ من هذا الدواء.

توجه حالاً إلى الطبيب أو إلى غرفة الطوارئ التابعة للمستشفى مصطحبًا معك عبوة الدواء.
لا تتناول الدواء في التلمذة!

افحص اللاصقة والوجبة في كل مرة تتناول فيها الدواء.
استخدم النظارات إذا كنت تختاجها.

إذا كانت لديك أسئلة أخرى فيما يتعلق باستخدام الدواء.
استشير الطبيب أو الصيدلي.

٤. **الأعراض الجانبية:**
مثل أي دواء، يمكن أن يسبب استخدام سيبتادين غسول
أعراضًا جانبية لدى بعض المستخدمين.

لا تتفق لدى قراءة قائمة الأعراض الجانبية.
فقد لا تتعانى من أي منها.

٣. **يجب التوقف عن الاستخدام والتوجه للطبيب:**
في حالة حدوث حساسية في الجلد (نادر)

أعراض جانبية أخرى.
احمرار وتهيج موضعي.

إذا تفاقم أي من الأعراض الجانبية.
أو حين تتعانى من عارض جانبي لم يذكر أعلاه.
عليك استشارة الطبيب.