

• تغيرات في حاسة التذوق، انخفاض في الإحساس، تشنجات،

ضغط على النخاع الشوكي (نادر جدًا)

• اضطرابات في الرؤية

• نقص تروية عضلة القلب (انسداد أوعية دموية في عضلة القلب)

• شري (التهاب تحسسي جلدي)

• حساسية الضوء

• كسر مرضي

• آلام في العجان (perineum) (الم في المنطقة الموجودة بين

الخصيتين وفتحة الشرج)

إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقم أحد الأعراض الجانبية أو

إذا عانيت من أعراض جانبية غير مذكورة في النشرة، فعليك

استشارة الطبيب.

تبليغ عن الأعراض الجانبية

من الممكن تبليغ وزارة الصحة عن أعراض جانبية من خلال الضغط على الرابط [التبليغ عن أعراض جانبية نتيجة لعلاج دوائي](#) الموجود على الصفحة الرئيسية في موقع وزارة الصحة (www.health.gov.il) الذي يحولك إلى استماراة عبر الانترنت التبليغ عن الأعراض الجانبية، أو عن طريق الرابط: <https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getsequence.aspx?formType=AdversEffectMedic@moh.gov.il>

5. كيف يُخزن الدواء؟

تحجب التسمم! يجب حفظ هذا الدواء، وكل دواء آخر، في مكان مغلق، بعيدًا عن متناول أيدي ومحال رؤية الأولاد وأو الأطفال، وهذا جنوب التسمم.

لا سبب التقوّت بدون تعليمات صريحة من الطبيب.
يمنع استعمال الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية (exp. date) الظاهر على العبوة. تاريخ انتهاء الصلاحية ينبع إلى اليوم الأخير في نفس الشهر.

شروط التخزين

يجب الحفظ في درجة حرارة تحت الـ 25°C، يجب استعمال المعلق المعاد تجهيزه فوراً بعد تحضيره.

6. معلومات إضافية

بالإضافة للمادة الفعالة يحتوي المسحوق أيضًا على: poly (d,L-lactide-co-glycolide), mannitol, carmellose sodium, polysorbate 80.

تركيب المذيب: ماء للحقن.

كيف يبدو الدواء وماذا تحتوي العبوة:

المستحضر هو مسحوق وذيب لصنع معلق لإطلاق معدن لفرض الحقن، المسحوق بلون أبيض حتى كريمي، والمذيب هو محلول شفاف.

تحتوي عبوة المستحضر على قنينة واحدة من المسحوق، أمبولة واحدة من المذيب، بالإضافة إلى ذلك تحتوي العبوة على محقنة وابرتين.

اسم صاحب التسجيل وعنوانه: فرينج فارماسيوتيكالزس م.ض،
شارع هشيطا 8، بارك الصناعة، قيساريا 3088900