

בג

נוספַּח חומר הפעיל האבקה מכילה גם: poly (d,L-lactide-co-glycolide), mannitol, carmellose sodium, polysorbate 80. הרכב הממס: מים להזרקה.

יעוץ
דム
קצת
אחר
שניהם נקבעו במבחן האיזה מילוי

שם בעל הרישום וכתובתו: פריג פרמציאוטיקול בעמ' רחוב השיטה 8, פארק התעשייה, קיסריה
מספר תעודת זהות: 3088900
שם בנקאי ובפקידו:

עלון זה נבדק ואושר ע"י משרד הבריאות בתאריך אוגוסט 2017 ועדכן בהתאם להוראות משרד הבריאות הבינלאומי אוקטובר 2019. מסוף רישום התוכנה בפנקס ההחmmasות הממלכתי בחושך בבריאות:

בגמרא כתוב עילן
135-83-31300
לשם הפשטות ולהקלת הקירהה, עלון זה גוסח בלשון
זאת ובל אס זאצ'ה בפְּרוֹבָּוֹן מַשְׂדֵּם לְבָנָו שֶׁבְּחִזְקָה
כימ

Digitized by srujanika@gmail.com

5. איך לאחסן את התרכופה?

מנוע הרעה! תרזה זו ומי תזרעה אחריה יש לנו
במקום סגור מחוץ להישג ידם וטוח ראייתם של ילי^ו
או פינויים ועל-ידי בר פמאנן הצעלה.

אל תגרום להקאה לא הורה מפורשת מרופא.
אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (p.date).
המופיע על גבי האזיה. תאריך התפוגה מת'יחס

תנאי אחסון
יש לאחסן בטמפרטורה מתחת ל- 25°C , יש להשתEDA
בתרחיף המשוחזר מיד עם הכנתו.

- האקואות, תכיפות לריקון המעי, ריפולוקס קיביט-ו-
 - צחבות
 - הדעתית נזירת שער, גור, אקזמה, אקנה ק
 - אוטוסאטוריסטי (דלקת מפרקים יונוכית)
 - חולשת שרירים
 - כיפות במוניטן שן, השטנה לילית, פגר
 - בלפלוחית השטן, לדיפטשן,ocabיס בעכליות, בשתייה, הרכעות בעפליות הכלילית
 - הפרעות תפוקדיות של העורמוויות והאסכים, דך בשד
 - מהוועה של חוכר נזירות, המירה בסיבוכים לא ניטוח
 - תופעות לואן נדירות (rare) ונדירות מאד (very rare) תופעות שרוועוועות ב-1-10 (נדירות) או בפחות מ-10,000: (very rare) מחריך (common)
 - ליפוגאנדרופיה (דלקת של בלוטות הליפה)
 - מגרנה
 - ישיני בחוש הטעם, ירידת בתנוחה, עוויה
 - דחישה של חות השדרה (נדיר מאד)
 - הפרעות באיה

תופעות לואן נדירות:

 - עליה בספרת הרמות הפלואוטרים (תאי דם לבנים) דזוזה בקר חווילים שוטפלן באנרג של GnRH.
 - תופעות לואן שכיחות מאד (very common) שמיינען בייתר משמשת אחד מעשרה
 - כל חום, המתקבב בפיסים (במיוחד בתחילת הטיפול)
 - הקטנת איבר המין
 - איז אונות, ירידת ברשת המין
 - כאבי עצמות

תופעות לואן שכיחות (common) תופעות שמיינען ב-1-10 משבטמשים מחריך 100

 - סחרורה, נכבר ארש, דודו' שינה
 - דיכאון, תנודות במצב רוח
 - זיזום דברי השתן
 - התחלחות חמימות של הגידול הסרטני
 - ירידת ביביזון
 - עליה ביריך האכנים אלקלין פיסופאצט, עליה בריצין חמוץ ואוית
 - ocab בעיניהם, דלקת בלומתי העין
 - עליה לחץ דם

3. כיצד השתמש בתתרופה?

יש להשתמש בתתרופה תמיד בהתאם להוראות הרופא.

עליך לבדוק אם הרופא או הרוקח אם אין בטוח בוגון ממעון אונקו אנטיפול בקשרו לעד' הרופא בלבד.

המנין ואופן אנטיפול לאירועים הנגעים בלבד.

המנין מקובל בדרך כלל הוא דקירה אחת לשולשה חדשניים.

הרופא או האחות יזרוין את התתרופה במתן תוך

כתרון

יש להשתמש בתכשיט הרופא. עליך לבדוק עם הרופא איזה בוגע למין ואופן הטיפול המ ניתן ואיזה טיפול ייבצע במקרה המקובל בדרך כלל של חודישים. הרופא או האחות יירקן איזה שריר. אין לעبور על המנה המומלצת.

אם הזכות בטיעות מנת ית' מון התהוויה, פונה מז' לטרופין, חולים והבא אריזת התהוויה, אם שכחת לקלב דזקה או חודשים), התנייע עם הרופא לשלהתמד בטעפיו פ' שהו גם אומ' כל שיפור ממצב ב-הטבול לרופאה לאל-חומריאת.

הו. בודק תרופות בחושן
אין ליטול תרופות שחייבן
בעם שהניר לוחך תרופה.
זכוק להם.
אם יש לך שאלות נוספת נספota
היויעץ ברופא או ברוקח.

ל'ו

בדרכו של קרייטר, מושג זה מושג על ידי הפעלת תהליכי איסוף ותיעוד נתונים, ופיזורם במרחב. מושג זה מושג על ידי הפעלת תהליכי איסוף ותיעוד נתונים, ופיזורם במרחב. מושג זה מושג על ידי הפעלת תהליכי איסוף ותיעוד נתונים, ופיזורם במרחב.

תמונה לקויה, נטילה מושכת של המפהיתות את ציפוי העם (הציגו מונחים כמו גראניט, נגרד פרקורסינים, סטראיזדים). טיפול דקפקטיל דפו עלול להוביל להחלישות במיוחד אם אחד התהאמים עלה מתקף.

- הין לוקה במחלות לב או כל דם כלשוני הופיעות בקצב הלב (arteriosclerosis), אבתרופות מוחות אלין. הסיכון להפרעות הלב עלול לעלות בעקבות שימוש בדקפקטיל.
- יש רון סוכרת או עייני לב או כל דם.

עלון לצרך לפי תקנות הרוחקים (תקשירים)
התשס"י - 1986
התורופה משווקת על ידי מרשם ופא בלבד

דקפקטיל דפו 11.25 מ"ג
אבקה וממס להכנת תרחיף להזרקה
טור שירית

רכב:

ל כרברוזן, אל. דרבוטשטיין דפו 11.25 מ"ג, חלב

- **במהלך הטיפול בתהופה** – תוגונת ארכאולוגית: בקרים דירים זמן קדום נצפו תגבורות אלרגיות חמורות (פרען, "מושעות לאו"). בקרים כללה, מיד ללבול טיפול רפואי. נמל ומיירנה מתרם בלתי פעלים – ראה סעיף 6 "מיד צו".

- נדרירים. יש להפסיק את הטיפול אמם מקרים או מומים.
- בתקה תלויה הטיפול תחול עלי' בכמות הטיפול בגוףן. הדבר עלול לגרום להחמרה הסופית. פנה להפאה שלך אם זה קוראך.

בנוסף, עלון צוות רפואי יסייע לך בזיהוי הנדרירים.

הרופא יון לrk תורפה (אנטַי אַדְרָגָן) הלומד בבית הספר הפסיכולוגי של אוניברסיטת ניו יורק.

- במלואה השבעות הריאותים צפיפות, דפו עלולו, בדומה לאלגואים אחרים של ברקמיס ובדום, גלורים להלץ בחוץ לחסימות השכפה (בוגר ישתת השכפה).

הרופא יעקב אדריך ויטש בתפקידו כטביעה רופאים. בוגר ישתת השכפה (בוגר ישתת השכפה).

- הכוון.
- בדיקות של תפקוד בלוטה יותרה שראויות במהלך הטיפול או לאחר הטיפול עם קדפסיל דטו עלולות להוות אמצעים לשילוב הדגל שיפר' של בוגרים.

לפנ' שימוש בתרופת
(hormone).

- תרופה שאינה מיועדת לחולים עם סרטן
- בקרה שגורמת בעמוד השדרה.
- גראם של ההורמון המשחרר גאנדרופון (GnRH) ייעוד גם בסרטן(LHRH), או לאחד מרכיבי התרופה (ראה ערך סעיף 6).

ההכרה מינימלית הגמונית לשימוש בטרופה: פען הטפלול בתרופה ספר לרופא אמר:

אם אתה לוחץ או אם לך חת לאחורה, אמתן כולל תוצאות ללא מרשם ומטופסם על
אתה סובל מכאב רוח דכאון. היי דייחום על
דיכאון שעלו לחיות חור בקרב מטילים הניטלים

ספר עלי' לך או לוחצת.

במיוחד אם אתה לוחצת:

- תרומות נגד קריישט דם
- תרומות המשמשות לעקב הלב, לביבון
 וגו לארתור הרוחן QT למשטרת פירמיד (pyramide) – דיסטנסרידין (diphenhydramine)

עלולה להפיע בחרובה באחור הזירה.

אתה צור כוחות בחרונות ל민יטען קריישט דם, שכן
מואיסטוטרופוזיס או יש להיסטורייה שפנומתית של
איסטרופוזיס (hypotension) כדוגמת נזנחת (syncope).