

Инструкция по применению препарата, в соответствии с «Положением о фармацевтах (Препараты)» - 1986

Лекарство продается без рецепта врача

**Юракс
Крем**

Состав:

Активное вещество и его концентрация:

Кротамитон 10% (весовые проценты) (Crotamiton 10% w/w)

Неактивные вещества и аллергены – см. раздел 2 Инструкции, пункт «Важная информация о некоторых из компонентов препарата», и раздел 6 Инструкции «Дополнительная информация».

Прежде чем начать применение препарата, внимательно прочтите инструкцию до конца. Инструкция содержит краткую информацию о препарате. Если у вас есть дополнительные вопросы, обратитесь к врачу или фармацевту.

Необходимо применять данный препарат согласно указаниям в пункте дозировки настоящей инструкции. Если вам потребуется дополнительная информация, проконсультируйтесь у фармацевта. Вам следует обратиться к врачу, если симптомы вашего заболевания усугубились или не улучшились в течение 5 дней.

1. Для чего применяют данный препарат?

Данный препарат предназначен для облегчения зуда и лечения чесотки (scabies).

Терапевтическая группа: скабицид, снимающий зуд препарат.

2. Перед применением препарата

Не следует применять препарат:

- Если вы страдаете аллергией на активное вещество препарата или на любой из дополнительных компонентов, содержащихся в препарате (см. раздел 6).
- При поражениях кожи, сопровождающихся выделениями.

Особые предостережения в связи с приемом препарата

Перед началом приема Юракса, необходимо сообщить врачу, если:

- Вы страдаете зудом в области половых органов.

Применение препарата при наличии зуда в области половых органов осуществляется под надзором врача.

Не следует наносить Юракс в области рта и глаз. При случайном контакте следует промыть глаза и рот водой.

Не следует наносить Юракс при острой экземе или серьезных кожных воспалениях, на открытые раны и на потрескавшуюся кожу.

Дети и подростки

Препарат предназначен для использования также у детей и подростков. Рекомендуется проконсультироваться у врача перед применением препарата у грудных детей.

Межлекарственные реакции:

Если вы принимаете (или принимали в последнее время) другие препараты, включая препараты, продаваемые без рецепта врача, или пищевые добавки, необходимо сообщить об этом врачу или фармацевту

Беременность и грудное вскармливание

Беременность

Не рекомендуется применять Юракс, если вы беременны, в особенности на протяжении первых трех месяцев беременности. Следует проконсультироваться у врача перед применением.

Грудное вскармливание

Следует проконсультироваться у врача перед применением Юракса, если вы кормите ребенка грудью. Неизвестно, переходит ли Юракс в материнское молоко, поэтому не следует применять его, если вы кормите ребенка грудью, за исключением случаев, когда врач дал вам указание о применении препарата. Если вы применяете Юракс в период грудного вскармливания, не следует наносить его на область сосков.

Вождение автомобиля и работа с механическим оборудованием

Юракс не оказывает какого-либо воздействия на способность водить автомобиль и работать с механическим оборудованием.

Важная информация о некоторых компонентах препарата

Препарат содержит пропиленгликоль, который может вызывать раздражение кожи.

Препарат содержит цетилстеариловый спирт, который может вызывать раздражение кожи (например, контактное воспаление кожи (contact dermatitis)).

3. Как применять препарат?

Нужно проконсультироваться у врача или фармацевта, если вы не уверены в отношении дозировки и способа применения препарата.

Дозировка препарата обычно составляет:

При зуде: следует наносить крем Юракс на пораженный участок кожи 2-3 раза в день до облегчения зуда. Юракс вызывает облегчение зуда на 6-10 часов после каждого нанесения. Таким же образом следует действовать в тяжелых случаях, которые требуют продолжительного лечения, так как Юракс хорошо переносится кожей. Если улучшение не наступило после 5 дней лечения, следует проконсультироваться у врача.

Дети в возрасте до 3 лет: не следует применять Юракс более одного раза в день. Следует проконсультироваться у врача перед применением данного препарата у грудных детей.

При чесотке (scabies): пациент должен вначале принять горячую ванну и хорошо высушить кожу. Затем необходимо втирать Юракс в кожу на всей поверхности тела (за исключением лица и скальпа), вплоть до того пока следы препарата не перестанут быть заметны на поверхности кожи. Следует повторять данную процедуру один раз в день, желательно в вечерние часы, на протяжении 3-5 дней. В зависимости от реакции нужно уделить особое внимание участкам, которые в наибольшей степени подвержены присутствию паразитов (участки между пальцами рук и ног, запястья, подмышечные области и половые органы). Гноящиеся участки поверхности кожи следует покрыть салфеткой, пропитанной Юраксом. На протяжении курса лечения пациент может принимать ванну за короткое время до каждого применения препарата. После завершения сеанса лечения следует принять очищающую ванну и сменить нижнее белье и простыни.

Дети в возрасте до 3 лет: следует проконсультироваться у врача перед применением и не следует применять Юракс более одного раза в день.

Не следует превышать рекомендуемую дозировку.

Не глотать! Данный препарат предназначен только для наружного применения: для нанесения на поверхность кожи. Следует избегать контакта со ртом и глазами.

Если по ошибке вы проглотили препарат или препарат проглотил ребенок, немедленно обратитесь к врачу или в приемный покой больницы и принесите с собой упаковку от препарата.

Не следует принимать лекарства в темноте! Необходимо проверить этикетку препарата и его дозу при каждом приеме. Если вы пользуетесь очками, наденьте их перед приемом лекарства.

Если у вас возникли дополнительные вопросы относительно приема препарата, обратитесь с ними к врачу или фармацевту.

4. Побочные явления

Как и в случае с любым другим препаратом, применение Юракса может вызывать побочные явления у некоторых пользователей. Не пугайтесь, читая перечень этих явлений. Возможно, что вы не испытаете ни одно из них.

Следует прекратить применение препарата и как можно скорее обратиться к врачу

- При появлении аллергической реакции, которая проявляется в затруднении дыхания или глотания; отеке лица, губ, языка или гортани; тяжелом кожном зуде, сопровождающемся красной сыпью или волдырями. Является редким побочным явлением.
- В случае тяжелого зуда.

Дополнительные побочные явления

Малораспространенные побочные явления (uncommon): зуд.

Редкие побочные явления (rare): высыпания; высыпания, сопровождающиеся зудом; покраснение кожи; экзема; отек лица и гортани.

При появлении побочного явления, а также если какое-либо из побочных явлений усугубляется или если вы страдаете побочным явлением, не указанным в данной инструкции, вам следует проконсультироваться у врача.

Можно сообщить о побочных явлениях в Министерство здравоохранения, нажав на ссылку «Сообщение о побочных эффектах от лекарств», которая находится на интернет-сайте Министерства здравоохранения (www.health.gov.il), чтобы перейти на электронный бланк сообщения о побочных явлениях, или перейдя по ссылке: <https://sideeffects.health.gov.il>

5. Как хранить препарат?

- Не отравитесь! Этот препарат, как и любое другое лекарство, следует хранить в закрытом месте, недоступном для детей и (или) младенцев (и вне поля их зрения). Таким образом, вы сможете предотвратить отравление препаратом. Не вызывайте рвоту без соответствующего указания врача.
- Не следует применять препарат по истечении срока его годности (exp. date), указанного на тюбике и картонной упаковке. Срок годности препарата оканчивается в последний день указанного на упаковке месяца.

Условия хранения

Следует хранить препарат при температуре ниже 30°C.

6. Дополнительная информация

Помимо активного вещества данный препарат содержит следующие компоненты:

purified water, glycerol monostearate, propylene glycol, liquid paraffin, cetostearyl alcohol, isopropyl myristate, polyoxyl 40 stearate

Как выглядит препарат, и каково содержимое его упаковки:

Тюбик, содержащий 20 граммов крема белого цвета с легким характерным запахом.

Владелец регистрации и его адрес: «Дифрис и Ко. ЛТД», ул. Ха-Барзель 32, Тель-Авив.

Название и адрес производителя: STADA Arzneimittel AG, Stadastrasse 2 – 18, 61118 Bad Vilbel, Germany.

Эта инструкция была отредактирована в июне 2020 года.

Регистрационный номер препарата в государственном реестре лекарственных препаратов Министерства здравоохранения: 127-17-22132.