

## فوليرون أفراد

التركيب

يحتوي كل قرص على: ١٠٠ ملجم حديد على شكل معدن

هيروكسيد الحديد الثنائي متعدد المالتون (وـ١، ملجم

حمض الفوليك

المواد غير المعلنة - ألمع - نظر القرفة

إسخدام فوليرون، مع ذلك فإن هذا العرض غير شائع.

إذا كنت تتناول أو إذا تناولت مؤخراً أدوية أخرى

بما في ذلك المتراسبيكتينات والكوبونولونات، ديميراكارول

أدوية لعلاج المغص أو الصداعى عن ذلك، يجب إدخال الطبيب

أو المصيدلى بالأشخاص إذا كنت تتناول.

٤ حديد بالعلن - يوصى بتناول الشحنة الحدید عن طريق

العنق.

٥ أدوية لعلاج مرض الصرع، خاصة فييتينون، يجب

تناوله قبل تناول الدواء - فوليرون.

٦ كلورامفينيكول، دواء لعلاج التهابات الجرثومية، إن

اعطاء كل الدوائين سوية قد يؤدي إلى تأخير في تأثير

فوليرون، يجب إجراء متابعة.

٧ إسخدام الماكولات

يقتضي تناول الدواء خلال وجبة الطعام أو بعدها، بالإضافة

إذا تناول الدواء في وقت المطبوخ، فلا يجوز تناول

جرعة دوائية متساوية تناول الجرعة الدوائية التالية في

الوقت الsubsidiary وإسترثر الطبيب.

٨ العمل والإرضاع

لا يجوز تناول أدوية في الممتدة - فوليرون أفراد على الجنين أو

الذكور خلال فترة الحمل أو الرضاعة، مع ذلك، إذا

كنت في فترة الحمل أو الرضاعة، تعتقدين بذلك حامل

أو تخطئين الطبيب، يجب استشارة الطبيب أو المصيدلي

(الملاحة الجرعة الدوائية).

٩ لا يجوز إسخدام الدواء بحسب التلقيمات في الدوارة

على الدوارة يقتضي تناول الدوارة على السيدة / أو إسخدام

وخلال فترة الرضاعة.

١٠ الصنبلة العلاجية: حديد بمشاركة حمض الفوليك.

### ٢ قبل إسخدام الدواء:

١ لا يجوز إسخدام الدواء إذا:

٢ لم ي يوجد حساسية (الرجيم) للمواد العلاجية أو أحد

مركباته (انظر القرفة) (٢)

٣ كنت تعانى من قلل دم غير مصحوب بنقص في الحديد

مثل قلل الدم الانحلالي (زيادة في تناقل خلايا الدم

الحمراء)، من نقص في بيتاينين B12

٤ كنت تعانى من ناقص من الحديد في الجسم

٥ اضطراب في إسخدام الحديد من قبل الجسم

تحذيرات خاصة تتعلق بإسخدام الدواء:

١ يجب إسشارة الطبيب أو المصيدلي قبل بدء العلاج

إذا كنت تعانى من تلوّن، روم، أو نقص في بيتاينين B12

أو إذا كنت تعانى أو عانيت في الماضي من خلل في وظيفة

المهار الذهني (مثل القرفة)، جهاز الدم (مثل التشرد وما

شابه)، لدى مرضى السكري، لدى المرضى الذين يتلقون

تربير دم مشكل متكرر.

٢ قد يجيء حمض الفوليك وجود نقص في بيتاينين

B12

بالإمكان التبليغ عن أعراض جانبية لوزارة الصحة  
بواسطة الضغط على الرابط، تبليغ عن أعراض جانبية  
على علاج دوائي، الموجود على الصفحة الرئيسية لموقع  
وزارة الصحة (www.health.gov.il) الذي يوجه  
إلى الموقع المباشر للتبليغ عن أعراض جانبية، أو عن  
طريق تصفيه الرابط:

<https://sideeffects.health.gov.il>

٥ كيفية تخزين الدواء؟  
يجب حفظ الدواء وكل دواء آخر في  
مكان مختلف بعيداً عن متناول اليد وعمال زراعة الأطفال  
و/ أو الرضيع، وذلك لتفادي إصابتهم بالسم، لا تنسى  
أن تخزين الدواء بعد انتهاء تاريخ الصلاحية  
(exp.date) الذي يظهر على كل العلبة.  
يشير تاريخ الصلاحية إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.  
لا يجوز تخزين الدواء بدرجة حرارة تزيد عن درجة مئوية.  
بالإمكان الاستعمال لمدة شهر من تاريخ المرة الأولى.

٦ معلومات إضافية:  
يحتوي الدواء بالإضافة للمواد الفعالة أيضاً:  
Mannitol, Talc, Magnesium Stearate, Sucralose

كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العلبة:  
عليه تتدنى على ٣ فرسان بلون بني فاتح ضمن قارورة  
بلاستيكية تحتوي على صابون الرطوبة.  
مع غطاء أمان مقاوم للفتح من قبل الأطفال  
صاحب الامتياز/ المنتج وعوانه: سام - آون. م.فن.  
آورد بيكمون (هايكون) ٢٥، بات - يام.  
أقرت وزارة الصحة سياسة هذه النشرة ومحفوتها  
٢٠١٩/١ رقم سجل الدواء في سجل الأدوية الحكومي في  
وزارة الصحة.

٧ من أجل سهولة وتوهين المرأة، تمن صياغة هذه النشرة  
بصيغة المذكر، على الرغم من ذلك، فإن الدواء مخصوص  
لكل الجنسين.

إنبه:  
يجب الانتظار فترة زمنية تقدرها ساعتين على الأقل بين تناول  
هذا الدواء وبين تناول مصادر مياه معدنية أخرى  
من قبيل التراسبيكتينات والكوبونولونات، ديميراكارول  
الشمسي بالمدان، - (يكتفى بالانتظار ٢٤ ساعة).

كم من الوقت يستمر العلاج عادةً يتأتى بدرجات النفس

في الجديد / حمض الفوليك.

الفحوص والمتانة: يجب إجراء فحوص الدم خلال

فتراء العلاج بهذه الدواء.

إذا تناولت جرعة دوائية مفرطة أو إذا بقي طفل بالخطأ  
من الدواء، توجه حالاً إلى الطبيب أو غرفة الطوارئ في  
المستشفى وأخبره معلم عليه الدواء، لا تسبب التقطير دون

تلقيمات صريحة من الطبيب.

لا يجوز إسخدام الدواء بعد إنفصاله تاريخ الصلاحية

(exp.date) الذي يظهر على كل العلبة.

يشير تاريخ الصلاحية إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.

لا يجوز تخزين الدواء بدرجة حرارة تزيد عن درجة مئوية.

بالإمكان الاستعمال لمدة شهر من تاريخ المرة الأولى.

٨ معلومات إضافية:

كم يتكل دوا، إن إسخدام فوليرون أفراد على الجنين أو

الذكور خلال فترة الحمل أو الرضاعة، تعتقدين بذلك حامل

أو تخطئين الطبيب، يجب استشارة الطبيب أو المصيدلي

(الملاحة الجرعة الدوائية).

٩ لا يجوز تناول فوليرون أفراد على الجنين أو

الذكور خلال وجبة الطعام أو بعدها، بالإضافة

إذا تناول الدواء في وقت المطبوخ، فلا يجوز تناول

جرعة دوائية متساوية تناول الجرعة الدوائية التالية في

الوقت الـsubsidiary وإسترثر الطبيب.

١٠ يجب إجراء متابعة.

١١ على الإستفهام من الطبيب أو من المصيدلي إذا لم تكن

الجرعة الدوائية الإعتيادية هي عادةً:

لكلار وآطفال فوق سن ١٢ سنة:

لمنع فقر الدم: قرص واحد في اليوم.

لعلاج فقر الدم: ٢ أقراص في اليوم بجرعة يومية

واحدة أو بجرعات دوائية متسame.

هذا الدواء غير مخصوص لادة لرضع وأطفال (العلاج

الرضع/ الأطفال) يجب إسخدام شراب/ قطرات.

لا يجوز تحذير الجرعة الدوائية الموصى بها.

بالإمكان منعه أو بيع الدواء مع التقليل من الماء.

١٢ إنها مخصصة لمنع ولечение فقر الدم الناجم عن نقص

الحديد وحمض الفوليك بما في ذلك خلار فقر الدم

المكاثفات.