

חברת תרו מבקשת להודיעכם כי עלון לרופא של התכשיר Chlorhexidine Lacer Gel עודכן.

בהודעה זו מצוינים רק הסעיפים בהם נעשו שינויים מהותיים בעלון לרופא. מחיקות סומנו בקו מחיקה וצבע כחול. העלון המעודכן נשלח למשרד הבריאות לצורך פרסומו במאגר התרופות שבאתר משרד הבריאות: www.health.gov.il וניתן לקבלו מודפס על ידי פנייה לבעל הרישום: תרו אינטרנשיונל בע"מ, רחוב הקיטור 14, ת.ד. 10347 מפרץ חיפה 2624761.

בברכה,
מרינה גולדמן
רוקחת ממונה**Chlorhexidine Lacer Gel, Oromucosal gel**

מרכיב פעיל:

Chlorhexidine digluconate 0.2 %W/W

ההתוויה המאושרת לתכשיר:

1. As an aid to maintaining oral hygiene.
2. As an aid in the treatment and prevention of gingivitis.
3. Inhibition of formation of dental plaque.
4. For use in aphtous ulceration and oral candidal infections (eg denture stomatitis and thrush).
5. For use in a post- periodontal surgery or treatment regimen to promote gingival healing.

עדכונים בעלון לרופא**4.3 Contraindications**

Chlorhexidine Lacer Gel is contraindicated for patients who have previously shown a hypersensitivity reaction to Chlorhexidine or to any of the excipients in the formulation (listed in section 6.1). ~~However, such reactions are extremely rare.~~

4.9 Overdose

~~Overdose has not been reported.~~