

نشرة للمستهلك لمستحضر بيطري
يسوق الدواء بموجب وصفة طبيب بيطري فقط
للاستعمال في الحيوانات فقط

1. إسم الدواء

پاناکور 4% بيطري

2. التركيب:

المادة الفعالة:

يحتوي 1 غرام مسحوق على:

فينبندازول – 40 ملغ. Fenbendazole 40 mg

قائمة المواد غير الفعالة مفصلة في الفقرة 13.

3. لأي غرض مخصص الدواء:

لعلاج الخنازير، في أمراض ديدان المعدة والأمعاء في المرحلة غير الناضجة والبالغة، ديدان الكلى و/ أو ديدان الرنتين وعلى سبيل المثال: ديدان المعدة الحمراء، الديدان العقيدية (nodular worms)، الديدان المستديرة، الديدان السوطية (whipworms)، ديدان الكلى وديدان الرنتين.

4. موانع الاستعمال:

لا يجوز الإستعمال إذا كان معروفاً أن هنالك حساسية للمادة الفعالة أو لإحدى المكونات الأخرى.

5. الأعراض الجانبية:

غير معروف.

إذا لاحظت أية أعراض جانبية أو ردود فعل أخرى لم تذكر في نشرة المستهلك هذه، يرجى إبلاغ طبيبك البيطري.

بالإمكان التبليغ عن أعراض جانبية لوزارة الصحة بواسطة الضغط على الرابط " تبليغ عن أعراض جانبية عقب علاج دوائي" الموجود على الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة (www.health.gov.il) الذي يوجهك إلى النموذج المباشر للتبليغ عن أعراض جانبية،

أو عن طريق تصفح الرابط:

<https://sideeffects.health.gov.il>

6. الحيوانات المستهدفة

الخنزير.

7. طريقة الإعطاء والمقدار الدوائي:

مسحوق لتحضير مضاف غذائي طبي.

بالإمكان تحضيره مع طعام عادي وإستهلاكه منفرداً أو يُستعمل لتحضير مضاف غذائي طبي (مخلوط مع طعام صناعي أو مع خلطة طعام تجارية مناسبة ومتوفرة).

يجب التقيد بدقة للمقدار الدوائي إلا في حال دُكر في الوصفة الطبية خلاف ذلك.

المقدار الدوائي الموصى به: 5 ملغ فينبيندازول لكل كلغ من وزن الجسم.

لأمراض ديدان الكلى في الخنزير (*Stephanurus dentatus*): 10 ملغ فينبيندازول لكل كلغ من وزن الجسم.

1. علاج منفرد من المقدار العلاجي

علاج منفرد

للجرعات الدوائية ذات 500 غرام و- 2.5 كلغ مرفق كأس قياس صغيرة معلّمة.

العلاج الجماعي

لتحضير مضاف غذائي طبي، يجب خلط المقدار العلاجي (5 ملغ فينبيندازول لكل كلغ من وزن الجسم) في وجبة الطعام اليومية.

مثلاً، يجب استخدام الطريقة التالية:

نوع الحيوانات	إستهلاك الطعام	مسحوق لكل طن خلطة طعام
الخنزير للتسمين – 20 كلغ وزن الجسم تقريباً	1 كلغ للحيوان في اليوم	2.5 كلغ
خنزيرات – 200 كلغ وزن الجسم تقريباً	2 كلغ للحيوان في اليوم (وجبة أساسية)	12.5 كلغ

يجب مضاعفة الجرعة الدوائية في تلوّثات ديدان الكلى (10 ملغ فينبيندازول لكل كلغ من وزن الجسم).

يجب إعطاء العلاج للعدوى في الديدان السوطية و/أو ديدان الرنتين حسب ما هو موضح في الفقرة 2.

2. تقسيم المقدار العلاجي على مدار 5-15 يوماً

عند تحضير مضاف غذائي طبي، يجب خلط المقدار العلاجي (5 ملغ من فينبيندازول لكل كلغ من وزن

الجسم) في وجبة من خلطة الطعام المخصصة لمدة 5-15 يوماً.

مثلاً، يجب استخدام الطريقة التالية:

نوع الحيوانات	مدة العلاج	إستهلاك الطعام	مسحوق لكل طن خلطة طعام
الخنزير للتسمين – 20 كلغ وزن الجسم تقريباً	5 أيام 10 أيام 15 يوماً	1 كلغ للحيوان في اليوم	0.5 كلغ 0.25 كلغ 0.17 كلغ
خنزيرات – 200 كلغ وزن الجسم تقريباً	5 أيام 10 أيام 15 يوماً	2 كلغ للحيوان في اليوم (وجبة أساسية)	2.5 كلغ 1.25 كلغ 0.83 كلغ

لتحضير الخلطات المسبقة (2 كلغ لكل طن من الطعام) من الموصى به إستعمال طعام من القمح. المسحوق عديم الرائحة، عديم الطعم ومقبول على الحيوانات.

8. طريقة إستعمال المستحضر:

بالإمكان إعطاء الخلطة أيضاً لحيوانات مريضة جداً، حيوانات في فترة الحمل وحيوانات بوضع متدني. التدابير الغذائية ليست مطلوبة قبل أو بعد العلاج. يجب تكرار العلاج بعد تلوث منكر.

9. مدة الإنتظار:

اللحوم والبقايا: 7 أيام.

10. تحذيرات

- تحذيرات خاصة

لا يوجد.

- تحذيرات خاصة تتعلق بإستعمال الدواء في الحيوانات:

غير قابل للتطبيق.

- تحذيرات خاصة تتعلق لسلامة الشخص المُعالج بالمستحضر:

غير قابل للتطبيق.

- الحمل والإرضاع عند الحيوان المتعالج:

يمكن الإستعمال في فترة الحمل.

- ردود أفعال مع أدوية أخرى، وأنواع أخرى من التفاعلات:

غير معروف.

- مقدار دوائي مفرط:

معلومات غير متوفرة.

- عدم ملاءمة:

غير معروف.

11. تعليمات التخزين:

- تجنب التسمم! يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء آخر في مكان مغلق بعيداً عن متناول أيدي ومجال رؤية الأطفال و/أو الرضع، وبذلك تتفادى إصابتهم بالتسمم.
- "لا يجوز إستعمال الدواء بعد إنتضاء تاريخ الصلاحية (exp.Date) الذي يظهر على ظهر العبوة. يشير تاريخ إنتضاء الصلاحية إلى اليوم الأخير من نفس الشهر".
- يجب التخزين تحت 25 درجة مئوية.
- يجب التخزين في مكان جاف.
- يجب الحماية من الضوء.
- لا يجوز التخزين في البراد أو التجميد.
- يجب حفظه في العبوة الأصلية.

12. تعليمات بشأن التخلص من المستحضر/بقايا المستحضر عند نهاية الإستعمال:

يجب إبادة أية نفايات بيطرية متبقية أو أي نفايات ناتجة عن إستعمال مستحضر بيطري كنفايات سامة، ويجب عدم رميها في المجاري.

13. معلومات إضافية:

- يحتوي الدواء بالإضافة للمادة (المواد) الفعالة أيضاً على:

Lactose monohydrate
Calcium carbonate
Maize starch
Colloidal anhydrous silica

- حجم العبوة:

2.5 كلغ.

- كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العبوة:

مسحوق أبيض مائل للرمادي.

دلو من البلاستيك (بولي بروبيلين) باللون الأبيض وبداخله كيس داخلي من بولي إيثيلين وكأس قياس صغيرة من مادة بولي بروبيلين.

- صاحب الإمتياز وعنوانه:

إنتيرفيت إسرائيل م.ض. منطقة صناعية. ناقي نيئمان، هود هشارون 45240.

- إسم المنتج وعنوانه:

Intervet GesmbH, Siemensstrasse 107, 1210 Vienna, Austria

- أقرت وزارة الصحة صيغة هذه النشرة ومحتواها فُحص ورُخص في كانون الثاني 2020

- رقم سجل المستحضر في سجل المستحضرات الحكومي في وزارة الصحة

163-44-35216-00