

**نشرة طبية للمستهلك بموجب أنظمة الصيدالة (مستحضرات) - 1986**  
**الدواء يُسوق بموجب وصفة طبيب فقط**

## ديبروساليك غسول

### المركبات الفعالة:

يحتوي كل غرام على:

Betamethasone Dipropionate 0.64 mg (equivalent to 0.5 mg Betamethasone) بيتاميثازون ديبروبيونات 0.64 ملغ (يعادل 0.5 ملغ بيتاميثازون)  
Salicylic Acid 20 mg حمض الساليسيليك 20 ملغ  
لقائمة المواد غير الفعالة أنظر البند 6.1 "على ماذا يحتوي ديبروساليك غسول؟".

### اقرأ النشرة بامعان حتى نهايتها قبل استعمالك للدواء.

- تحتوي هذه النشرة على معلومات ملخصة عن ديبروساليك غسول. إذا كانت لديك أسئلة إضافية، اسأل طبيبك أو الصيدلي.
- هذا الدواء وُصف لعلاجك. لا تُعطه للآخرين. إنّه قد يسبب لهم الضرر حتى إذا بدا لك أن حالتهم الصحية مشابهة لحالتك.

### 1. ما هو ديبروساليك غسول ولأي غرض يُستعمل؟

ديبروساليك غسول هو ذو فعالية مضادة للالتهاب، مضادة للحكة، مضادة للحساسية وفعالية تقشير الجلد، للعلاج الموضعي لالتهابات الجلد دون الحادة التي تستجيب للعلاج بالكورتيكوستيروئيدات.

**الفصيلة العلاجية:** يحتوي ديبروساليك غسول على مادتين فعالتين، بيتاميثازون ديبروبيونات وحمض الساليسيليك. بيتاميثازون ديبروبيونات هو واحد من مجموعة أدوية المسماة كورتيكوستيروئيدات موضعية (للاستعمال الموضعي). يُصنّف كـ "كورتيكوستيروئيد فعال" (قوي). توضع هذه الأدوية على سطح الجلد من أجل التخفيف من الاحمرار والحكة التي تسببها مشاكل معينة في الجلد. يقوم حمض الساليسيليك بتنعيم طبقة القشرة العليا على سطح الجلد، والتي تسببها مشاكل الجلد لديك. هذا الأمر يمكن بيتاميثازون ديبروبيونات من الوصول للجلد المصاب الموجود تحتها، من أجل المساعدة على الشفاء.

### 2. قبل استعمال الدواء

#### 2.1 لا تستعمل ديبروساليك غسول:

- إذا كنت حساساً لبيتاميثازون ديبروبيونات، حمض الساليسيليك أو لأي واحد من المركبات الأخرى للدواء (المفصلة في البند 6).
- في كل مشكلة أخرى في الجلد، وذلك لأنه قد يؤدي لتفاقمها، بالأخص في حالة الغُد الوردية (حالة جلدية التي تؤثر على الوجه)، حب الشباب، التهاب الجلد حول الفم، حكة في الأعضاء التناسلية، تسميط (طرح من الحفاض)، قرحة برد جلدية، حُماق (جدري الماء) أو حالات أخرى في الجلد.

#### 2.2 تحذيرات خاصة تتعلق باستعمال ديبروساليك غسول

تحدّث إلى طبيبك أو الصيدلي قبل استعمال ديبروساليك غسول. لا يجوز استعمال هذا الدواء تحت ضمادات أو لاصقات. الأعراض الجانبية التي يمكن أن تحدث عند استعمال كورتيكوستيروئيدات مستنشقة أو عن طريق الفم، قد تحدث أيضاً مع كورتيكوستيروئيدات للاستعمال على الجلد، بالأخص لدى الرضع والأطفال. لا يجوز إشعال سيجارة أو التعرض للنار إلى أن يجف المستحضر تماماً. لا يجوز التدخين أو الإقتراب من شعلات مكشوفة. خطر لحروق صعبة. قماش (ملابس، أغطية أسرة، ضمادات وما شابه) الذي كان يتماس مع هذا المستحضر يشتعل بسهولة أكبر ويشكل خطر لحدوث حريق وخيم. غسل ملابس وأغطية أسرة قد يقلل من تراكم المستحضر لكن لا يزيله نهائياً. تواصل مع طبيبك إذا تعرضت لتشوش في الرؤية أو اضطرابات أخرى في الرؤية.

#### 2.3 الأطفال

إذا كان استعمال ديبروساليك غسول يحدث في أحيان متقاربة أكثر من الحاجة، أو أكثر مما وُصف، قد يؤثر الأمر على جزء من الهرمونات لدى أطفالكم. قد يؤثر الأمر على نموهم وتطورهم.

#### 2.4 تناول أدوية أخرى

إذا كنت تتناول أو إذا تناولت مؤخرًا أدوية أخرى، بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبيب وإضافات تغذية، عليك تبليغ الطبيب أو الصيدلي بذلك.

## 2.5 الحمل والإرضاع

إذا كنت حامل أو مرضعة، تعتقد أنك قد تكوني حامل أو تخططين للحمل، اطلبي نصيحة طبيبك أو الصيدلي قبل تناول هذا الدواء.

## 3. كيفية استعمال ديبروساليك غسول؟

يجب دائمًا استعمال هذا الدواء بالضبط كما قال لك طبيبك أو الصيدلي. تحقق من طبيبك أو الصيدلي إذا لم تكن واثقًا. المقدار الدوائي ونظام العلاج يحددان من قبل الطبيب فقط.

### الجرعة الدوائية الموصى بها

بشكل عام للكبار والأطفال، يجب دهن عدة قطرات من ديبروساليك غسول بلطف على المنطقة المصابة في الجلد حتى الامتصاص التام، مرتين في اليوم.

عليك التصرف دائمًا وفقًا لهذه التعليمات عند استعمال ديبروساليك غسول:

- لا يجوز استعمال كمية كبيرة من الغسول لفترة زمنية طويلة (مثلًا كل يوم لمدة أسابيع أو أشهر عديدة).
- تجنّب ملامسة الغسول لعينيك.

### الاستعمال لدى الأطفال

يجب تحديد الاستعمال لدى الأطفال لـ 5 أيام.

لا يجوز تجاوز الجرعة الدوائية الموصى بها.

### إذا استعملت ديبروساليك غسول أكثر مما كنت تحتاج

إذا تناولت جرعة زائدة أو إذا بلع طفل بالخطأ من الدواء، توجه فورًا لغرفة الطوارئ في المستشفى وأحضر عبوة الدواء معك. إذا استعملت الغسول في أحيان متقاربة أكثر مما كنت تحتاج، أو أكثر مما وُصف لك، قد يؤثر هذا الأمر على جزء من الهورمونات لديك. لدى الأطفال، قد يؤثر الأمر على نموهم وتطورهم. قد يؤدي هذا الأمر حتى لغثيان، تقيؤ ورنين في أذنيك. إذا لم تستعمل الغسول كما قيل لك، واستعملته في أحيان متقاربة للغاية و/أو لفترة زمنية متواصلة، عليك تبليغ طبيبك أو الصيدلي.

### إذا نسيت استعمال ديبروساليك غسول

إذا نسيت استعمال الغسول في الموعد الصحيح، استعمله لحظة تذكرك، وبعد ذلك أكمل الاستعمال كالمعتاد.

### إذا توقفت عن استعمال ديبروساليك غسول

إذا كنت تستعمل هذا الدواء لفترة زمنية طويلة ويبدو لك أن فروة الرأس قد تحسنت، لا يجوز التوقف عن استعمال هذا الدواء بشكل فجائي. إذا قمت بذلك، من المحتمل أن تعاني من احمرار، لسع وحرقة في فروة الرأس. من أجل تجنب ذلك، عليك التحدث مع طبيبك، الذي يقلل تدريجيًا من وتيرة استعمالك لهذا الدواء، إلى أن توقف العلاج تمامًا.

عليك إتمام العلاج بكامله كما أوصاك الطبيب.

حتى إذا طرأ تحسن على حالتك الصحية، لا يجوز إيقاف العلاج بهذا الدواء بدون استشارة طبيبك.

لا يجوز تناول الدواء في الظلام! يجب التحقق من الملصق والجرعة الدوائية في كل مرة تتناول فيها الدواء. يجب استعمال النظارات الطبية إذا كنت بحاجة إليها.

إذا توفرت لديك أية أسئلة إضافية بما يتعلق بهذا الدواء، اسأل طبيبك أو الصيدلي.

## 4. الأعراض الجانبية

كما بكل الأدوية، قد يسبب ديبروساليك غسول أعراضًا جانبية لدى جزء من المستعملين. لا تفرح عند قراءة قائمة الأعراض الجانبية، من المحتمل ألا تعاني أيًا منها.

في حال استعمالك للغسول في أحيان متقاربة أكثر مما تحتاج. قد يؤدي إلى:

- جلد دقيق، لسع، حويصلات، تقشّر، انتفاخ، حكة، حرقة، طفح جلدي، جفاف في الجلد ويحتمل أن تلاحظ علامات حمراء. يمكن أن يحدث الأمر بسهولة أكثر لدى الرضع والأطفال.
- التهاب في جريبات الشعر، نمو فائض للشعر، انخفاض في تصبغ الجلد وردود فعل تحسسية.
- التهاب الجلد، حالة تحدث بواسطة رد فعل الجلد لعامل خارجي، والذي يؤدي لجلد احمر ويحكّ.

• رؤية مشوشة.

إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقم أي من الأعراض الجانبية أو إذا لاحظت عرض جانبي لم يذكر في هذه النشرة، استشر طبيبك.

يمكن التبليغ عن أعراض جانبية لوزارة الصحة بواسطة الضغط على الرابط "التبليغ عن أعراض جانبية عقب علاج دوائي" الموجود في صفحة البيت لموقع وزارة الصحة ([www.health.gov.il](http://www.health.gov.il)) الذي يوجه لنموذج الإنترنت للتبليغ عن الأعراض الجانبية، أو عن طريق الدخول للرابط: <https://sideeffects.health.gov.il>

### 5. كيفية تخزين ديبروساليك غسول؟

- تجنب التسمم! يجب حفظ هذا الدواء، كأى دواء آخر، في مكان مغلق بعيداً عن متناول أيدي ومجال رؤية الأطفال و/أو الرضع، وبذلك تمنع التسمم. لا تسبب التقيؤ بدون تعليمات صريحة من الطبيب!
- لا يجوز استعمال هذا الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية (exp. date) الظاهر على العلبة. يشير تاريخ انتهاء الصلاحية إلى اليوم الأخير من الشهر المذكور.
- شروط التخزين: يجب التخزين بدرجة حرارة لا تتعدى 25 درجة مئوية.
- لا يجوز الاستعمال لفترة تتعدى الـ 6 أسابيع من موعد الفتح الأول.
- لا يجوز القاء الأدوية في مياه المجاري أو في القمامة البيئية. اسأل الصيدلي عن كيفية التخلص من الأدوية التي لم تعد قيد الاستعمال. تساهم هذه الوسائل في الحفاظ على البيئة.

### 6. معلومات إضافية

#### 6.1 على ماذا يحتوي ديبروساليك غسول؟

- المواد الفعالة هي بيتاميتازون ديبروبيونات وحمض الساليسيليك.
- بالإضافة للمواد الفعالة، يحتوي الدواء أيضاً على المركبات الغير فعالة: disodium edetate, hydroxypropyl methylcellulose, sodium hydroxide, isopropyl alcohol and purified water.

#### 6.2 كيف يبدو ديبروساليك غسول ومحتوى العلبة

ديبروساليك غسول هو محلول عديم اللون، لزج قليلاً. متوفر بقتاني تحتوي على 30 ملل.

#### 6.3 صاحب التسجيل:

شركة ميرك، شارپ ودوهم (إسرائيل- 1996) م.ض., ص.ب. 7121, بيتح-تكفا 49170.

#### 6.4 المنتج:

ميرك شارپ ودوهم كورپ., نيو-جيرسي, الولايات المتحدة.

تم فحص هذه النشرة والمصادقة عليها من قبل وزارة الصحة في كانون الأول 2018 وتم تحديثها وفقاً لتعليمات وزارة الصحة في تاريخ آب 2019.

رقم تسجيل الدواء في سجل الأدوية الحكومي في وزارة الصحة:

134-10-24243

للتبسيط ولتسهيل القراءة، صيغت هذه النشرة بصيغة الذكر. مع ذلك، فإنّ الدواء مخصص لكلا الجنسين.