

كسوفولوزا**40 ملغم**

أعراض مطالية

**كسوفولوزا****20 ملغم**

أعراض مطالية

التركيب:

كل قرص مطلي يحتوي على:

باليوكسافير ماربوكسيل 40 ملغم

Baloxavir marboxil 40 mg

Baloxyavir marboxil 20 mg

*معلومات حول المركبات غير الفعالة، انظر البند 6 - "معلومات إضافية".

- أقرّ النشرة بمتاعبها حتى نهايتها وذلك قبل البدء باستعمال الدواء. تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء، إذا كانت لديك أسئلة إضافية، توجه إلى الطبيب أو الصيدلي.

- يوصي هذا الدواء لعلاج مرضك. لا تتعاطه للأخرين؛ لأنه قد يضر بهم، حتى لو بدا لك تشابه بين حالتك وحالتهم الصحية.

- الدواء مخصص للمتعالجين الذين أعمارهم أكثر من 12 عاماً.

1. لم أعد هذا الدواء؟

يُستعمل هذا الدواء لعلاج الإنفلونزا الحادة دون مضاعفات لدى المتعالجين الذين أعمارهم أكثر من 12 عاماً، والذين عانوا من أعراض الإنفلونزا لفترة أقل من 48 ساعة.

التفيدات: تتغير فيروسات الإنفلونزا طوال الوقت، لهذا فإن عوامل مثل نوع الفيروس والنوع الشانوي من الفيروس، ظهرت مقاومة أو التغيرات التي تطرأ على مدى عدانية الفيروس قد تنقل من الأهمية السريرية للأدوية المضادة للفيروسات. هناك حاجة إلى الأخذ بعين الاعتبار طبيعة حساسية الدواء لأنواع الإنفلونزا الموسمية عند اتخاذ القرار لاستعمال كسوفولوزا.

الفصيلة العلاجية: أدوية مضادة للفيروسات.

كسوفولوزا هو دواء مضاد للفيروسات، يعمل ضد فيروس الإنفلونزا.
إنه يُثبط نشاط إنزيم إندونوكلياز (endonuclease).

2. قبل استعمال الدواء

☒ يُمنع استعمال الدواء إذا:

- كانت لديك حساسية (ارتجاع) لباليوكسافير ماربوكسيل أو لكل واحد من المركبات الأخرى التي يحتوي عليها الدواء (المفصلة في البند 6 "معلومات إضافية").

☒ تحذيرات خاصة متعلقة باستعمال الدواء

- توجه إلى الطبيب المعالج، الصيدلي أو الممرضة فوراً إذا تعرضت لرد فعل فرط التحسس تجاه الدواء، الذي يشتمل على: صعوبات في التنفس، طفح جدي، شرى أو بثرات جلدية، تورم الوجه، الحنجرة أو الفم، دوخة أو الشعور بالدوار.

التفاعلات بين الأدوية

إذا كنت تتناول أو تناولت مؤخراً، أدوية أخرى بما في ذلك أدوية دون وصفة طبية ومكمّلات غذائية، فأغیر الطبيب أو الصيدلي بذلك. لا سيما إذا كنت تتناول مواد مسّهلة معينة، مضادات الحموضة، ومكمّلات غذائية مثل الكالسيوم، الحديد، المغنيسيوم، السيلينيوم، والزنك.

عليك استشارة الطبيب قبل تلقي لقاح حيٍ مضيق، بعد تناول كسوفولوزا.

استعمال الدواء والغذاء

يمكن تناول الدواء مع أو من دون طعام.

يجب تجنب تناول الدواء مع منتجات الحليب والمشروبات الغنية بالكالسيوم.

الحمل والإرضاع

إذا كنت حاملاً أو تخططين للحمل عليك استشارة الطبيب أو الصيدلي قبل استعمال كسوفولوزا. من غير المعروف إذا كان من الممكن أن يُؤثّر الدواء ضرراً بالجنين.

إذا كنت مرضعة أو تخططين للإرضاع، استشيري الطبيب أو الصيدلي قبل استعمال الدواء.

ليس معروفاً فيما إذا كان الدواء يمر عبر حليب الأم.

معلومات مهمة عن قسم من مركبات الدواء

يحتوي الدواء على الالكتنوز، لهذا إذا أخبرك طبيبك أن لديك عدم القدرة على تحمل سكريات معينة، فاستشيره قبل تناول كسوفولوزا.

3. كيف تستعمل الدواء؟

يجب دائماً استعمال الدواء حسب تعليمات الطبيب.

افضل مع الطبيب أو الصيدلي إذا لم تتأكد فيما يتعلق بالجرعة وطريقة العلاج بالدواء.

ليست هناك معلومات حول سحق/شطر/مضغ القرص.

يتم بدء العلاج بكسوفولوزا خلال 48 ساعة من ظهور الأعراض.

يجب تناول الدواء عبر الإبتلاع - قرصين في جرعة واحدة.

الجرعة وطريقة العلاج يحددهما الطبيب فقط. الجرعة الموصى بها عادة لدى المتعالجين فوق سن 12 عاماً:

وزن جسم المتعالج (كغم)	الجرعة الموصى بها
80-40 كغم	نُعطي لمرة واحدة 40 ملغم
أكثر من 80 كغم	نُعطي لمرة واحدة 80 ملغم

يُمنع تجاوز الجرعة الموصى بها.

إذا تناولت عن طريق الخطأ، جرعة أعلى

إذا تناولت جرعة مفرطة أو إذا قام طفل بابتلاع كمية من الدواء عن طريق الخطأ، فتوجه فوراً إلى الطبيب أو إلى غرفة الطوارئ في المستشفى، وأحضر عليه الدواء معك.

عليك المواضبة على العلاج وفقاً لتوصية الطبيب.

يُمنع تناول الأدوية في الظل! تحقق من الملصق على عبوة الدواء ومن الجرعة الدوائية

في كل مرة تتناول فيها دواء، ضع النظارات الطبية إذا كنت بحاجة إليها.

إذا كانت لديك أسئلة إضافية بالنسبة إلى استعمال الدواء فاستشيري الطبيب أو الصيدلي.

4. الأعراض الجانبية

كجميع الأدوية، قد يُسبب استعمال كسوفولوزا أعراضًا جانبية لدى قسم من المستعملين. لا

تفزع عند قراءة قائمة الأعراض الجانبية. فقد لا تعاني من أي منها.

توجه إلى الطبيب المعالج إذا تعرضت لرد فعل فرط التحسس تجاه الدواء، الذي يشتمل على:

- صعوبات في التنفس

- طفح جدي، شرى أو بثرات جلدية

- تورم الوجه، الحنجرة أو الفم

- دوخة أو الشعور بالدوار

أعراض جانبية أخرى

- إسهال

- التهاب القصبات

- غثيان

- التهاب الجيوب الأنفية

- صداع

تنت ملاحظة الأعراض الجانبية التالية خلال استعمال دواء كسوفولوزا وذلك بعد تسويفه.

• **الجسم كله:** تورم الوجه، الجفنين أو اللسان؛ اضطرابات الصوت (صعوبة في الكلام)؛

وذمة (Angioedema)؛ ردود فعل تناقية وأرجية (فرط التحسس)؛ وصدمة تناقية.