

منيرين ميلت 60 مكغ**منيرين ميلت 120 مكغ**

تؤخذ الأقراص تحت اللسان.

المواد الفعالة

- Minirin Melt 60 mcg

يحتوي كل قرص على

(desmopressin free base)

(added as desmopressin acetate)

- Minirin Melt 120 mcg

يحتوي كل قرص على

(desmopressin free base)

(added as desmopressin acetate)

المواد غير الفعالة - انظر البند 6 "معلومات إضافية".

اقرأ النشرة بتمعن حتى نهايتها وذلك قبل البدء باستعمال الدواء.

تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء. إذا كانت لديك أسئلة إضافية، توجه

إلى الطبيب أو الصيدلي.

وُصف هذا الدواء لعلاج مرضك. لا تعطه للآخرين؛ لأنه قد يضرهم، حتى لو بدا لك

تشابه بين مرضك ومرضهم.

1. لم أعد هذا الدواء؟

الدواء معد لمعالجة سلس البول الليلي (Nocturnal enuresis).

الفصيلة العلاجية: بديل أصناعي لهرمون الفازوبريسين (Vasopressin).

2. قبل استعمال الدواء.

يمضن استعمال الدواء إذا:

- كانت لديك حساسية للدسموبريسين (Desmopressin) أو لأحد مركيبات الدواء

الأخرى (انظر البند 6).

- كنت تعاني من مرض خطير في القلب أو الكلى

- كنت تتناول أدوية مدرة للبول

- كنت تتناول كميات كبيرة جداً من السوائل، بما فيها الكحول

- كان عمرك أقل من 5 سنوات أو أكثر من 65 عاماً

- كانت لديك مستويات منخفضة من الصوديوم في الدم (Hyponatremia)

- كنت تعاني من حالة طيبة مع فرط إفراز هرمون ADH (متازمة إفراز غير سليم

لهرمون (ADH) لهرمون

أعراض جانبية شائعة (أعراض تظهر لدى 1-10 مستعمل من بين كل 100)

البالغون:

• ارتفاع ضغط الدم

• إسهال، إمساك

• اعراض في جهاز البول

• نعس

• تورم بسبب احتباس السوائل

أعراض جانبية ليست شائعة (أعراض تظهر لدى 1-10 مستعمل من بين كل 1,000)

البالغون:

• مشكلات في النوم، نعاس

• فقدان الإحساس، لسع، حرقة أو شعور بخدش الجلد (paresthesia).

• اضطرابات في الرؤية

• شعور بضربات قلب غير منتظمة (خفقان)

• ضغط الدم منخفض

• صفيق النفس (dyspnea)

• مشكلات في المعدة، صعوبات في الهضم، غازات، تورم

• تعرق، حكة، طفح، شرى

• تشنج العضلات، الم في العضلات

• الم في الصدر

• اعراض شبيهة بالإلتلونزا

• تغير في إداء المict

• مستويات بوتاسيوم منخفضة في الدم

الأطفال والمراهقون:

• عدائية

• نفس الاستقرار الشعوري

• إسهال

• اعراض في جهاز البول

• تورم بسبب احتباس السوائل

• نعس

أعراض جانبية نادرة (أعراض تظهر لدى 1-10 مستعمل من بين كل 10,000)

البالغون:

• ردود فعل جلدية

• الأطفال والمراهقون:

• اعراض القلق

• كوابيس

• تغيرات في المزاج

• نعس

• ضغط الدم مرتفع

• عصبية

أعراض جانبية لا يمكن تحديد وترتتها استناداً إلى المعلومات المتوفرة:

البالغون:

• ردود فعل تأقية (ردود فعل تحسسية حادة)

• تشنجات

3. كيف تستعمل الدواء؟

يجب دائمًا استعمال الدواء حسب تعليمات الطبيب.

افحص مع الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكن متاكذاً فيما يتعلق بالجرعة وطريقة العلاج

بالمستحضر.

العبرة الطبيعية العلاج يعتمد هنا الطبيب، فقط.

العبرة الابتدائية الموصى بها عادة هي 120 ميكروغرام، تحت اللسان، قبل النوم. عند

الحاجة، قد يرفع الطبيب العبرة حتى 240 ميكروغراماً للتناول تحت اللسان قبل النوم.

يمنع تجاوز العبرة الموصى بها.

طريقة الاستعمال:

يؤخذ الدواء تحت اللسان. يجب وضعه تحت اللسان، حتى يذوب كلياً، ولا داعي للماء.

يمنع تناول أكثر من عبرة مسجلة واحدة خلال 24 ساعة.

الأطفال والمرأهقون:

- ردود فعل تأقية (ردود فعل تحسسية حادة)
- سلوك غير سليم
- اضطرابات شعورية
- اكتئاب
- هلوسة
- أرق
- اضطرابات في التركيز
- عدم الهدوء وفرط الحركة
- تشنجات
- نزيف من الأنف
- ردود فعل جلدية، طفح، تعرق، شرى

إذا ظهر أحد الأعراض الجانبية، إذا تفاقم أيٌّ من الأعراض الجانبية، أو إذا عانيت من عارض جانبي لم يُذكر في النشرة، عليك استشارة الطبيب.

من الممكن تبليغ وزارة الصحة بأعراض جانبية من خلال الضغط على الرابط "التبليغ عن أعراض جانبية نتيجة لعلاج دوائي" الموجود على الصفحة الرئيسية في موقع وزارة الصحة (www.health.gov.il) والذي يحولك إلى استماراة على الإنترنت للتبلغ عن الأعراض الجانبية، أو عبر دخول الرابط: <https://sideeffects.health.gov.il>

5. كيف يُخزن الدواء؟

• تجنب التسمم! يجب حفظ هذا الدواء، وكل دواء آخر، في مكان مغلق، بعيداً عن متناول

أيدي و المجال رؤية الأولاد وأو الأطفال، وهكذا تجنب التسمم. لا تسبب التقيؤ دون تعليمات صريحة من الطبيب.

• يُمنع استخدام الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية (exp. date) الظاهر على العبوة. تاريخ انتهاء الصلاحية يُنسب إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.

• يجب تخزين الدواء بدرجة حرارة أقل من 25°C.

6. معلومات إضافية

بالإضافة إلى المواد الفعالة، يحتوي الدواء، أيضاً على:

Gelatin ,Mannitol ,Citric acid

كيف يبدو الدواء وماذا تحتوي العبوة:

منيرين ميلت 120 مكغ: قرص أبيض، مستدير عليه ختم قطرتين في جانب واحد منه.

منيرين ميلت 60 مكغ: قرص أبيض، مستدير عليه ختم قطرة واحدة في جانب واحد منه.

تأتي المستحضرات في عبوات تتضمن 30 قرصاً.

صاحب التسجيل وعنوانه:

شركة فرينج الصيدلانية م.ض.، شارع هشيطا 8، الدفيئة الصناعية، قيسارية، 3088900.

اسم المنتج وعنوانه: فرينج، ألمانيا.

تم تحريرها في آب 2020.

رقم تسجيل الدواء في سجل الأدوية الرسمي في وزارة الصحة:

منيرين ميلت 60 مكغ 137 22 31462

منيرين ميلت 120 مكغ 137 23 31463

لتبسيط قراءة هذه النشرة وتسهيلها ورد النص بصيغة المذكور، مع ذلك، فالدواء مخصص

لكل الجنسين.