

ספטמבר 2020

רופא /ה, רוקח/ת נכבד/ה

לפי אתר משרד הבריאות VENLA 37.5 tablets וונלה 37.5 טבליות

(VENLAFAXINE AS HYDROCHLORIDE 37.5 MG)

לפי אתר משרד הבריאות VENLA 75 tablets וונלה 75 טבליות

(VENLAFAXINE AS HYDROCHLORIDE 75 MG)

### עדכונים בעלון לצרכן

ברצוננו להודיע שהעלון לצרכן עודכן. בפירוט שלהלן כלולים העדכונים העיקריים. שאר השינויים שנעשו בעלון הינם שינויים בפורמט העלון ושינויי נוסח, ואינם מפורטים מטה. תוספות המידע מודגשות **בצהוב**

#### עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים (תכשירים) התשמ"ו - 1986

התרופה משווקת על פי מרשם רופא בלבד

וונלה 37.5; 75

טבליות

#### הרכב:

**וונלה 37.5:** כל טבליה מכילה: ונלפקסין 37.5 מ"ג כמלח הידרוכלוריד Venlafaxine 37.5 mg as the hydrochloride salt  
כמו-כן מכילה: 30 מ"ג לקטוז

**וונלה 75:** כל טבליה מכילה: ונלפקסין 75 מ"ג כמלח הידרוכלוריד Venlafaxine 75 mg as the hydrochloride salt  
כמו-כן מכילה: 60 מ"ג לקטוז

קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש בתרופה עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח. . תרופה זו נרשמה לטיפול במחלתך. אל תעביר אותה לאחרים. היא עלולה להזיק להם אפילו אם נראה לך כי מחלתם דומה.

תרופות נוגדות דיכאון וחרדה מעלות את הסיכון להתנהגות ומחשבות אובדניות בילדים, מתבגרים ומבוגרים צעירים עד גיל 25.  
עם תחילת הטיפול בתרופה, על המטופלים בכל הגילאים וקרוביהם, לעקוב אחר השינויים ההתנהגותיים כגון: החמרת הדיכאון, מחשבות אובדניות, תוקפנות וכדומה. אם חלים שינויים כגון אלה, יש לפנות מייד לרופא (ראה סעיף 2)

### 1. למה מיועדת התרופה?

**וונלה** היא תרופה נוגדת דיכאון השייכת לקבוצת תרופות מסוג נוגדי דיכאון מקבוצת SNRIs (Serotonin Noradrenaline Reuptake Inhibitors). קבוצת תרופות זו משמשת לטיפול בדיכאון. מנגנון הפעולה של נוגדי הדיכאון אינו ברור דיו, התרופות יכולות להשפיע על עליית רמות סרוטונין ונוראדרגלין במוח.  
**וונלה** מיועדת לטיפול במבוגרים הסובלים מדיכאון. יש חשיבות גבוהה לטיפול בדיכאון. ללא טיפול, ייתכן שמצבך לא יחלוף ואפילו עלול להחמיר, כך שקשה יהיה לטפל בעתיד. התרופה **וונלה** אינה מיועדת לטיפול בילדים ומתבגרים מתחת לגיל 18.

## 2. לפני השימוש בתרופה

### אין להשתמש בתרופה אם:

- אתה רגיש (אלרגי) לחומר הפעיל(ונלאפקסין) או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה (ראה סעיף 6 "מידע נוסף").
- אתה נוטל או נטלת ב-14 הימים האחרונים מעכבים בלתי הפיכים של האנזים מונואמיין אוקסידאז (MAIOs) המשמשים לטיפול בדיכאון ובמחלת פרקינסון. נטילת תרופות מסוג MAIOs שאינו הפיך יחד עם ונולה עלולה לגרום לתופעות לוואי חמורות ומסכנות חיים. בנוסף, יש להמתין לפחות 7 ימים מעת סיום הטיפול בוונלה ועד התחלת הטיפול בMAIOs. ראה סעיף "תגובות בין תרופתיות" ומידע בסעיף זה לגבי"תסמונת סרטונין".

### אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה:

- **לפני הטיפול בוונלה ספר לרופא אם:**
  - הנך נוטל תרופות נוספות אשר מעלות את הסיכון לתסמונת סרטונין כאשר נלקחות יחד עם ונולה (ראה סעיף 2"תגובות בין-תרופתיות").
  - הנך סובל ממחלות עיניים, כגון גלאוקומה מסוגים מסוימים (לחץ תוך עיני מוגבר).
  - הנך סובל מיתר פעילות בלוטת המגן (תירואיד).
  - הנך סובל או סבלת בעבר מיתר לחץ דם.
  - הנך סובל או סבלת בעבר ממחלות לב.
- **נאמר לך שאתה סובל מקצב לב לא סדיר.**
- סבלת בעבר מעוויתות (פרכוסים).
- סבלת מרמות נמוכות של נתרן בדם (היפונתרמיה).
- יש לך נטייה לפתח חבורות (שטפי דם תת עוריים) או לדמם בקלות (היסטוריה של בעיות קרישה), או אם הנך נוטל תרופות
- העלולות להעלות את הסיכון לדימום, כגון וארפרין(למניעת קרישי דם).
- הנך סובל מעלייה ברמות הכולסטרול.
- סבלת בעבר או קרוב משפחתך סבל ממאניה או מהפרעה דו קוטבית (תחושת התרגשות יתר או אופוריה).
- יש לך היסטוריה של התנהגות תוקפנית.
- תרופות כגון **וונלה** (הנקראות מעכבים סלקטיביים של ספיגה מחדש של סרטונין SSRIs) או מעכבי ספיגה מחדש של של סרטונין ונר אדרנלין (SNRIs) עלולות לגרום לתסמינים של ליקוי בתפקוד המיני (ראה סעיף 4 "תופעות לוואי"). בחלק מהמקרים, תסמינים אלו נמשכו לאחר הפסקת הטיפול.
- **וונלה** עלולה לגרום לתחושת אי שקט או חוסר יכולת לשבת או לעמוד ללא תזוזה בשבועות הראשונים לטיפול. עליך לספר לרופא, אם אתה סובל ממצב זה.
- **מחשבות אובדניות והחמרה בדיכאון או בהפרעת החרדה שלך:**

אן אתה מדוכא ו/או סובל מהפרעת חרדה ייתכן שיהיו לך מחשבות של פגיעה עצמית או מחשבות אובדניות. מחשבות אלה עלולות להחמיר בתחילת השימוש בנוגדי דיכאון, משום שלוקח זמן עד שתרופות אלה מתחילות לפעול, בדרך כלל כשבועיים אך לעיתים יותר. ייתכן שתהיה בסבירות יותר גבוהה לחשוב בצורה זו אם: היו לך בעבר מחשבות אובדניות או מחשבות על פגיעה עצמית. אתה מבוגר צעיר. מידע ממחקרים קליניים הראה כי קיים סיכון מוגבר להתנהגות אובדנית במבוגרים צעירים (מתחת לגיל 25) עם מצבים פסיכיאטריים שטופלו בנוגדי דיכאון. אם יש לך מחשבות של פגיעה עצמית או מחשבות אובדניות בכל זמן שהוא, צור קשר עם הרופא שלך או פנה מייד לחדר מיון של בית חולים.

ייתכן שיועיל לספר לקרוב משפחה או חבר אם אתה סובל מדיכאון או הפרעת חרדה ולבקש מהם לקרוא עלון זה. שאל אותם אם לדעתם חל החמרה בדיכאון או בחרדה, או אם הם מודאגים משינויים בהתנהגותך.
- **יובש בפה:** דווח על יובש בפה ב-10% מהמטופלים **בוונלה** - מצב זה עלול להעלות את הסיכון לעששת ולכן, יש להקפיד על היגיינת הפה.
- **סוכרת:** רמת הסוכרבים עלולה להשתנות, לכן אם הנך חולה סוכרת, יש להתייעץ עם הרופא. לגבי התאמת מינון התרופות לטיפול בסוכרת.

### ילדים ומתבגרים:

תרופה זו אינה מומלצת לשימוש בילדים ובמתבגרים מתחת לגיל 18. כמו כן, עליך לדעת כי מטופלים מתחת לגיל 18 הם בעלי סיכון גבוה יותר לתופעות לוואי כגון: ניסיון התאבדות, מחשבות אובדניות ועוינות (בעיקר תוקפנות, התנגדות וכעס) בנטילת תרופה מקבוצה זו. למרות זאת, הרופא יכול לרשום תרופה זו לחולים מתחת לגיל 18 כאשר הוא חושב שזה לטובתם. אם הרופא רשם לך את התרופה למטופל מתחת לגיל 18 וברצונך לשוחח עם הרופא בקשר לכך- פנה חזרה לרופא.

יש לדווח לרופא אם אחד או יותר מהתסמינים המפורטים לעיל הופיעו או הוחמרו במטופלים מתחת לגיל 18 הנוטלים את התרופה. כמו כן, אין נתונים לגבי השפעות ארוכות טווח מהיבט הבטיחות ביחס לגדילה, התבגרות, התפתחות קוגניטיבית והתפתחות התנהגותית בקבוצת גיל זו.

### בדיקות ומעקב

**וונלה** עלולה לגרום לתופעות בלתי רצויות שלא תהיה מודע להן, כגון עלייה בלחץ הדם או הפרעות בקצב הלב, שינויים קלים ברמות אנזימי כבד, ברמות הנתרן או הכולסטרול בדם. לעיתים רחוקות יותר, **וונלה** עלולה לפגם

בפעילות טסיות הדם ולגרום לעלייה בסיכון לחבורות או לדימום לחבלות ודימומים. לכן, ייתכן שהרופא יבקש לבצע בדיקות דם, מידי פעם, במיוחד אם הנך נוטל **וונלה** תקופה ממושכת.

#### תגובות בין-תרופתיות:

**אם אתה לוקח, או אם לקחת לאחרונה, תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח**

**אין להפסיק או להתחיל ליטול תרופות כולל תרופות ללא מרשם או תוספי תזונה מבלי להתייעץ תחילה עם הרופא.** רופאך יחליט האם אתה יכול לקחת **וונלה** עם תרופות אחרות כגון:

**אין ליטול** מעכבי מונואמין אוקסידאז (MAOIs) המשמשים לטיפול בדיכאון או במחלת הפרקינסון **יחד עם וונלה**. ספר לרופא אם נטלת תרופות מסוג זה ב- 14 הימים האחרונים. ראה מידע מפורט בסעיף "אין להשתמש בתרופה אם", תחת סעיף זה תכשירים הקשורים לתסמונת סרטונין:

- תסמונת סרטונין:
- מצב שעלול לסכן חיים או תסמינים דמויי תסמונת נירולפטית ממאירה (NMS) (ראה סעיף 4 "תופעות לוואי") יכולים להתרחש בזמן הטיפול עם **וונלה**. במיוחד כאשר תרופות נוספות נלקחות בו זמנית.

דוגמאות לתרופות אלה כוללות:

- טריפטנים ( לטיפול במיגרנה)
- תרופות אחרות לטיפול בדיכאון, למשל: מעכבים סלקטיביים של ספיגה מחדש של סרטונין (SSRIs), מעכבי ספיגה מחדש של סרטונין ונור אדרנלין (SNRIs); נוגדי דיכאון טריציקליים או, תרופות המכילות ליתיום
- **תרופות המכילות אמפטמינים (לטיפול בהפרעות קשב וריכוז, נרקולפסיה והשמנת יתר).**
- תרופות המכילות לינזוליד, אנטיביוטיקה (לטיפול בזיהומים)
- תרופות המכילות מוקלובמיד, של מעכב הפיך של MAOI (לטיפול בדיכאון)
- תרופות המכילות סיבוטראמין (לירידה במשקל)
- תרופות המכילות טרמדול (תרופה לשיכוך כאבים), פנטניל, טפנטאדול, פטידין או פנטזוצין (לשיכוך כאבים חמורים).
- תרופות המכילות דקסטרומתורפאן (להקלת שיעול).
- תרופות המכילות מתאדון (לטיפול בהתמכרות לאופיאטים או לטיפול בכאב חמור).
- תרופות המכילות מתילן בלו (לטיפול ברמות גבוהות של מטהמוגלובין בדם);
- תכשירים המכילים St. John's Wort, (נקרא גם היפיריקום פרפוראטום, תמצית צמחים המשמשת לטיפול בדיכאון קל).
- תכשירים המכילים טריפטופן (לבעיות שינה ונגד דיכאון).
- תרופות אנטי פסיכוטיות לטיפול המחלה עם תסמינים כגון: שמיעה, ראייה או תחושה של דברים שלא קיימים, אמונות שווא, חשדנות חריגה, הגיון לא ברור, הסתגרות.

סימנים ותסמינים של תסמונת סרטונין, עשויים לכלול שילוב של חוסר מנוחה, הזיות, חוסר קואורדינציה, קצב לב מהיר, עליה בחום הגוף, שינויים מהירים בלחץ הדם, רפלקסים מוגברים, שלשול, תרדמת, בחילה, הקאה. תסמונת סרטונין בצורתה החמורה ביותר יכולה להידמות לתסמונת נירולפטית ממאירה (NMS). **סימנים ותסמינים של תסמונת זו עשויים לכלול שילוב של חום גבוה, קצב לב מהיר, הזעה, נוקשות שרירים חמורה, בלבול, עלייה באנזימי השריר (נקבעת בבדיקת דם).**

#### **ספר מייד לרופא, או פנה לחדר מיון של בית החולים הקרוב, אם אתה חושב שיש לך תסמונת סרטונין.**

יש ליידע את הרופא אם אתה נוטל תרופות המשפיעות על קצב הלב למשל:

- **תרופות לטיפול בהפרעות בקצב הלב כגון: כינידין, אמיודורון, סוטלול או דופטיליד.** תרופות אנטי פסיכוטיות כגון תיורידזין (ראה גם "תסמונת סרטונין" לעיל)
- אנטיביוטיקות כגון **אריתרומיצין או מוקסיפלוקסאצין** (לטיפול בזיהום חיידקי)
- **אנטיהיסטמינים (לטיפול באלרגיה)**
- ייתכן שהתרופות הבאות יגיבו עם וונלה, לכן יש להשתמש בהן בזהירות. חשוב במיוחד ליידע את הרופא או הרוקח אם אתה נוטל תרופות המכילות:
- אטאזאביר, קלריתרומיצין, אינדינאביר, **איטראקונזול, זוריקונאזול, פוסאקונזול, קטוקונאזול,** גלפונאביר, ריטונאביר, סאקווינאביר, טליתרומיצין
- האלופרידול או ריספרידון (לטיפול במצבים פסיכיאטריים)
- מטופרולול (חוסם בטא, לטיפול ביתר לחץ דם ובעיות לב)
- **גלולות למניעת הריון**

**נטילת וונלה ומזון:** יש ליטול **וונלה** עם אוכל (ראה סעיף 3 "כיצד תשתמש בתרופה?").

**שימוש בתרופה וצריכת אלכוהול:** יש להמנע מצריכת אלכוהול בזמן שאתה נוטל **וונלה**.

**הריון והנקה:** אם את בהריון או מניקה, חושבת שאת בהריון או מתכננת הריון, היועצי ברופא לפני שימוש בתרופה זו. ניתן להשתמש ב**וונלה** רק לאחר התייעצות עם הרופא לגבי התועלת האפשרית ולגבי הסיכונים האפשריים לעובר.

יש ליידע את רופאך אם את נוטלת **וונלה** במהלך ההריון.

בזמן נטילה בהריון, תרופות דומות (SSRIs) עלולות להעלות את הסיכון למצב חמור בתינוקות הנקרא יתר לחץ דם ריאטי מתמשך (PPHN) הגורם לליילוד לנשום מהר יותר ולהראות כחלחל. תסמינים אלה מופיעים בדרך כלל ב-24 השעות הראשונות לאחר שהתינוק נולד. אם זה קורה לתינוק שלך עלייך לפנות מיד לרופא.

תסמין נוסף שעלול להופיע ביילוד שאמו נטלה **וונלה** בזמן ההריון הינו שהיילוד לא יאכל כראוי, **זאת בנוסף לבעיות נשימה**. אם לתינוק שלך מופיעים תסמינים אלה לאחר הלידה ואת מודאגת, צרי קשר עם הרופא לצורך התייעצות.

**וונלה** עוברת לחלב אם ולכן קיים סיכון שהתרופה תשפיע על התינוק. לפיכך יש להתייעץ עם הרופא על מנת להחליט אם יש להפסיק להניק או להפסיק טיפול עם התרופה זו.

#### **נהיגה ושימוש במכונית:**

השימוש בתרופה זו עלול חפגום בשיקול הדעת, בחשיבה, בתנועה ובקורדינאציה, כמו כן עלול לגרום לבעיות ראייה. אם אתה מושפע באופן זה, אין לנהוג, להשתמש במכונית או להשתתף בפעולות אשר עלולות לסכן אותך או אחרים בעקבות השפעות אלה.

**מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה:** תרופה זו מכילה לקטוזאם נאמר לך בעבר על ידי הרופא שיש לך אי סבילות לסוכרים מסוימים, יש להיוועץ ברופא לפני תחילת הטיפול. כל טבליה של **וונלה 37.5** מכילה 30 מ"ג לקטוז. כל טבליה של **וונלה 75** מכילה 60 מ"ג לקטוז.

### **3. כיצד תשתמש בתרופה?**

תמיד יש להשתמש לפי הוראות הרופא. אם אינך בטוח, היוועץ ברופא או ברוקח. המינון ואופן הטיפול יקבעו על ידי הרופא בלבד.

אם הנך סובל ממחלת כבד או כליות, צור קשר עם רופאך, שכן ייתכן ורופאך ישנה את המינון. **אין לעבור על המנה המומלצת.**

יש לבלוע את התרופה עם מעט מים.

יש ליטול את התרופה עם הארוחה, בבוקר ובערב, בסביבות אותן השעות מדי יום. במידת הצורך ניתן לחצות או לכתוש את הטבליה לפני השימוש.

יש להשתמש בתרופה זו בזמנים קצובים כפי שנקבע על ידי הרופא המטפל.

אין להפסיק ליטול את התרופה ללא התייעצות עם הרופא שלך (ראה סעיף "אם אתה מפסיק את נטילת התרופה").

**אם נטלת בטעות מינון גבוה יותר,**

**אם נטלת מנת יתר, פנה מייד לרופא.**

אם בטעות בלע ילדמן התרופה, פנה מייד לרופא או לחדר מיון של בית חולים והבא אריזת התרופה אתך. תסמינים של מינון יתר עלולים לכלול קצב לב מהיר, שינויים ברמת הערנות (מישנוניות עד לקומה), ראייה מטושטשת, פרכוסים או עוויתות והקאות.

**אם שכחת ליטול את התרופה**

אם שכחת ליטול תרופה זו בזמן המיועד, יש ליטול מנה מייד כשזכרת, אך אם הגיע הזמן למנה הבאה, יש לדלג על המנה שנשכחה וליטול את המנה הבאה כרגיל. בשום אופן אין ליטול יותר מהמנה היומית שנרשמה עבורך.

יש להתמיד בטיפול כפי שהומלץ על ידי הרופא.

**אם אתה מפסיק את נטילת התרופה:**

גם אם חל שיפור במצב בריאותך אין להפסיק את הטיפול בתרופה או להפחית את מינון ללא התייעצות עם רופאך. הרופא שלך ינחה אותך אותך כיצד להפחית את המינון בהדרגה לפני הפסקת הטיפול לחלוטין אם הוא חושב שאינך זקוק יותר לטיפול בתרופה זו.

הפסקה פתאומית של התרופה או ירידה מהירה מידי במינון עלולה להיות מלווה בתופעות לוואי כגון עייפות, סחרחורת, **תחושת סחרור**, כאב ראש, נדודי שינה, סיוטים, יובש בפה, איבוד תיאבון, בחילה, שלשול, עצבנות, חוסר מנוחה, בלבול, צלצולים באוזניים, תחושות עקצוץ או לעתים נדירות תחושות של שוק חשמלי, חולשה, הזעה, פרכוסים, תסמינים דמויי שפעת. רופאך ידריך אותך לגבי ירידה הדרגתית במינון.

אם הנך חווה אחד או יותר מהתסמינים הללו או תסמינים מדאיגים אחרים, היוועץ ברופאך.

**אין ליטול תרופות בחושך! בדוק התווית והמנה בכל פעם שהנך נוטל תרופה. הרכב משקפיים אם הנך זקוק להם.**

**אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היוועץ ברופא או ברוקח.**

#### 4. תופעות לוואי

כמו בכל תרופה, השימוש בוונלה עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשימת תופעות הלוואי. יתכן ולא תסבול מאף אחת מהן.

יש להפסיק את השימוש ולפנות מייד לרופא או לחדר מיון בבית חולים בהופעת אחת או יותר מתופעות הלוואי הבאות: תופעות לוואי שאינן שכיחות (תופעות שמופיעות ב 10-1 משתמשים מתוך 1,000): נפיחות של הפנים, הפה, הלשון, הגרון, הידיים או כפות הרגליים ו/או פריחה מגרדת ובולטת (חרלת), קושי בבליעה או בנשימה.

תופעות לוואי נדירות (תופעות שמופיעות ב 10-1 משתמשים מתוך 10,000):

לחץ בחזה, צפצופים, קושי בבליעה או בנשימה  
פריחה חמורה בעור, גרד או חרלת (נגעים בולטים בעור בצבע אדום או חסרי צבע שבדרך כלל מגרדים). סימנים ותסמינים של תסמונת סרטונין שעשויים לכלול: אי שקט, הזיות, חוסר קואורדינציה, קצב לב מהיר, עלייה בחום הגוף, שינויים מהירים בלחץ הדם, רפלקסים מוגברים, שלשול, תרדמת, בחילה, הקאה. תסמונת סרטונין בצורתה החמורה ביותר יכולה להידמות לתסמונת נוירולפטית ממאירה (NMS). סימנים ותסמינים של תסמונת זו עשויים לכלול שילוב של חום גבוה, קצב לב מהיר, הזעה, נוקשות שרירים חמורה, בלבול, עלייה באנזימי השריר (נקבעת בבדיקת דם).  
סימנים של זיהום כגון חום גבוה, צמרמורת, רעד, כאבי ראש, הזעה ותסמינים דמויי שפעת. אלה עלולים לנבוע מהפרעה במערכת הדם, המובילה לסיכון מוגבר לזיהומים.  
פריחה חמורה שעלולה לגרום לשלפוחיות חמורות וקילוף של העור.  
כאבי שרירים בלתי מוסברים רגישות או חולשה. אלו עלולים להיות סימנים של תמס שרירים (רבדומיליזיס)

תופעות לוואי ששכיחותן אינה ידועה (תופעות ששכיחותן טרם נקבעה):

- מחשבות אובדניות והתנהגות אובדנית (דווחו בזמן הטיפול ובצמוד להפסקת הטיפול בוונלה, ראה סעיף 2 " אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה")
- סימנים ותסמינים של מצב המכונה "תסמונת הלב השבור (stress cardiomyopathy או takotsubo cardiomyopathy) אשר עשויים לכלול כאב חזה, קוצר נשימה, סחרחורת, התעלפות, קצב לב לא נורמלי.

תופעות לוואי אחרות שעליך לספר לרופא שלך עליהן כוללות (שכיחותן של תופעות לוואי אלה מופיעה למטה תחת "תופעות לוואי נוספות שעלולות לקרות"):

- שיעול, צפצופים, קוצר נשימה העלולים להיות מלווים בחום גבוה.
- צואה שחורה או דם בצואה
- גרד, עור צהוב או עיניים צהובות או שתן כהה, אשר עלולים להיות תסמינים של דלקת בכבד (הפטיטיס)
- בעיות בלב כגון קצב לב מהיר או בלתי סדיר, לחץ דם גבוה
- בעיות בעיניים כגון טשטוש ראייה, אישונים מורחבים
- בעיות עצביות כגון סחרחורת, נימול קושי בתנועה, פרכוסים או עוויתות.
- בעיות פסיכיאטריות כגון היפראקטיביות ותחושת אפוריה (תחושה יוצאת דופן של התרגשות יתר).
- תופעות גמילה (ראה סעיף 3 "כיצד תשתמש בתרופה?" בתת סעיף "אם אתה מפסיק את נטילת התרופה").
- דימום ממושך – הדימום עלול להימשך זמן ארוך יותר מהרגיל אם נפצעת או נחתכת.

תופעות לוואי נוספות שעלולות לקרות

תופעות לוואי שכיחות מאוד (תופעות שמופיעות ביותר ממשתמש 1 מתוך 10):

- סחרחורת, כאבי ראש, נמנום.
- נדודי שינה
- בחילה, יובש בפה, עצירות.
- הזעה (כולל הזעת לילה).

תופעות לוואי שכיחות (תופעות שמופיעות ב 10-1 משתמשים מתוך 100):

- ירידה בתיאבון.
- בלבול, הרגשה של ניתוק מעצמך, העדר סיפוק מיני, ירידה בחשק המיני, אי שקט, עצבנות, חלומות חריגים.
- רעד, תחושת אי שקט או חוסר יכולת לשבת או לעמוד ללא תזוזה, הרגשת נימול, שינויים בחוש הטעם, עלייה במתח השריר.
- הפרעות ראייה כולל טשטוש ראייה, אישונים מורחבים, חוסר יכולת של העין להעביר מיקוד באופן אוטומטי מעצמים רחוקים לעצמים קרובים.
- צלצולים באוזניים (טנטון).
- קצב לב מהיר, הרגשה של דפיקות לב.
- עלייה בלחץ דם, הסמקה.
- קוצר נשימה, פיהוק.
- הקאה, שלשול.
- פריחה קלה, גרד
- עלייה בתדירות מתן שתן, חוסר יכולת להטיל שתן, וקושי במתן שתן.

- וסת לא סדירה כגון דימום מוגבר או עלייה בדימום לא סדיר:
- בעיה בשפיכה/ הגעה לסיפוק מיני (בגברים), הפרעות בזקפה (אין אונות).
- חולשה (אסתניה), עייפות, צמרמורות.
- עליה במשקל, ירידה במשקל
- עלייה ברמות הכולסטרול.

#### תופעות לוואי לא שכיחות (תופעות שמופיעות ב-10-1 משתמשים מתוך 1,000)

- פעילות יתר, מחשבות מתרוצצות וירידה בצורך לישון (מאניה)
- הזיות, הרגשה של ניתוק מהמציאות, בעיות בהגעה לסיפוק מיני, חוסר בתחושה או רגש, הרגשת ריגוש יתר, חריקת שיניים.
- תנועות שרירים לא רצוניות, עילפון, הפרעות בקואורדינציה ובשיווי המשקל
- הקאה דמית או צואה שחורה או דמית (עלול להיות סימן לדימום פנימי).
- רגישות בחשיפה לשמש, חבורות, נשירת שיער חריגה
- חוסר שליטה במתן שתן
- נוקשות, התכווצויות ותנועות שרירים לא רצוניות
- שינויים קלים ברמת אנזימי כבד בדם

#### תופעות לוואי נדירות (תופעות שמופיעות ב-10-1 משתמשים מתוך 10,000):

- עוויתות או פרכוסים
- שיעול, צפצופים וקוצר נשימה אשר עלולים להיות מלווים בחום גבוה
- חוסר התמצאות ובלבול שלעיתים מלווים בהזיות (דליריום)
- צריכת מים מוגברת (המכונה גם תסמונת הפרשה לא תואמת של הורמון נוגד השתנה - SIADH)
- ירידה ברמות נתרן בדם כאב חמור בעיניים וירידה או טשטוש בראייה
- קצב לב חריג, מהיר או בלתי סדיר, אשר עלול להוביל להתעלפות
- כאב בטן חמור או כאב גב חמור ( עלולים להעיד על בעיה חמורה במעי, בכבד או בלב) (הפטיטיס)
- גרד עור צהוב או עיניים צהובות, שתן כהה או תסמינים דמויי שפעת- תסמינים של דלקת כבד (הפטיטיס)

#### תופעות לוואי נדירות מאוד (תופעות שמופיעות בפחות ממשמש 1 מתוך 10,000):

- דימום מתמשך – יכול להוות סימן לירידה במספר טסיות הדם – עלול להוביל לעלייה בסיכון לחבורות או דימומים
- ייצור יוצא דופן של חלב אם
- דימום בלתי צפוי למשל דימום בחניכיים, דם בשתן או בקיא, או הפעה לא צפויה של חבורות או פגיעה בכלי דם (ורידים שבורים)
- תופעות לוואי ששכיחותן אינה ידועה (תופעות ששכיחותן טרם נקבעה)
  - תוקפנות
  - תחושת סחרור (ורטיגו)

אם הופיעה תופעת לוואי, אם אחת מתופעות הלוואי מחמירה, או כאשר אתה סובל מתופעת לוואי שלא הזכרה בעלון, עליך להתייעץ עם הרופא. ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "[דיווח על תופעות לוואי עקב טיפול תרופתי](http://www.health.gov.il)" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות ([www.health.gov.il](http://www.health.gov.il)) המפנה לטופס המקוון לדיווח על תופעות לוואי. בנוסף, ניתן לדווח לחברת "[אוניפארם בע"מ](http://www.aoniparm.com)".

#### 5. איך לאחסן את התרופה?

- מנע הרעלה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעלה. אל תגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא.
- אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (exp. date) המופיע על גבי האריזה. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו חודש.
- יש לאחסן את התרופה בטמפרטורה מתחת ל- 25°C ובמקום מוגן מאור.

## 6. מידע נוסף

נוסף על החומר הפעיל התרופה מכילה גם:

Microcrystalline cellulose, lactose anhydrous, sodium starch glycolate, colloidal silicon dioxide, magnesium stearate, iron oxide red.

כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה:

**וונלה** ארוזה בתוך מגשיות (בליסטר) אשר מוכנסות לתוך אריזת קרטון. בכל אריזה של **וונלה** יש 28 טבליות.

**וונלה** הינן טבליות מצופות, עגולות, קמורות משני צידיהן, בצבע ורוד, בעלות קו חציה מצידן האחד.

שם בעל הרישום: אוניפארם בע"מ, ת.ד. 21429 ת"א, 6121301.  
שם היצרן וכתובתו: אוניפארם בע"מ, פארק תעשייה "מבוא כרמל".

מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות:

**וונלה 37.5**: 129 98 30902 01

**וונלה 75**: 129 99 30901 01

לשם הפשטות ולהקלת הקריאה, עלון זה נוסח בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.  
נערך בספטמבר 2020

העלון לצרכן מפורסם במאגר התרופות שבאתר האינטרנט של משרד הבריאות

וניתן לקבלו מודפס ע"י פניה לבעל הרישום. <http://www.health.gov.il>

**נבקש כי תידע את המטופלים והלקוחות שלך אשר נוטלים את התרופה בשינויים שנעשו בעלון**