

في حالات نادرة جداً حدثت ردود فعل تحسسية مفرطة (وفي حالات خطيرة جداً حدثت ردود فعل تحسسية من نوع صدمة استهداافية [Anaphylactic Shock]) وذلك بعد استعمال موضعى الأدوى تنتهي على ليدوكائين [Lidocaine]. يجب التوقف عن استعمال الدواء والتوجه حالاً إلى الطبيب.

أعراض جانبية موضعية في منطقة التطبيق (فتحة الشرج/المستقيم): المتشوّر بحرقة، حكة، تراكم كيميات كبيرة من الدم في منطقة العلاج (Hyperemia) ونزف موضعي. تقل هذه الاعراض عند التوقف عن العلاج بالدواء.

إذا ظهر عرض جانبى، إذا تفاقمت إحدى الاعراض الجانبية أو عندما تعانى من عرض جانبى لم يذكر في هذه التشرفة، عليك استشارة الطبيب.

بالإضافة إلى ذلك فإن المكابن التي تبلغ عن أعراض جانبية لوزارة الصحة بواسطة الضغط على الرابط «تبلغ عن أعراض جانبية عقب علاج دوائي» الموجود على الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة (www.health.gov.sa) الذي يوجه إلى التموجن المباشر للتبلغ عن أعراض جانبية، أو عن طريق تصفّح الرابط:

<https://sideeffects.health.gov/>

5 (كيفية تخزين الدواء؟)

تجنب التسمم: يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء آخر في مكان مغلق بعيداً عن متناول أيدي ومحاجل رؤية الأطفال، وأو الرضيع، وذلك لتقدير اصواتهم بالتسنم. لا تسبّب الكيميات بدون تعليمات طبية صريحة من الطبيب.

لا يجوز استعمال الدواء بعد انتهاء تاريخ الصلاحية (Exp. Date) الذي يظهر على ظهر العلبة/الأنبوبة/القنينة/الكتون/الملاصقة. يشير تاريخ الصلاحية إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.

شروط التخزين: حفظ الأنبوبيات مغلقة بإحكام داخل العلبة، بدرجة حرارة دون 25 درجة مئوية.

بعد انتهاء الأنبوبية لأول مرة: بالإمكان استعمال الدواء لمدة 30 يوماً (شهر واحد).

6 (معلومات إضافية):

يحتوى الدواء بالإضافة لل المادة /المواد الفعالة أىضاً:

White Vaseline (= Paraffin, White Soft), Propylene Glycol, Semi-Synthetic Liquid Glycerides (= Triglycerides, Medium-Chain = MCT), Polyethylene Glycol Stearate (= Macrogol Stearate = PEG Stearate), Cetostearyl Alcohol, Glycerol Monostearate, Sodium Methyl Parahydroxybenzoate (= Sodium Methylparaben), Propyl Parahydroxybenzoate (= Propylparaben), Purified Water.

كيف يبدو الدواء وما هو محتوى الخلية: يبدو الدواء على شكل كريم بلون أصفر، ذو قوام متجمّس ذو رائحة مميزة.

ال الكريم معيناً ضمن أنبوبيات معدنية مغلقة بواسطة غطاء بلاستيكى قابل للولادة.

كل أنبوبيات معيناً مصنوعة من كرتون، مرفقة أيضاً بمفصل (أنبوب بلاستيكى صغير) مع ختم، الذي يمكن ولايته بدلاً من الغطاء.

حجم العلبة: أنبوبيات تحتوي على 30 غرام كريم.

صاحب الامتياز: سوبر - فارم (إسرائى). م.ض.. شركة خاصة 5107535515، شارع أربى شينكار 16، مرسيليا 4672516.

الم المنتج: تو فاد للصناعات الصيدلانية والكيماويات م.ض.. جايجيليانو إن كامابانيا، إيطاليا.

رقم سجل الدواء في سجل الأدوية الحكومي في وزارة الصحة: 160.31.34663.00

من أجل سهولة وتهور القراءة، تمت صياغة هذه التشرفة بصيغة المذكرة. على الرغم من ذلك، فإن الدواء مخصوص لكلا الجنسين.

تم إعدادها في: 09/2020

٤ (الحمل والإرضاع):

لم تثبت نجاعة وسلامة استعمال كلتا المادتين الفعاليتين التي يحتويهما الدواء خلال فترة الحمل والرضاعة، لكن من غير المتوقع أن تسبب الضرر. إذا كنت في فترة الحمل (خاصة في الثلث الأول)، تخططين للحمل أو مرحلة فيجب استشارة الطبيب.

٥ (معلومات هامة عن بعض مركيبات الدواء):

• يحتوى الدواء على المواد الحافظة صوديوم ميتيل باراهيدروكسى بنزوات (Sodium Methyl Parahydroxybenzoate) وبروبيل باراهيدروكسى بنزوات (Propyl Parahydroxybenzoate) حيث قد تظهر بعد فترة ما من استعمال الدواء.

• يحتوى الدواء على المواد غير الفعالة بروپيلین چیکول (Propylene Glycol) (Cetostearyl Alcohol)، اللتان قد تؤديان إلى تهيج موضعى في الجلد (Contact Dermatitis).).

٦ (كيفية استخدام الدواء؟)

يجب الاستعمال دائمًا بحسب تعليمات الطبيب. عليك الإستيقاظ من الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكن واثقاً.

المقدار الدوائية وطريقة العلاج يحددان من قبل الطبيب فقط. المقدار الدوائي الإعتدائي هو عادةً: الدهن مرتين في اليوم.

لا يجوز تجاوز المقدار الدوائي الموصى به. طريقة التناول: لا يجوز البالغ الدواء مخصص للإستعمال الخارجي فقط في فتحة الشرج (rectum) (وهي المستقيم) (rectum). لمن مخصص الدواء: الدواء مخصص للأفراد الذين تجاوزوا عمر 18 سنة.

٧ (تعليمات الاستعمال):

• نظف وجفف جيداً منطقة فتحة الشرج/المستقيم.

• استوّل في مكان مريح وقم بمالحة جسمك إلى الجانب الأيسر.

• ازبغ الطعام عن الأنبوبيات، وفي مكان الطعام لوabil الموصل (أنبوب بلاستيكى صغير) مع الختم.

• أخذ كمية كافية تليّنة من الكريم لتشحيم الجزء الخارجي من الموصل.

• ادخل طرف الموصل داخل المستقيم واضغط بلطف على الأنبوبيات لإدخال الكريم إلى الداخل. يجب إخراج كمية قدرها تقريباً 1 سم من الكريم (هذه الكمية تعامل تقريباً 2.5 غرام حتى 3 غرام كريم).

• ازبغ الموصل عن الأنبوبيات وأغلق الأنبوبيات بواسطة الطعام.

• اغسل يديك بعد استعمال الدواء.

إذا استعملت بالخطأ مقداراً أو أثنياً أكبر أو أداً بطيء طفل بالخطأ من الدواء، توجه حالاً إلى الطبيب أو لغرفة الطوارئ في المستشفى وأحضر معك علبة الدواء.

إذا سبّت استعمال هذا الدواء في وقت المخصص، فلا يجوز استعمال دوائي ضار آخر.

استعمل المقدار الدوائي التالي في الوقت الإعتدائي واستشر الطبيب.

يجب الموافقة على العلاج حسب توصية الطبيب.

لا يجوز التوقف عن العلاج بالدواء بدون استعمال الطبيب، حتى ولو طرأ تحسن على حالتك الصحية. من الجائز أن الم寧ة لم تشفى بعد بشكل تام حتى ولو لم تشعر بذلك وهذا يجب الحصول على اتم العلاج حسب تعليمات الطبيب.

لا يجوز استعمال أدوية في العادة، يجب تشخيص طابع الدواء والتأكد من المقدار الدوائي فهي كل مرة تستعمل فيها دواء، ضع النظارات الطبية إذا لزم الأمر ذلك.

إذا تورّط لديك أستهلاك إضافي حول استعمال هذا الدواء، استشر الطبيب أو الصيدلي.

٨ (الاعراض الجانبية):

كما بكل دواء، إن استعمال هذا الدواء قد يسبب أعراض جانبية عند بعض المستعملين. لا تذهب من قائمة الاعراض الجانبية، من الجائز إلا تعانى منها.

٩ (نشرة للمستهلك بموجب أنظمة الصيدلة مستحضرات - 1986):

يسوق الدواء بموجب وصفة طبيب فقط

انظر ولين

كريم للاستعمال في فتحة الشرج

١) إسم الدواء، شكله والعلاء:

اسم الدواء: انظر ولين.

شكله: كريم للاستعمال في فتحة الشرج.

تركيب المواد الفعالة وتركيزها بوحدة مقدار دوائي:

نيفيديبين 0.3% 0.3% (Nifedipine 0.3%). - ليدوكائين هيدروكلوريد 1.5% (Lidocaine Hydrochloride 1.5%).

للقائمة المواد غير الفعالة ومولادات الحساسية في الدواء . انظر الفقرة 6.

اقر النشرة بتقعن حتى نهايتها قبل استعمال الدواء. تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء. إذا تورّط لديك أستهلاك إضافي، راجع الطبيب أو الصيدلي.

وُصف هذا الدواء لعلاج مرضك. لا تعطيه لآخرين. فهو قد يضرهم حتى ولو بدا لك أن مالاهم الطيبة مشاهدة لحالتك.

لأى غرض مخصوص الدواء؟ الدواء مخصوص لعلاج الشق في فتحة الشرج (في المستقيم) والأعراض في فتحة الشرج الناجمة عن الإنقباض المفطر لصرحة فتحة الشرج.

الفصيلة العلاجية والتاثيرات الطبية:

نيفيديبين: مرخي للعضلات الملساء (حاجب لقنوات الكالسيوم).
ليدوکائين: مدر موسيقي (من فصيلة الـ "كاينين").

٢) قبل استعمال الدواء:

١) لا يجوز استعمال الدواء إذا:

• كنت حساساً (الergic) للمواد الفعالة، للمخرّرات الموضعيّة الأخرى ذات تركيب مشابه أو لكل واحد من المركبات الإضافية التي يحتويها الدواء الماء الغالل تظهر في الفقرة ١ والمركبات غير الفعالة مفصّلة في الفقرة ٦.

• كنت تعاني من ضغط م منخفض أو من قصور في القلب.

تحذيرات خاصة تتعلق باستعمال الدواء:

٢) قبل العلاج بالدواء، اخذ للطبيب إذا:

• كنت تعاني من انتفاخ، اصابة أو جرح في منطقة فتحة الشرج أو في المستقيم.
إذا سبّت استعمال الدواء في هذه الحالات قد يؤدي إلى امتصاص زائد للمواد الغالل إلى الجسم.

• كنت تعاني من خلل في الأداء الوظيفي للقلب.

• كنت تعاني من خلل في الأداء الوظيفي الكلوبي.
من الجائز أن يحتاج الأمر متابعة ومراقبة ضغط الدم (خاصة ضغط الدم الشريانى) قبل وحال استعمال الدواء.

لا يجوز دهنك على العينين ويجب جنب تمسك الكريم مع العينين.
في حالة التماض مع العينين يجب الشطف جيداً بماء جار وإذا دعت الحاجة يجب التوجه للنقى علاج طبي.

٣) إذا كنت تستعمل مؤخراً، أدوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبية وأدوية أخرى، اخذ الطبيب أو الصيدلي عن ذلك، بالأخض

إذا كنت تستعمل: أدوية من فصيلة حاجيات المستقبلن من نوع بيتا-Blockers (Propranolol)، أدوية لخفض ضغط الدم، بروتاكولول (Digoxin)، سيميتدين (Cimetidine).