

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ В СООТВЕТСТВИИ С
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИМИ СТАНДАРТАМИ (ПРЕПАРАТЫ) - 1986**

Препарат отпускается только по рецепту врача

АНТРОЛИН

Крем для ректального применения

1) НАЗВАНИЕ ПРЕПАРАТА, ЕГО ЛЕКАРСТВЕННАЯ ФОРМА И АКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА:

Название препарата: Антролин

Лекарственная форма: крем для ректального применения

Состав активных веществ и их концентрация на единицу дозировки:
Нифедипин 0.3% (Nifedipine 0.3%) и Лидокайн гидрохлорид 1.5% (Lidocaine Hydrochloride 1.5%)

Список неактивных ингредиентов препарата и аллергенов: см. в разделе 6.

Внимательно и полностью прочитайте данную инструкцию перед применением препарата. Данная инструкция содержит основные сведения о препарате. Если у Вас имеются дополнительные вопросы, обратитесь к врачу или к фармацевту.

Данный препарат выписан для лечения Вашего заболевания. Не передавайте его другим. Он может причинить им вред, даже если Вам кажется, что их заболевание похоже.

Для чего предназначен препарат? Препарат предназначен для лечения анальных (ректальных) трещин и проктологических симптомов, возникших вследствие гипертонуса анального сфинктера.

Фармакологическая группа и терапевтическое действие:
Нифедипин: расслабляет гладкую мускулатуру (блокирует кальциевые каналы).
Лидокайн: местный анестетик (из группы "каинов").

2) ПЕРЕД НАЧАЛОМ ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА:

☒ Не применяйте препарат, если:

- У Вас повышенная чувствительность (аллергия) к активным веществам, другим местным анестетикам аналогичной структуры или к любому другому дополнительному ингредиенту, содержащемуся в препарате. Активные вещества указаны в разделе 1, а неактивные ингредиенты перечислены в разделе 6.
- Вы страдаете пониженным артериальным давлением крови или сердечной недостаточностью.

Особые предостережения относительно применения препарата
☒ Перед началом лечения препаратом сообщите врачу, если:

- Вы страдаете от воспаления, повреждения или травмы анальной или ректальной области. Применение препарата в этих случаях может вызвать избыточное поглощение Вашим телом активных веществ.
- Вы страдаете диабетом.
- У Вас нарушены функции печени.
- У Вас нарушены функции почек.
- Возможно, возникнет необходимость контролировать давление крови (особенно артериальное давление) перед началом и в период применения препарата.

Не смазывайте препаратом глаза и избегайте контакта крема с глазами. В случае контакта с глазами тщательно промойте их проточной водой и при необходимости, обратитесь за медицинской помощью.

☒ Если Вы принимаете или недавно принимали другие лекарственные препараты, включая препараты, отпускаемые без рецепта врача, и пищевые добавки, сообщите об этом врачу или фармацевту. Особенно, если Вы принимаете: препараты семейства бета-блокаторов (Beta-Blockers), препараты, понижающие артериальное давление, пропранолол (Propranolol), циметидин (Cimetidine), дигоксин (Digoxin).

☒ Беременность и кормление грудью:

Эффективность и безопасность использования двух активных ингредиентов препарата во время беременности и кормления грудью не доказаны. Вместе с тем, не ожидается вредное воздействие. Если Вы беременны (особенно в первом триместре), планируете забеременеть или кормите грудью, то Вам следует посоветоваться с врачом.

☒ Важная информация о некоторых ингредиентах препарата:

- Препарат содержит консерванты натрия метилпарагидроксибензоат (Sodium Methyl Parahydroxybenzoate) и пропилпарагидроксибензоат (Propyl Parahydroxybenzoate), способные вызвать гиперчувствительность или аллергическую реакцию, которые могут возникнуть спустя некоторое время после приема препарата.
- Препарат содержит неактивные ингредиенты пропиленгликоль (Propylene Glycol) и цетостеaryl алкоголь (Cetostearyl Alcohol), способные вызывать местное раздражение кожи (Contact Dermatitis).

3) КАК СЛЕДУЕТ ПРИМЕНЯТЬ ПРЕПАРАТ?

Всегда применяйте данный препарат точно в соответствии с указаниями врача. Если Вы в чем-то не уверены, уточните у врача или фармацевта.

Дозировка и режим лечения будут установлены только врачом.
Принятая дозировка обычно: смазывать два раза в день.

Не превышайте рекомендуемую дозу.

Способ применения: не глотать. Препарат предназначен только для наружного применения в анальной и ректальной области.

Для кого предназначен препарат: препарат предназначен для взрослых старше 18 лет.

Указания по применению:

- Тщательно вымойте и высушите анальную/ректальную область.
- Лягте удобно и повернитесь на левый бок.
- Снимите колпачок с тюбика и вместо него присоедините аппликатор (пластмассовая трубка) с крышкой.
- Выдавите небольшое количество крема для смазывания наружной части аппликатора.
- Введите кончик аппликатора в задний проход и мягко нажмите на тюбик, чтобы выдавать крем внутрь. Выдавите приблизительно 1 см крема (это количество соответствует примерно 2,5-3 граммам крема).
- Отсоедините аппликатор от тюбика и промойте его горячей водой с мылом.
- По окончании использования закройте тюбик колпачком.
- Вымойте руки после применения препарата.

Если Вы по ошибке превысили дозу, или если ребенок случайно проглотил препарат, немедленно обратитесь к врачу или в приемное отделение больницы и возьмите с собой упаковку препарата.

Если Вы забыли применить препарат в положенное время, не применяйте двойную дозу. Возьмите следующую дозу в положенное время и посоветуйтесь с врачом.

Придерживайтесь режима лечения, рекомендованного врачом. Даже если состояние Вашего здоровья улучшилось, не прекращайте применение препарата, не посоветовавшись с врачом. Возможно, что поврежденный участок не полностью вылечен, даже если Вы это и не ощущаете, поэтому важно довести лечение до конца, в соответствии с врачебными рекомендациями.

Не применяйте препарат в темноте! Каждый раз при применении препарата проверяйте этикетку и дозировку. При необходимости, пользуйтесь очками.

Если у Вас имеются дополнительные вопросы относительно применения данного препарата, посоветуйтесь с врачом или фармацевтом.

4. ПОБОЧНЫЕ ЯВЛЕНИЯ:

Как и при лечении любым препаратом, применение данного препарата может вызывать побочные явления у части пациентов. Не тревожьтесь при чтении списка побочных явлений. Возможно, Вы не будете страдать ни одним из них.

В очень редких случаях после местного применения препарата, содержащих лидокайн (Lidocaine), возникали реакции гиперчувствительности (в очень тяжелых случаях возникали аллергические реакции типа анафилактического шока [Anaphylactic Shock]). Следует прекратить применение препарата и немедленно обратиться к врачу!

Местные побочные явления, возникающие в участке применения (анальной/ ректальной области): боль, ощущение жжения, суд, приток большого количества крови в область наложения препарата (Нуретема) и локализованное кровотечение. Эти явления уменьшаются после прекращения лечения препаратом.

Если возникает побочное явление, если одно из побочных явлений становится более выраженным, или Вы страдаете от побочных явлений, не упомянутых в данной инструкции, посоветуйтесь с врачом.

О побочных явлениях можно сообщить в Министерство Здравоохранения, нажав на ссылку "Отчет о побочных явлениях вследствие медикаментозного лечения", находящуюся на домашней странице сайта Министерства здравоохранения (www.health.gov.il), и направляющую на форму онлайн, предназначенную для отчета о побочных явлениях, или перейдя по ссылке: <https://sideeffects.health.gov.il/>

5) КАК СЛЕДУЕТ ХРАНИТЬ ПРЕПАРАТ?

Избегайте отравления! Этот препарат, как и любой другой, надлежит хранить в закрытом, недоступном для детей или младенцев месте, и вне зоны их зрения, во избежание отравления. Не высыпайте ровно без получения точных указаний врача.

Не применяйте препарат после истечения срока его годности (Exp. Date), указанного на упаковке/тубике/флаконе/картоне/этикетке. Датой истечения срока годности является последний день указанного месяца.

Условия хранения: храните в тщательно закрытой упаковке, при температуре ниже +25°C.

После первого открывания тюбика: препарат можно применять в течение 30 дней (один месяц).

6) ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

В дополнение к активному(ым) веществу(ам) препарат также содержит:

White Vaseline (= Paraffin, White Soft), Propylene Glycol, Semi-Synthetic Liquid Glycerides (= Triglycerides, Medium-Chain = MCT), Polyethylene Glycol Stearate (= Macrogol Stearate = PEG Stearate), Cetostearyl Alcohol, Glycerol Monostearate, Sodium Methyl Parahydroxybenzoate (= Sodium Methylparaben), Propyl Parahydroxybenzoate (= Propylparaben), Purified Water.

Как выглядят препарат и каково содержимое упаковки: Препарат выглядит как однородный крем желтого цвета, с характерным запахом.

Крем заключен в металлический тюбик с навинчивающимся пластмассовым колпачком.

Каждый тюбик упакован в картонную коробку, к коробке также прилагается аппликатор (пластмассовая трубка) с крышкой, который можно навинтить вместо колпачка.

Размер упаковки: тюбик содержит 30 граммов крема.

Владелец лицензии: Супер-Фарм (Израиль) Ltd. п/я 510753551, ул. Арье Шенкар 16, Герцлия 4672516

Производитель: Нью Фа Дем Фармасьютикал энд Кемистри Ltd., , Джулдано ин Кампания (Италия).

Регистрационный номер препарата в Государственном Реестре Лекарственных Средств Министерства Здравоохранения: 160.31.34663.00

Откорректировано в: 09/2020