

התרופה משווקת על פי מרשם רופא בלבד

קסיגדו™ 5 XR מ"ג/ג 500

טבליות בשחרור מושהה

הרכב:

כל טבליה מכילה:

5 mg dapagliflozin דפהגליפלזין

500 mg metformin hydrochloride מטפורמין הידרוכלוריד

קסיגדו™ 5 XR מ"ג/ג 1000

טבליות בשחרור מושהה

הרכב:

כל טבליה מכילה:

5 mg dapagliflozin דפהגליפלזין

1000 mg metformin hydrochloride מטפורמין הידרוכלוריד

קסיגדו™ 10 XR מ"ג/ג 500

טבליות בשחרור מושהה

הרכב:

כל טבליה מכילה:

10 mg dapagliflozin דפהגליפלזין

500 mg metformin hydrochloride מטפורמין הידרוכלוריד

קסיגדו™ 10 XR מ"ג/ג 1000

טבליות בשחרור מושהה

הרכב:

כל טבליה מכילה:

10 mg dapagliflozin דפהגליפלזין

1000 mg metformin hydrochloride מטפורמין הידרוכלוריד

למרכיבים בלתי פעילים אנא ראה סעיף 6 – "מידע נוסף".

קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש בתרופה.

שמור את העלון שכן ייתכן ותצטרך לעיין בו בהמשך.

עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח.

תרופה זו נרשמה לטיפול במחלתך. אל תעביר אותה לאחרים. היא עלולה להזיק להם אפילו אם נראה לך כי מחלתם דומה.

- קסיגדו XR עלולה לגרום לתופעות לוואי חמורות כולל חמצת לקטית - אנא ראה סעיף 2 "אזהרות מיוחדות הנוגעות בשימוש בקסיגדו XR".
- קסיגדו XR אינה מיועדת לחולי סכרת מסוג 1.
- קסיגדו XR אינה מיועדת למטופלים עם קטואצידוזיס סכרתית (עליה בקטונים בדם או בשתן).
- קסיגדו XR אינה מיועדת לילדים ולמתבגרים מתחת לגיל 18 שנים.

1. למה מיועדת התרופה?

קסיגדו XR ניתנת לטיפול בסוכרת מסוג 2 במבוגרים (גיל 18 ומעלה), בשילוב עם דיאטה ופעילות גופנית. קסיגדו XR מיועדת לשיפור איזון רמות הסוכר בדם, כאשר טיפול בדפאגליפלזין או במטפורמין בנפרד לא הביאו לאיזון רמות הסוכר בדם.

קבוצה תרפויטית:

דפאגליפלזין- מעכב של נשא הסוכר SGLT2 בכליה, המעכב ספיגה מחדש של גלוקוז וגורם להגברת הפרשת גלוקוז בשתן.

מטפורמין הידרוכלוריד - מקבוצת הביגואנידים.

2. לפני שימוש בתרופה

☒ אין להשתמש בקסיגדו XR אם:

- יש לך רגישות למרכיבים הפעילים דפאגליפלזין, מטפורמין או לאחד ממרכיבי התרופה (ראה סעיף 6 "מידע נוסף" מטה). סימנים של תגובה אלרגית חמורה לקסיגדו XR יכולים לכלול:

- פריחה בעור,
- כתמים אדומים מורמים על גבי העור (סרפדת),
- נפיחות של הפנים, השפתיים, הלשון והגרון אשר יכולים לגרום לקשיי נשימה או לקשיים בבליעה.

אם הנך מבחין באחד מסימנים אלו, יש להפסיק לקחת מיידית קסיגדו XR ולפנות לרופא או לחדר מיון של בית חולים הקרוב ביותר.

- יש לך בעיות כליות בינוניות עד חמורות או הינך מטופל בדיאליזה
- יש לך חמצת מטבולית או קטואצידוזיס סוכרתי (רמות גבוהות של קטונים בשתן או בדם).

- מחלת הסוכרת שלך אינה בשליטה עם, למשל, היפרגליקמיה חמורה (רמות גבוהות של גלוקוז בדם), בחילות, הקאות, שלשול, ירידה מהירה במשקל, חמצת לקטית או קטואצידוזיס. קטואצידוזיס הינו מצב קטונים מצטברים בדם מה שעלול להוביל לסכרת לפני תרדמת. הסימפטומים כוללים- כאבי בטן, נשימות מהירות ועמוקות, ישנוניות או הנשימה מתחילה לקבל ריח "פרותי" חריג.

⚠️ אזהרות מיוחדות הנוגעות בשימוש בקסיגדו XR

חמצת לקטית (lactic acidosis): המרכיב הפעיל מטפורמין בקסיגדו XR עלול לגרום לתופעת לוואי נדירה אך חמורה הנקראת חמצת לקטית. חמצת לקטית מאופיינת ברמות גבוהות של חומצה לקטית בדם, העלולה לגרום למוות. חמצת לקטית דורשת טיפול רפואי דחוף בבית חולים. **הפסק נטילת קסיגדו XR ופנה לרופא באופן מיידי אם יש לך אחד מהסימנים הבאים, שיכול להיות סימן לחמצת לקטית:**

- תחושת קור בכפות ידיים ורגליים
- סחרחורת או תחושה שהנך מסוחרר
- דופק איטי או לא רגיל
- תחושת חולשה ועייפות רבה
- כאבי שרירים לא רגילים
- קשיי נשימה
- ישנוניות לא רגילה או שינה ארוכה מהרגיל
- כאב בטן, בחילה או הקאה

מרבית האנשים שסבלו מחמצת לקטית כתוצאה מנטילת מטפורמין (מרכיב פעיל בקסיגדו XR, סבלו מבעיות נוספות, שבשילוב עם נטילת המטפורמין, גרמו לחמצת הלקטית. פנה לרופא במידה ואתה סובל מאחד מהמצבים הבאים מאחר ויש לך סיכוי גבוה יותר לפתח חמצת לקטית עם קסיגדו XR:

- סובל מבעיות כליה חמורות, או הכליות מושפעות מחומר ניגוד שהוזרק לך לצורך בדיקת רנטגן.
- סובל מבעיות בכבד.
- הנך שותה אלכוהול לעיתים קרובות מאד או שותה אלכוהול בכמות גדולה בזמן קצר.
- במצב של התייבשות (מאבד כמות גדולה של נוזלים). מצב זה יכול לקרות אם הנך חולה עם חום, עם הקאות או עם שלשול. התייבשות יכולה להגרם גם אם אתה מרבה להזיע בעת פעילות גופנית ואינך שותה מספיק נוזלים.
- עובר ניתוח.
- עובר התקף לב, זיהום חמור או שבץ.

הדרך הטובה ביותר להמנע מחמצת לקטית כתוצאה משימוש במטפורמין היא לספר לרופא אם הינך סובל מאחד המצבים המצויינים מעלה. יתכן והרופא יחליט על הפסקת הטיפול לזמן מסוים

• לפני או במהלך הטיפול בקסיגדו XR ספר לרופא, לרוקח או לאחות אם:

- הינך סובל מסוכרת מסוג 1 או שיש או היה לך קטואצידוסיס סכרתי.
- הנך מטופל במקביל באינסולין וחלה הפחתה חדה במינון האינסולין אותו הנך נוטל.
- יש לך בעיות בכליות, הרופא יבדוק את תפקודי הכליות שלך.
- יש לך בעיות בכבד.
- יש לך היסטוריה של דלקות בדרכי השתן או בעיות במתן שתן.
- הנך סובל מבעיות בלב, כולל אי ספיקת לב.
- הנך אוכל פחות או שיש שינוי בתזונה שלך.
- יש לך או היו לך בעיות בלב, כולל דלקת בלב או ניתוח בלב.
- שותה אלכוהול לעיתים קרובות מאוד, או שותה אלכוהול בכמות רבה בפרק זמן קצר.
- הנך עומד לקבל זריקת צבע או חומר ניגודי לבדיקת רנטגן. במקרה זה יתכן ויהיה עליך להפסיק את השימוש בקסיגדו XR לזמן קצר. פנה אל הרופא לקבלת הנחיותיו

מתי להפסיק נטילת קסיגדו XR ומתי עליך לחזור לקבלת הטיפול ולהמשיך הטיפול בקסיגדו XR.

- אתה עומד לעבור ניתוח ולא תוכל לאכול או לשתות הרבה. עליך להפסיק לקחת קסיגדו XR לזמן קצר. פנה אל הרופא לקבלת הנחיותיו מתי להפסיק נטילת קסיגדו XR ומתי עליך לחזור לקבלת הטיפול ולהמשיך הטיפול בקסיגדו XR.

הינך סובל מזיהומים בדרכי השתן לעיתים קרובות. בעת השימוש בתרופה קיים סיכון מוגבר לזיהום בדרכי השתן (יתכן והרופא יפסיק זמנית את הטיפול בתרופה עם הופעת זיהום חריף בדרכי השתן).

בדיקות ומעקב

תפקוד כליות

יש לבצע בדיקות תפקודי כליה לפני תחילת טיפול בקסיגדו XR ו בזמן הטיפול

ייתכן והרופא יבקש ממך לבצע מספר בדיקות דם לפני תחילת הטיפול בקסיגדו XR ובמהלכו. הרופא יבדוק את מצב הסוכרת שלך על ידי בדיקות דם שגרתיות הכוללות רמות סוכר בדם והמגלובין A1C.

סוכר (גלוקוז) בשתן

כתוצאה ממנגנון הפעולה של דפהגליפלזין בדיקת שתן לנוכחות גלוקוז תצא חיובית לגלוקוז.

אינטראקציות/תגובות בין תרופתיות

⚠ אם אתה לוקח, או אם לקחת לאחרונה, תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי

תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח. במיוחד יש ליידע אם אתה לוקח תרופות:

- משתנות (דוורטיות),
- לטיפול בשחפת או במניעתה (כגון ריפמפין)
- לטיפול בפירכוסים (כגון פניטואין)
- לטיפול בבעיות לב (כגון דיגוקסין)
- לטיפול באסטמה (מרחיבי סימפונות מקבוצת בטא-2 אגוניסטים)
- לטיפול בבעיות עיכול (כגון סימטידין)
- קורטיקוסטרואידים לטיפול בדלקות במחלות כמו אסטמה ודלקת פרקים
- להורדת רמת הסוכר בדם כמו אינסולין או תרופת "סולפונילאוריאה". הרופא יכול להנחות אותך להפחתת מינון של תרופות אלו למניעת ירידת יתר של הסוכר בדם (היפוגליקמיה).

⚠ שימוש בתרופה ומזון

יש לקחת את התרופה עם הארוחה למניעת הפרעות במערכת העיכול. ראה סעיף 3 – "כיצד תשתמש בתרופה".

⚠ שימוש בתרופה וצריכת אלכוהול

בעת טיפול בקסיגדו XR אין לשתות אלכוהול לעיתים קרובות או לשתות אלכוהול בכמות גדולה בפרק זמן קצר. הדבר עלול להעלות את הסיכון להופעת תופעות לוואי חמורות.

הריון והנקה:

אם את בהריון, מתכננת הריון, חושבת שאת בהריון, יש להיוועץ ברופא לפני השימוש בתרופה. קסיגדו XR יכול לגרום נזק לעובר. דברי עם הרופא לגבי הדרך הטובה ביותר לטיפול לאיזון רמת הסוכר בדם. אם הנך מיניקה או מתכננת להניק יש להיוועץ ברופא לפני השימוש בתרופה. לא ידוע אם קסיגדו XR עובר לחלב. דברי עם הרופא לגבי הדרך הטובה ביותר להזין את תינוקך כשאת לוקחת קסיגדו XR.

הנהיגה ושימוש במכוונות

לתרופה זו אין השפעה או השפעה זעומה על יכולת הנהיגה או שימוש במכוונות. נטילת התרופה עם תרופות אחרות, המורידות את רמת הסוכר בדם, כמו תרופות ממשפחת הסולפונילאוריאה או אינסולין עלולה להביא לרמה נמוכה מידי של סוכר בדם (היפוגליקמיה), אשר יכולה להביא לסימנים כמו חולשה, סחרחורת, הזעה מרובה, דופק מהיר, שינויים בראייה או קשיי ריכוז, ועלולה להשפיע על יכולת הנהיגה ועל השימוש במכוונות. אין לנהוג או להפעיל מכוונות או ציוד, אם הנך מתחיל להרגיש **תסמינים אלה**

שימוש בילדים:

התרופה אינה מיועדת לילדים ומתבגרים מתחת לגיל 18. אין מידע לגבי בטיחות ויעילות השימוש בקסיגדו XR בילדים ובמתבגרים מתחת לגיל 18.

קסיגדו XR מכיל לקטוז:

הטבליות מכילות לקטוז אשר הינו סוג של סוכר. אם נאמר לך על ידי הרופא שאתה סובל מאי-סבילות לסוכרים מסויימים, היוועץ ברופא לפני נטילת תרופה זו (תכולת לקטוז – ראה סעיף 6 "מידע נוסף").

3. כיצד תשתמש בתרופה?

- תמיד יש להשתמש לפי הוראות הרופא. עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אינך בטוח.
- המינון ואופן הטיפול יקבעו ע"י הרופא בלבד.
- המינון המקובל הוא טבליה אחת ליום עם ארוחה, להקטנת הפרעות בעיכול.
- דבר עם הרופא לגבי הזמן הטוב ביותר עבורך לקחת את התרופה במשך היום.
- יש לבלוע את הטבליה בשלמותה. אין לחצות, אין לכתוש או ללעוס את הטבליה.
- יתכן ולעיתים גוש רך יופרש בצואה הנראה כמו טבליה של קסיגדו XR.
- כאשר גופך נמצא במצב לחץ (סטריס) כמו חום, טראומה (כמו תאונת דרכים), זיהום או ניתוח, המינון הנדרש של תרופות לסכרת יכול להשתנות. אם אתה נמצא באחד מהמצבים האלו תדווח לרופא באופן מיידי ותפעל לפי הנחיותיו.

• תזונה ופעילות גופנית

- עליך להמשיך לשמור על תזונה תזונתית ופעילות גופנית, כאשר אתה נוטל קסיגדו XR.

- **אם שכחת ליטול את התרופה** – קח את התרופה בהקדם כאשר נזכרת בכך. אם זה קרה בסמוך לזמן שבו אתה אמור לקחת את המנה הבאה, תדלג על המנה ששכחת ליטול וקח

את המנה הבאה בזמן הרגיל. **אל תיקח** באותו הזמן שתי מנות קסיגדו XR אלא אם כן הרופא הנחה אותך לכך.

- **אם נטלת בטעות מינון גבוה מידי של קסיגדו XR**, תתקשר לרופא או תגיע בדחיפות לחדר מיון של בית החולים הקרוב אליך.

יש להתמיד בטיפול כפי שהומלץ ע"י הרופא.
גם אם חל שיפור במצב בריאותך, אין להפסיק את הטיפול בתרופה ללא התייעצות עם הרופא. רמת הסוכר בדמך יכולה לעלות ללא התרופה.
אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היוועץ ברופא או ברוקח.

אין ליטול תרופות בחושך! בדוק את התווית והמנה בכל פעם שהנך נוטל תרופה. הרכב משקפיים אם הנך זקוק להם.

4. תופעות לוואי

כמו בכל תרופה, השימוש בקסיגדו XR עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אם תופעות הלוואי אינן חולפות או שהן מטרידות או שהן מחמירות, יש להתייעץ עם הרופא. אל תיבהל למקרא רשימת תופעות הלוואי. יתכן ולא תסבול מאף אחת מהן.

תופעות המחייבות התייחסות מיוחדת: פנה לרופא מיד אם הופיעו התופעות הבאות:

- המרכיב הפעיל מטפורמין בקסיגדו XR עלול לגרום לתופעת לוואי נדירה (עלולה להשפיע על 1 מתוך 10,000 משתמשים) אבל חמורה הנקראת חמצת לקטית, ראה לעיל סעיף **אזהרות מיוחדות הנוגעות בשימוש בקסיגדו XR חמצת לקטית (Lactic Acidosis)**. במקרה ותופעת לוואי זאת מופיעה יש להפסיק מייד שימוש בתכשיר וליצור קשר מייד עם הרופא או עם בית החולים הקרוב ביותר, כיוון שחמצת מטבולית עלולה להוביל לתרדמת.

תופעות לוואי נוספות:

- התייבשות - איבוד גדול של נוזלים ומלחים מהגוף. התייבשות עלולה לגרום להרגשת סחרחורת, להתעלפות, סחרחורת או חולשה במיוחד בעת קימה (תת לחץ דם בעמידה).
- אתה עלול להיות בסיכון גבוה יותר להתייבשות אם:
 - יש לך לחץ דם נמוך
 - אתה לוקח תרופות להורדת לחץ דם, כולל תרופות משתנות (דיורטיות)
 - הנך בגיל 65 או מבוגר יותר
 - אתה בדיאטת דלת מלח
 - יש לך בעיות בכליה
- שוחח עם הרופא שלך מה ניתן לעשות על מנת למנוע התייבשות, כולל כמה נוזלים לשתות מידי יום.

- **קטואצידוזיס (עליה ברמת הקטונים בדם או בשתן)**
קטואצידוזיס התרחש במטופלים, בעת הטיפול עם דפהגליפלזין, שהוא אחד המרכיבים הפעילים בקסיגדו XR. קטואצידוזיס התרחש במטופלים עם סכרת כאשר היו חולים או עברו ניתוח במהלך הטיפול בקסיגדו XR

קטואצידוזיס הוא מצב רפואי רציני, שיתכן וידרוש טיפול בבית חולים. קטואצידוזיס עלול להוביל למוות

קטואצידוזיס יכול להתרחש גם אם רמות הסוכר בדם הן פחות מ 250 מ"ג לדציליטר. הפסק לקחת קסיגדו XR ופנה לרופא מיד אם יש לך אחד מהסימנים הבאים:

- בחילה
- עייפות
- הקאה
- קשיי נשימה
- כאבים באזור הבטן

אם יש לך אחד הסימנים האלו בעת נטילת קסיגדו XR, אם ניתן, תבצע בדיקה לרמות הקטונים בשתן, גם אם רמות הסוכר שלך נמוכות מ 250 מ"ג לדציליטר.

• בעיות בכליה

פגיעה כלייתית פתאומית ארעה למטופלים שנטלו קסיגדו XR. פנה לרופא המטפל מייד אם:

- כמות המזון והשתייה שאתה צורך יורדת, אם אתה חולה ולא יכול לאכול או
- אם אתה מתחיל לאבד נוזלי גוף למשל, כתוצאה מהקאה, משלשול או משהות ממושכת מדי בשמש.

• זיהום חמור בדרכי השתן:

דלקת חמורה בדרכי השתן העלולה להוביל לאישפוז התרחשה באנשים הנוטלים דפהגליפלזין, אחד מהמרכיבים הפעילים של קסיגדו XR. ספר לרופא אם יש לך סימנים או תסמינים של דלקת בדרכי השתן כגון: צריבה במתן שתן, מתן שתן תכוף, צורך במתן שתן באופן מיידי, כאבים בחלק התחתון של הבטן או דם בשתן. לעיתים מופיע גם חום, כאבי גב, בחילות והקאות.

• זיהומים באזור הגניטלי (Fournier's gangrene/necrotising fasciitis of the perineum),

זיהום חמור ברקמות הרכות באברי המין או באזור בין איבר המין ופי הטבעת, תופעה נדירה מאד.

- יש לפנות לעזרה רפואית מידית במקרה של התסמינים הבאים: אודם, רגישות או נפיחות באיזור הגניטלי עד פי הטבעת וחום מעל 38°C או הרגשה כללית רעה.
- תסמינים אלו עלולים להידרדר במהירות ולכן חשוב לפנות לעזרה רפואית במהירות.

• רמת סוכר נמוכה בדם (היפוגליקמיה)

אם אתה נוטל קסיגדו XR עם תרופות אחרות שיכולות לגרום להורדת רמת הסוכר בדם, כמו סולפונילאוריאה או אינסולין, יש לך סיכון גבוה יותר לרמת סוכר נמוכה בדם. ייתכן ויש צורך בהפחתת המינון של סולפונילאוריאה או של אינסולין בעת השימוש בקסיגדו XR. סימנים ותסמינים של רמת סוכר נמוכה בדם יכולים לכלול:

- כאב ראש,
- חולשה,
- בלבול,
- רעד או,
- עצבנות,
- סחרחורת,
- ישנוניות,

- אי שקט,
- הזעה,
- רעב,
- דופק מהיר.

- **ירידה/מחסור בויטמין B12:**

שימוש במטפורמין לאורך תקופות ארוכות יכול להביא לירידה ברמת ויטמין B12 בדמך, במיוחד אם היה לך מחסור בויטמין B12 לפני כן. ייתכן והרופא יבצע בדיקות דם לרמת ויטמין B12.

- **זיהום פטרייתי בנרתיק**

הסימנים לזיהום פטרייתי בנרתיק כוללים:

- ריח מהנרתיק,
- הפרשה לבנה או צהבהבה (יכולה להיות עם גושים),
- גרוד וגינאלי

- **זיהום פטרייתי של העור באיבר המין הזכרי (דלקת בעטרת הפין). גברים שאינם נימולים**

יכולים לפתח נפיחות של איבר המין. סימנים נוספים לזיהום כוללים:

- אדמומיות, גרוד או נפיחות הפין
- פריחה בפין
- הפרשה עם ריח רע
- כאב בעור סביב הפין

אנא פנה לרופא אם הבחנת בסימני זיהום פטרייתי בנרתיק או באיבר המין הזכרי. ייתכן והרופא יציע לך טיפול עם תרופה אנטיפטרייתית. במידה והנך לוקח תרופה זו ואין שיפור במצב יש לחזור לרופא המטפל.

תופעות הלוואי השכיחות ביותר בעת נטילת קסיגדו XR:

- זיהום פטרייתי בנרתיק או בפין
- גודש באף או מזלת וכאב גרון
- שלשול
- **זיהום בדרכי השתן**
- כאב ראש

אם הופיעה תופעת לוואי, אם אחת מתופעות הלוואי מחמירה או כאשר אתה סובל מתופעת לוואי שלא צויינה בעלון, עליך להתייעץ עם הרופא.

דיווח על תופעות לוואי

ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי עקב טיפול תרופתי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות www.health.gov.il המפנה לטופס המקוון לדיווח על תופעות לוואי, או ע"י כניסה לקישור

<https://sideeffects.health.gov.il/>

5. איך לאחסן את התרופה?

- מנע הרעלה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם וטווח ראייתם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעלה. אל תגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא.
- אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (exp. date) המופיע על גבי האריזה.
- תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו חודש.
- יש לאחסן בטמפרטורת החדר מתחת ל 30 מעלות צלזיוס.

6. מידע נוסף

- נוסף על החומר הפעיל התרופה מכילה גם:
 - בטבליה-
microcrystalline cellulose PH302, lactose anhydrous, crospovidone, silicon dioxide, magnesium stearate, carboxymethylcellulose sodium, and hypromellose 2208
 - קסיגדו 5 XR מ"ג/ג 500 מ"ג וקסיגדו 10 XR מ"ג/ג 500 מ"ג מכילים גם- hypromellose 2910 and microcrystalline cellulose PH102
 - בציפוי הטבליה-
polyvinyl alcohol, titanium dioxide, polyethylene glycol, talc
 - קסיגדו 5 XR מ"ג/ג 500 מ"ג - מכיל גם- FD&C Yellow No. 6/Sunset Yellow FCF Aluminum Lake
 - קסיגדו 5 XR מ"ג/ג 1000 מ"ג, קסיגדו 10 XR מ"ג/ג 500 מ"ג, קסיגדו 10 XR מ"ג/ג 1000 מ"ג- מכילים גם iron oxides
 - תכולת לקטוז –
 - קסיגדו 5 XR מ"ג/ג 500 מ"ג – כל טבליה מכילה 48 מ"ג לקטוז
 - קסיגדו 5 XR מ"ג/ג 1000 מ"ג - כל טבליה מכילה 48 מ"ג לקטוז
 - קסיגדו 10 XR מ"ג/ג 500 מ"ג - כל טבליה מכילה 48 מ"ג לקטוז
 - קסיגדו 10 XR מ"ג/ג 1000 מ"ג - כל טבליה מכילה 48 מ"ג לקטוז
- כיצד נראית התרופה?
 - קסיגדו 5 XR מ"ג/ג 500 מ"ג – טבליה בצבע כתום, קמורה בשני הצדדים, בצורת כמסה, בצד אחד מוטבע "1070" ו- "5/500" ובצד השני חלק.
 - קסיגדו 5 XR מ"ג/ג 1000 מ"ג- טבליה בצבע ורוד עד ורוד כהה, קמורה בשני הצדדים, בצורה אובלית, בצידה האחד מוטבע "1071" ו- "5/1000" ובצד השני חלק.
 - קסיגדו 10 XR מ"ג/ג 500 מ"ג- טבליה בצבע ורוד, קמורה בשני הצדדים, בצורת כמסה, בצד אחד מוטבע "1072" ו- "10/500" ובצד השני חלק.
 - קסיגדו 10 XR מ"ג/ג 1000 מ"ג- טבליה בצבע צהוב עד צהוב כהה, קמורה בשני הצדדים, בצורה אובלית, בצד אחד מוטבע "1073" ו- "10/1000" ובצד השני חלק.

בעל הרישום: אסטרזהניקה (ישראל) בע"מ ת.ד. 1455 הוד השרון 4524075

יצרן: AstraZeneca Pharmaceuticals LP, 4601 Highway 62 East, Mount Vernon,
Indiana, USA.

מס' רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי של משרד הבריאות:

קסיגדו XR 5 מ"ג/500 מ"ג – 1556634419

קסיגדו XR 5 מ"ג/1000 מ"ג - 1556734424

קסיגדו XR 10 מ"ג/500 מ"ג - 1556834425

קסיגדו XR 10 מ"ג/1000 מ"ג – 1556934428

לשם הפשטות והקלת הקריאה עלון זה נוסח בלשון זכר, אך התרופה מיועדת לשני המינים.

נערך באוגוסט 2020