

نشرة للمستهلك بموجب أنظمة الصيادلة (المستحضرات) - 1986

يتم تسويق الدواء بوصفة طبيب فقط

دواكليس® جينونير®

340/12 ميكروغرام

مسحوق للاستنشاق

المواد الفعالة:

كل جرعة للاستنشاق تحتوي على: 396 مكغ أكليدينيوم بروميد (aclidinium bromide) بكمية معادلة لـ 340 مكغ من أكليدينيوم (aclidinium) و11.8 ملغ من فورموتيرول فومارات ديهيدرات (formoterol fumarate dihydrate).

للاطلاع على قائمة المكونات غير الفعالة ارجع إلى البند 6.

راجع كذلك "المعلومات الهامة عن بعض مكونات الدواء" ضمن البند 2.

يرجى الاطلاع بعناية على النشرة حتى نهايتها، قبل أن تستخدم الدواء.

احتفظ بهذه النشرة، فربما ستحتاجها لاحقاً.

تتضمن هذه النشرة معلومات مختصرة عن الدواء. إذا راودتك أسئلة إضافية، فيرجى التوجه إلى الطبيب أو الصيدلي.

تم وصف هذا الدواء لعلاج مرضك. لا تمرره إلى أشخاص آخرين. فقد يضر بهم حتى إذا كنت تعتقد بأن مرضهم شبيه.

الدواء غير مخصص لأطفال ومراهقين دون الـ 18 من العمر.

1. لمن يخصص هذا الدواء؟

الدواء مخصص لعلاج الصيانة لتوسيع القصبات بهدف تخفيف الأعراض لدى كبار السن المصابين بمرض COPD (داء الانسداد الرئوي المزمن). يتسبب هذا المرض بتلف مسالك الهواء في الرئتين أو انسدادها. من خلال توسيع المسالك التنفسية فإن الدواء يخفف أعراضاً مثل ضيق التنفس. ويساعد الاستخدام الدائم للمنشقة على تقليل تأثير مرض الـ COPD على روتين حياتك اليومية.

المجموعة العلاجية:

يحتوي الدواء على مركبين فعالين من فئة موسعات القصبات هما.

أكليدينيوم بروميد: مضاد كولين.

فورموتيرول فومارات ديهيدرات: ناهض بيتا (ذو مفعول مستمر).

2. قبل استخدام الدواء

لا يجوز استعمال هذا الدواء إذا:

لا يجوز استخدامه إذا كانت لديك حساسية (حالة أرجية) تجاه المكونات الفعالة (فورموتيرول فومارات ديهيدرات، أكليدينيوم بروميد) أو المكوّن الإضافي اللاكتوز (انظر البند 6).

تحذيرات خاصة بشأن استخدام الدواء:

قبل العلاج بدواكليس جينونير أخبر طبيبك إذا كنت تعاني من:

- الربو، لا يجوز استخدام هذا الدواء لعلاج الربو
- مشاكل قلبية
- الصرع
- مشاكل الغدة الدرقية (فرط نشاط - thyrotoxicosis)
- ورم في إحدى الغدد الكظرية (phaeochromocytoma)
- صعوبات في التبول أو مشاكل بسبب تضخم البروستاتا
- الماء الأزرق ضيق الزاوية، الذي يسبب ضغطاً مرتفعاً داخل العين (narrow angle glaucoma).

• توقف عن العلاج وتوجه لتلقي العناية الطبية الفورية في الحالات التالية:

- عند ظهور صعوبة مفاجئة في التنفس أو البلع، أو تورم اللسان؛ الحلق، الشفاه أو الوجه؛ طفح جلدي وأو حكة. قد تشكل هذه الأعراض علامة لحدوث رد فعل تحسسي.

- إذا كنت تشعر فور استخدام هذا الدواء بضغط في الصدر، أو سعال، أو أزيز عند التنفس أو ضيق تنفس، فقد تشكل هذه الأعراض علامة على "تشنج قصبي حاد" (تشنج أكبر وأطول لعضلات المسالك التنفسية والذي يظهر مباشرة بعد استخدام موسعات القصبات).

- المنشقة مخصصة لعلاج الصيانة (طويل المدى) لـ COPD وهي غير مخصصة لعلاج نوبة مفاجئة من ضيق التنفس أو الأزيز عند التنفس.
- إذا لم يطرأ تحسن على أعراض الـ COPD (ضيق التنفس، أزيز عند التنفس، سعال) أو تفاقت، فيجب مواصلة استخدام دواكليس جينوتير والتوجه إلى الطبيب بأسرع وقت ممكن، وقد تحتاج دواءً آخر.
- أو كنت تلاحظ الهالات حول أجهزة الإنارة أو الأشكال الملونة، أو كنت تعاني من ضبابية رؤية مؤقتة، أو ألم أو إزعاج في العيون، فيرجى التوجه إلى طبيب بأسرع وقت ممكن.
- شوهدت ظاهرة جفاف الفم عند تناول مستحضرات مشابهة لدواكليس جينوتير. يجب الحرص على نظافة الفم، بما أن الدواء قد يسبب جفاف الفم، وأن جفاف الفم عند الاستخدام المتواصل قد يتسبب بالتسوس السني.

الأطفال والمراهقون

الدواء غير مخصص لأطفال ومراهقين دون الـ 18 من العمر.

إذا كنت تتناول أو إذا تناولت مؤخراً أدوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبية ومكملات غذائية، فأخبر الطبيب أو الصيدلي بذلك.

بشكل خاص يجب إبلاغ الطبيب أو الصيدلي إذا كنت تتناول الأدوية التالية

- أدوية أخرى تشبه دواكليس جينوتير لعلاج مشاكل التنفس.
- أدوية من شأنها خفض مستويات البوتاسيوم في الدم مثل:
 - كورتيكوستيرويدات يتم تناولها عبر الفم (مثلاً بريدنيزولون).
 - مدرات البول (مثل فوروسيميد أو هيدروكلورثيازيد).
 - أدوية معينة لعلاج مشاكل التنفس (مثل ثيوفيلين).
- أدوية من فئة منبهات بيتا والتي تُستخدم من بين أمور أخرى لعلاج ارتفاع ضغط الدم أو المشاكل القلبية (مثل أتينولول، بروبرانولول) أو لعلاج الماء الأزرق (مثل تيمولول).
- أدوية من شأنها التسبب بتغيير النشاط الكهربائي للقلب (تمدد مقطع QT)، المبيّن من خلال تسجيلات القلب (ECG)، مثل أدوية لعلاج الحالات التالية:
 - الاكتئاب (مثلاً منبهات أكسيداز أحادي الأمين أو مضادات الاكتئاب ثلاثية الحلقات).
 - حالات العدوى الجرثومية (مثلاً إريثروميسين، كلاريثروميسين، تيليثروميسين).
 - ردود فعل تحسسية (مضادات الهستامين).

استخدام الدواء مع تناول الطعام والشرب

يمكن استخدام الدواء في أي وقت (قبل أو بعد تناول الطعام أو الشراب).

الحمل والرضاعة الطبيعية

إذا كنت حاملاً أو مرضعة، تعتقدين أنك حامل أو تخططين للدخول في حمل، فيجب استشارة طبيب قبل استخدام الدواء. لا يجوز استخدام الدواء إذا كنت حاملاً أو مرضعة بدون استشارة الطبيب.

القيادة واستخدام الآلات

من غير المحتمل أن الدواء سيؤثر على القدرة على قيادة السيارة أو تشغيل الآلات. مع ذلك قد يسبب الدواء لدى بعض المرضى ضبابية الرؤية أو الدوار. إذا كنت تشعر بهذه الأعراض - فلا يجوز قيادة السيارة أو تشغيل الآلات (حتى يزول الدوار وتعود الرؤية لديك إلى سابق عهدها).

المعلومات هامة عن بعض مكوثات الدواء
يحتوي الدواء على اللاكتور. إذا أخبرك الطبيب أنك تعاني من عدم القدرة على تحمل السكريات المعيّنة، فيجب استشارة الطبيب قبل تناول الدواء (راجع البند 6).

3. كيفية استخدام الدواء؟

يجب دائماً استخدامه حسب تعليمات الطبيب. يجب التحقق مع الطبيب أو الصيدلي إذا كنت غير متأكد. سيتم تحديد الجرعة وطريقة العلاج من قبل الطبيب فقط.

- **الجرعة المتبعة عادةً هي:** الاستنشاق مرة واحدة مرتين في اليوم: مرة واحدة صباحاً ومرة واحدة مساءً.
- يدوم مفعول الدواء 12 ساعة، لذا يوصى باستخدام المنشقة في نفس الوقت كل صباح وكل مساء، مما يضمن مستوى كافياً من الدواء في جسمك والذي سيسمح لك بالتنفس بسهولة أكثر سواء خلال النهار أو الليل. ويساعد تناول الدواء خلال أوقات منتظمة حتى في تذكر استخدامه.
- دواكوير جينويبر مخصص للاستخدام بالاستنشاق
- تعليمات استخدام المنشقة الجينويبر: يرجى قراءة تعليمات الاستخدام الواردة في نهاية النشرة بعناية قبل استخدام المنشقة. إذا كنت غير متأكد من طريقة استخدام المنشقة، فيرجى التوجه إلى طبيب أو صيدلي.

داء الانسداد الرئوي المزمن (COPD) هو عبارة عن مرض متواصل، حيث يكون استخدام دواكوير جينويبر على مدار فترة زمنية طويلة، لذا فمن المهم استخدام دواكوير جينويبر يومياً، مرتين في اليوم، وليس فقط عند معايشة مشاكل تنفسية أو أعراض أخرى متعلقة بمرض الـ COPD.

يمكن استخدام المستحضر بالجرعة الموصى بها سواء للمسنين أو المرضى المصابين بمشاكل كلوية أو كبدية. لا حاجة لضبط الجرعة لدى مجموعات المرضى هذه.

لا يجوز تجاوز الجرعة الموصى بها.

إذا كنت تستخدم جرعة أعلى من اللازم، أو كنت تشبه أنك قد استخدمت جرعة أعلى من اللازم، فهناك احتمال أعلى لأن تعيش آثاراً جانبية مثل: ضبابية الرؤية، جفاف الفم، الغثيان، القشعريرة، الصداع، خفقان القلب، أو ارتفاع ضغط الدم. يرجى التوجه فوراً إلى الطبيب المعالج أو غرفة الطوارئ في المستشفى وإحضار علبة الدواء معك. قد تحتاج مساعدة طبية.

إذا نسيت استخدام المنشقة: إذا نسيت جرعة دواكوير جينويبر، فيجب استنشاق الجرعة فور تذكرك، ثم تناول الجرعة التالية في الموعد المعتاد. لا يجوز تناول مقدار دوائي مزدوج للتعويض عن المقدار الدوائي المفقوت.

يجب الاستمرار في العلاج حسب توصية الطبيب. حتى إذا طرأ تحسن على حالتك الصحية، لا يجوز إيقاف العلاج بالدواء دون استشارة الطبيب أو الصيدلي.

إذا توقفت عن استخدام الدواء: الدواء مخصص للعلاج المتواصل. إذا كنت تريد التوقف عن استخدام الدواء، فاستشر الطبيب أولاً، لأن الأعراض المرضية قد تتفاقم.

لا يجوز استخدام أو تناول أدوية في الظلام! تحقق من داعي الاستخدام والجرعة في كل مرة تستخدم فيها الدواء. ارتد النظارات إذا كنت تحتاجها.

إذا راودتك أسئلة أخرى بشأن استخدام الدواء، فاستشر طبيباً أو صيدلياً.

4. آثار جانبية

أسوءه بأي دواء، قد يسبب استخدام دواكوير جينويبر آثاراً جانبية لدى بعض المستخدمين. لا تقلق أثناء قراءة قائمة الآثار الجانبية. فقد لا تعاني أيًا منها.

توجه إلى الطبيب فوراً إذا ظهرت الآثار الجانبية الخطيرة التالية:

الآثار الجانبية غير الشائعة (تظهر بتكرار يصل إلى مريض واحد من أصل 100 مريض)

- وهن العضلات، التشنجات و/أو سرعة القلب غير الطبيعية: قد تتمثل هذه الأعراض في علامات انخفاض مستويات البوتاسيوم في الدم.
- التعب، زيادة العطش و/أو الحاجة للتبول بشكل أكثر تكراراً من المعتاد: قد تشير هذه الأعراض إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم.
- خفقان القلب، لأن ذلك قد يشكل عرض وتيرة نبضات القلب السريعة بشكل غير معتاد أو اضطراب سرعة القلب.

الآثار الجانبية النادرة (تظهر بتكرار يصل إلى مريض واحد من أصل 1000 مريض):

- صعوبة مفاجئة في التنفس أو البلع، أو تورم اللسان، أو الحلق، أو الشفاه أو الوجه؛ طفح جلدي و/أو حكة: قد تشكل هذه الأعراض مؤشراً لحدوث رد فعل تحسسي

آثار جانبية إضافية:

آثار جانبية شائعة (تظهر بتكرار يصل إلى مريض واحد من أصل 10 مرضى):

- مزيج من ألم الحلق والزركام (قد تشكل أعراض التهاب الأنف والبلعوم)
- صداع
- ألم عند التبول و/أو التبول بشكل متكرر (قد تشكل هذه أعراض التهاب في مسالك البول)
- سعال
- إسهال
- انسداد الأنف، احتقانه أو نزلة البرد و/أو ألم أو إحساس بالضغط في الخدين أو الحاجب (قد تشكل علامات لحدوث التهاب الجيوب الأنفية)
- دوار
- تشنج العضلات
- غثيان
- صعوبات في النوم
- جفاف الفم
- آلام عضلات
- التهاب صديدي (خراج) في أنسجة قاعدة السن
- ارتفاع مستويات بروتين يوجد داخل العضلة اسمه كرياتين فوسفوكيناز في الدم
- قشعريرة
- قلق

آثار جانبية غير شائعة (تظهر بتكرار يصل إلى مريض واحد من أصل 100 مريض):

- تسرع القلب (الخبض)
- آلام أو ضغط في الصدر (الذبحة الصدرية)
- ضبابية الرؤية
- تغيرات في الصوت (بحة الصوت)
- صعوبة في التبول أو شعور بأن المثانة لا تفرغ تماماً (حبس البول)
- اضطراب سرعة القلب (إطالة مقطع QT)
- تغيرات في حاسة الذوق
- تهيج في الحلق
- التهاب تجويف الفم (التهاب الفم)
- ارتفاع ضغط الدم
- تململ
- طفح
- حكة جلدية

في كل حال حيث تعيش آثاراً جانبية لم يتم ذكرها في هذه النشرة، أو إذا طرأ تغيير على شعورك العام فعليك استشارة الطبيب فوراً!

الإبلاغ عن الآثار الجانبية

يمكن إبلاغ وزارة الصحة عن آثار جانبية من خلال الضغط على رابط "الإبلاغ عن آثار جانبية بعد العلاج الدوائي" الوارد عن الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة على عنوان (www.health.gov.il) الذي يحوّل إلى النموذج الإلكتروني للإبلاغ عن آثار جانبية، أو من خلال دخول الرابط:
<https://sideeffects.health.gov.il>

5. كيف ينبغي تخزين الدواء؟

- تجنب التسمم! يجب الاحتفاظ بهذا الدواء وأي دواء آخر في مكان مغلق بعيداً عن متناول ومجال رؤية الأطفال و/أو الرضع مما سيحول دون حالات التسمم. لا تتسبب بالتقبؤ إلا إذا أُرشدك الطبيب لذلك بشكل صريح.
- لا يجوز استخدام الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية (exp. date) الظاهر على العلبة. تاريخ انتهاء الصلاحية يشير إلى آخر يوم من ذلك الشهر.
- ظروف التخزين: يجب الاحتفاظ بدرجة حرارة لا تتجاوز 30°C.
- يمكن استخدام المنشقة بعد إخراجها من كيس الألومينيوم بفترة أقصاها 60 يوماً (من فتح غلاف الألومينيوم).
- يجب الاحتفاظ بالمنشقة في رزمتها الأصلية، في كيس الألومينيوم المغلق حتى بداية الاستخدام.
- لا يجوز استخدام المنشقة، إذا لاحظت أن الرزمة تالفة.
- بعد استخدام الجرعة الأخيرة، يجب التخلص من المنشقة. استشارة الصيدلي بشأن كيفية القيام بذلك.

6. معلومات إضافية

بالإضافة إلى المكونات الفعالة، يحتوي المستحضر كذلك على المادة غير الفعالة المسماة لاکتوز مونوهيدرات (Lactose monohydrate).

كل جرعة محددة تحتوي على 11.6 ملغ من اللاكتوز مونوهيدرات.

كيف تبدو الدواء وما محتوى الرزمة؟

الدواء الموجود في دواكبير جينوتير هو عبارة عن مسحوق أبيض اللون أو يكاد يكون أبيض. منشقة الجينوتير هي بيضاء اللون ويرفق بها مقياس جرعات وزر جرعات برتقالي اللون باعتبارهما جزءاً لا يتجزأ منها. الفوهة مغطاة بغطاء برتقالي اللون وقابل للإزالة. المنشقة موجودة في كيس ألومينيوم محكم الإغلاق والذي يحتوي على جهاز ماص للرطوبة ومعلب داخل رزمة كرتون. بعد إخراج المنشقة من كيس الألومينيوم يجب التخلص من أكياس الألومينيوم من الجهاز الماص للرطوبة. المنشقة تتضمن 60 جرعة.

صاحب التسجيل: أسترازينيكا (إسرائيل) م.ض.، ص. ب. 1455، هود هشارون 4524075

المنتج: أيدسترياس فارماتسيوتيكس أل ميرال S.A.، إسبانيا

رقم تسجيل الدواء في سجل الأدوية الرسمي الخاص بوزارة الصحة: 155-38-34337-00

لتبسيط وتسهيل القراءة تمت صياغة هذه النشرة بلغة المذكر، إلا أن الدواء المخصص للجنسين على حد سواء.

حُرر في يونيو 2020

تعليمات استخدام منشقة جينوير

هذا القسم يحتوي على معلومات بشأن طريقة استخدام منشقة جينوير. من المهم أن تقرأ المعلومات عن منشقة جينوير لأن مفعولها قد يكون مختلفاً عن منشقات أخرى استخدمتها سابقاً.

إذا راودك أي سؤال حول طريقة الاستخدام، فيرجى التوجه للدكتور، أو الصيدلي أو الممرضة

تنقسم تعليمات الاستخدام على المراحل التالية:

- قبل الاستخدام

- المرحلة 1: تحضير الجرعة

- المرحلة 2: استنشاق الدواء

- معلومات إضافية

قبل الاستخدام


قبل استخدام منشقة دواكوير جينوير، يرجى قراءة تعليمات الاستخدام المذكورة أعلاه

التعرف على أجزاء المنشقة

نافذة التحكم.

زر أحمر مقياس أخضر = المنشقة جاهزة للاستخدام

غطاء واقى الفوهة



نافذة التحكم.

أحمر = يدل على أن

الاستنشاق يتم كما ينبغي

الفوهة

الرسم التوضيحي 1

1. قبل الاستخدام الأول، مزق الكيس المغلق بإحكام ثم أخرج المنشقة. تخلص من الكيس ومن الجهاز الماص للرطوبة.
2. لا تضغط على الرز البرتقالي قبل أن تكون جاهزاً لأخذ جرعة الدواء.
3. أزل الغطاء الواقى من الفوهة بالضغط بلطف على الأزرار المعلمة من جانبي الغطاء (انظر الرسم البياني 2).



اضغط هنا

ثم اسحب

الرسم التوضيحي 2

المرحلة 1: تحضير الجرعة

- 1.1 تأكد من عدم وجود أي شيء يسد الفوهة. (الرسم البياني 3)
- 1.2 أنظر إلى نافذة التحكم. يجب أن تكون نافذة التحكم حمراء اللون (الرسم التوضيحي 3).

أحمر



يجب التحقق من فتحة الفوهة

الرسم التوضيحي 3

1.3 أمسك بالمنشقة بوضعية أفقية، حيث تتجه الفوهة إليك والزر البرتقالي يتجه نحو الأعلى (الرسم التوضيحي 4).



الرسم التوضيحي 4

1.4 اضغط فوق الزر البرتقالي حتى الأسفل لشحن جرعة. عندما تضغط فوق الزر الأحمر حتى الأسفل، ستغيّر نافذة التحكم لونها من الأحمر للأخضر (الرسم التوضيحي 5).

تأكد من أن الزر البرتقالي يتجه نحو الأعلى. لا تميل المنشقة.

1.5 أطلق الزر البرتقالي (الرسم التوضيحي 6).

تأكد من أنك قد أطلقت الزر الأحمر لتعمل المنشقة بشكل سليم.



الرسم التوضيحي 6 الرسم التوضيحي 5

توقف لتفحص:

1.6 تأكد من أن نافذة التحكم خضراء اللون الآن. (الرسم التوضيحي 7)
دواؤك جاهز للاستنشاق.

المرحلة 2: استنشاق الدواء



الرسم التوضيحي 7

ماذا يتعين عليك القيام به إذا بقيت نافذة التحكم حمراء اللون بعد الضغط على الزر؟ (الرسم التوضيحي 8)



الرسم التوضيحي 8

الجرعة غير جاهزة. يجب الرجوع إلى "المرحلة 1: تحضير الجرعة" ثم تكرار الخطوات المفصلة ضمن البنود 1.1-1.6.

المرحلة 2: استنشاق الدواء

اقرأ البنود 2.1-2.7 بأكملها قبل استخدام المنشقة. لا تميل المنشقة.

2.1 أمسك بالمنشقة بعيداً عن فمك، ثم ازفر كل الهواء. لا تفر إلى داخل المنشقة أبداً (الرسم التوضيحي 9).



الرسم التوضيحي 9

2.2 أبق رأسك مستقيماً، ثم ضع فوهة المنشقة بين شفطيك، وأغلق شفطيك بإحكام حول الفوهة.

لا يجوز الإمساك بالزر البرتقالي وهو متجه نحو الأسفل أثناء الاستنشاق.



الرسم التوضيحي 10

2.3 خذ استنشاقاً قوياً وعميقاً إلى داخل فمك. أمسك بالهواء في الداخل قدر الإمكان.

أثناء الاستنشاق إلى الداخل، ستسمع صوت نقر ("كليك")، والذي يشير إلى أنك تستخدم المنشقة بشكل صحيح. استمر في الاستنشاق إلى الداخل قدر الإمكان حتى بعد سماع صوت النقر ("كليك"). بعض المتعالجين لا يسمعون صوت النقر ("كليك"). أنظر إلى نافذة التحكم للتأكد من استنشاق الجرعة.

2.4 أخرج المنشقة من فمك.

2.5 احبس التنفس قدر الإمكان.

2.6 ازفر نحو الخارج ببطء، وبعيداً عن المنشقة

بعض المتعالجين قد يشعرون وكأنه توجد حبوب في الفم أو بمذاق مر أو حلو. لا تأخذ جرعة إضافية حتى إذا لم تشعر بشيء أو لم تشعر بأي مذاق بعد الاستنشاق.

توقف لتفحص:

2.7 تأكد من أن لون نافذة التحكم تحول للأحمر (الرسم التوضيحي 11). هذا يؤكد أنك استنشقت دواءك بشكل صحيح.



الرسم التوضيحي 11


ماذا ينبغي القيام به إذا ظلت نافذة التحكم خضراء بعد الاستنشاق؟ (الرسم التوضيحي 12)



الرسم التوضيحي 12

يعني ذلك أنك لم تستنشق الدواء بشكل صحيح. ارجع للمرحلة 2 "استنشاق الدواء" ثم كرر المراحل 2.1 حتى 2.7. إذا لم يتغير لون نافذة التحكم إلى الأحمر بعد، فربما قد نسيت إطلاق الزر البرتقالي قبل الاستنشاق أو لم تستنشق بالقوة الكافية. حاول مجددًا. تأكد من أنك قد أطلقت الزر البرتقالي، ثم استنشق نحو الخارج تمامًا وخذ استنشاقًا قويًا وعميقًا عبر فوهة المنشقة. يرجى الاتصال بالطبيب إذا ما زالت نافذة التحكم خضراء بعد عدة محاولات متكررة.

أعد بالضغط غطاء واقي الفوهة بعد كل استخدام، (الرسم التوضيحي 13)، لتجنب تلوث المنشقة بالغبار أو غيره من المواد. يجب التخلص من المنشقة إذا ضاع غطاء الواقي.



الرسم التوضيحي 13

معلومات إضافية

ماذا ينبغي القيام به إذا تم تحضير جرعة سهواً؟

احتفظ بمنشقتك مع الغطاء الواقي في مكانه حتى يأتي وقت استنشاق دوائك، ثم انزع الغطاء وابدأ عند المرحلة 1.6.

كيف يعمل مقياس الجرعات؟

- مقياس الجرعات يبين إجمالي الجرعات المتبقية داخل المنشقة (الرسم التوضيحي 14).
- عند بدء الاستخدام الأول تحتوي كل منشقة على ما لا يقل عن 60 جرعة.
- في كل مرة تقوم بشحن جرعة من خلال الضغط فوق الزر البرتقالي، فسيتحرك مقياس الجرعات قليلاً باتجاه الرقم التالي (0, 10, 20, 30, 40, 50)

متى ينبغي الاستبدال بمنشقة جديدة؟

تحتاج منشقة جديدة إذا:

- تلفت منشقتك أو فقدت الغطاء الواقي
- ظهر خط أحمر منقط على مقياس الجرعات، مما يعني أنك توشك على بلوغ جرعتك الأخيرة (الرسم التوضيحي 14)
- كانت منشقتك فارغة (الرسم التوضيحي 15).

مقياس الجرعات يتقدم ببطء من 60 حتى 0:

خط احمر - مقياس الجرعات



الرسم التوضيحي 14

كيف ستعرف متى تصبح منشقتك فارغة؟
عندما لا يعود الزر البرتقالي بشكل كامل نحو الأعلى أو ينغلق في الوسط، فقد بلغت الجرعة الأخيرة (الرسم التوضيحي 15). رغم أن الزر البرتقالي قد انغلق إلا أنك لا تزال تستطيع استنشاق جرعتك الأخيرة. ثم إذا تعذر استخدام هذه المنشفة فيجب البدء باستخدام منشفة جديدة.



الرسم التوضيحي 15

كيف يتم تنظيف المنشفة؟
لا تنظف المنشفة بالمياه أبدًا، فقد يضر ذلك بالدواء.
إذا كنت تريد تنظيف المنشفة، فنظف الجانب الخارجي من فوهة المنشفة بمنديل ورقي جاف أو بورقة منشفة.