

## نشرة طبية للمستهلك بموجب أنظمة الصيدالوية

(مستحضرات) 1986

يسوق هذا الدواء بحسب وصفة طبيب فقط

**ليركانابرينل تيفاع 10/10**

**أقراص مطلية**

**ليركانابرينل تيفاع 10/20**

**أقراص مطلية**

التركيبية:  
يحتوي كل قرص من **ليركانابرينل تيفاع 10/10** على:  
ليركانابرينيد هيدروكلوريد 10 ملغ وإينالابريل  
10 ملات 10 ملغ

**Lercanidipine hydrochloride 10 mg**  
و **Enalapril maleate 10 mg**.

يحتوي كل قرص من **ليركانابرينل تيفاع 10/20** على:  
ليركانابرينيد هيدروكلوريد 10 ملغ وإينالابريل  
20 ملات 10 ملغ

**Lercanidipine hydrochloride 10 mg**  
و **Enalapril maleate 20 mg**.

للحصول على معلومات عن المركبات غير الفعالة  
التي تندرج تحت "معلومات هامة عن بعض مركبات  
الدواء" والبنء "معلومات إضافية".

**أقرأ النشرة بإمعان حتى نهايتها قبل استعمالك للدواء.**  
تحتوي هذه النشرة على معلومات ملخصة عن الدواء  
إذا توفرت لديك أسئلة إضافية، فراجع الطبيب أو  
الصيدلي.

لقد وُصف هذا الدواء لعلاج مرضك. لا تعطله للآخرين.  
قد يضرهم الدواء حتى لو بدا لك أن حالتهم الطيبة  
مشابهة.

**ليركانابرينل تيفاع غير مخصص لعلاج الأوالاد  
والمراهقين الذين سنهم دون الـ 18.**  
**ليركانابرينل تيفاع غير مخصص للعلاج الأولي لفرط  
ضغط الدم.**

### 1. لأي غرض مخصص هذا الدواء؟

يُستعمل ليركانابرينل تيفاع 10/10 لعلاج فرط  
ضغط الدم لدى متلقي العلاج الذين لم تتم السيطرة  
على ضغط دمهم بما فيه الكفاية عن طريق العلاج  
ببولىكلونيديين لوحده.

يُستعمل ليركانابرينل تيفاع 10/20 لعلاج فرط  
ضغط الدم لدى متلقي العلاج الذين لم تتم السيطرة  
على ضغط دمهم بما فيه الكفاية عن طريق العلاج  
بإينالابريل لوحده.

### الفصلية الأملجية:

ينتمي إينالابريل إلى فصيلة مثبطات الأنزيم  
المحول للأجوتستين (ACE inhibitor).  
ينتمي ليركانابرينيد إلى فصيلة حاصلات قوات  
الكالسيوم.

### 2. قبل استعمال الدواء

#### لا يجوز استعمال الدواء إذا:

كانت لديك حساسية (أرجية) للمكونات الفعالتين  
(إينالابريل وأو ليركانابرين) أو لأي واحد  
من المركبات الأخرى التي يحتوي عليها  
الدواء (انظر البند 6 - "معلومات إضافية") أو  
لأدوية أخرى من نفس الفصائلين العلاجيتين  
(انظر أعلاه).

كانت حاملاً لأكثر من 3 أشهر (يفضل الامتناع  
عن استعمال ليركانابرينل تيفاع أيضاً خلال  
أشهر الحمل الأولى، بنء "الحمل  
الإرضاع").

كانت تعاني من سكري أو من خلل في وظائف  
الكلىة وكانت تتلقى علاجاً بدواء لخفض ضغط  
الدم يحتوي على اليكسكيرين.

كانت تعاني من امراض القلب التالية: قصور  
القلب غير المعالج، انسداد جريان الدم من  
الطين الأيسر في القلب بما فيه التضييق  
الصمام الأبهري، النجبة الصدرية المستمرة  
(التي تحدث خلال الاستراحة)، والتهتك أو  
التي تحدث في أحيان متتالية، ونوبة قلبية  
حدثت خلال الشهر الأخير.

كانت تعاني من خلل شديد في وظيفة الكبد  
أو الكليتين، أو كنت تتخضع لعلاج بالديال  
(غسيل الكلى).

كانت تستعمل أدوية مضادة للظفرات (مثل  
كيتوكونازول، إينيكونازول)، مضادات  
حيوية من فصيلة المكاربوليدات (مثل  
إيريثروميسين، تروليندوميسين)، أدوية  
مضادة للفيروسات (مثل ريتونايفير)،

سيكلوسبورين.  
عانيت من ودمة وعائية (وذمة في الوجه،  
الغشاء الشفوي، اللسان أو الحنجرة، والتي  
تسبب صعوبات في البلع أو في التنفس) نتيجة  
لسبب وراثي أو في أعقاب استعمال دواء من  
فصيلة مثبطات الأنزيم المحول للأجوتستين  
(ACE-inhibitor) أو لسبب غير معلوم.

كانت تأكل ثمار الجريفيروت أو تشرب عصير  
الجريفيروت.

### تحذيرات خاصة تتعلق باستعمال الدواء

قبل العلاج بليركانابرينل تيفاع، أخبر الطبيب إذا:

- كنت تعاني من ضغط دم منخفض (يتجلى  
كأعراض مثل الإغماء أو الدوار خاصة عند  
الانتقال إلى وضعية الوقوف).
- عانيت مؤخراً من تقيؤات أو حالات إسهال.
- كنت تتلقى حمية غذائية قليلة الملح.
- كنت تعاني من مرض في القلب أو من حالة  
مرتبطة بالأوعية الدموية في الدماغ، من مشاكل  
في الكليتين (بما في ذلك زراعة الكلية)، من  
مشاكل في الكبد، من سكري، من امراض التنسج  
العظام المرتبطة بالأوعية الدموية (مثل التنبؤ،  
التهاب المغفصل الروماتويدي أو سكليروديرما  
تصلبي الجلد).

- كنت تعاني من مشاكل في الدم مثل: العذ المنخفض  
لخلايا الدم البيضاء لديك أو نقص خلايا الدم  
البيضاء (قلة الكريات البيض، نذمة الصفيحات)،  
النسواء المنخفضة للمصفحات (قلة الصفيحات) أو  
الانخفاض في عذ خلايا الدم الحمراء (فقر الدم).

- إذا كان لوي ذلك عاقماً، فليكن أن تعلم أن متلقي  
العلاج لوي لون الجلد الغامق أكثر عرضة لخطر  
تطور رد فعل تحسسي يشمل انتفاخ الوجه،  
الشفويين، واللسان أو الحنجرة مع صعوبات في  
البلع أو في التنفس، عند استعمال منقذ الأنزيم  
المحول للأجوتستين (ACE-inhibitor).

- تطوّر لديك سعال جاف وعيد.
- كنت تستعمل إضافات البوتاسيوم أو الأملاح  
التي تحتوي على البوتاسيوم أو الأدوية الحافظة  
للبيوتاسيوم.

- كنت تتلقين أنك حامل أو قد تحملين أو كنت  
مرضاً (انظري البند "الحمل والإرضاع").
- إذا كنت تستعمل أحد الأدوية التالية لخفض  
ضغط الدم:

- حاجبات مستقبل الأجيوتستين 2 (مثل:  
فالسارتان، تيلميسارتان، إيريسارتان)،  
خاصة إذا كانت لديك مشاكل في الكليتين  
نتيجة للسكري.

- اليكسكيرين.
- يجب إبلاغ الطبيب المعالج عن استعمال هذا  
الدواء قبل الخضوع لعملية جراحية أو تخدير  
(مما يشمل إجراءات طب الأسنان)، علاج أي  
لظرد الكوليسترول من الدم (عصادة LDL)،  
علاج لتقليل رد الفعل التحسسي زرع (سم)  
المنترات (مثل التحل أو الزلياب).

- **الفاعلات بين الأدوية**  
إذا كنت تستعمل الآن، أو قد استعملت مؤخراً أدوية  
أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبيب وإضافات  
غذائية، فأخبر الطبيب أو الصيدلي بذلك. خاصة إذا  
كانت تستعمل:

- سيكلوسبورين (لتنشيط الجهاز المناعي)،  
أدوية مخصصة للبلع مضادة للظفرات (مثل  
كيتوكونازول وإينيكونازول)، أدوية مضادة  
للفيروسات (مثل ريتونايفير)، مضادات حيوية  
من فصيلة المكاربوليدات (مثل إيريثروميسين،  
تروليندوميسين). انظر البند 2 - "لا يجوز  
استعمال الدواء إذا".

- سيكينيدين (فقرحة المعدة بجرعة دوالية أو  
800 ملغ في اليوم).
- أدوية أخرى لخفض ضغط الدم، مثل: حاجبات  
مستقبل الأجيوتستين 2، مندرات البول أو  
اليكسكيرين؛ أدوية موسعة للأوعية الدموية (مثل  
نيتروجلوسيرين، أو النترات المضوية الأخرى،  
مواد التخدير العام والموضعي).

- ديوكسين (لعلاج القلب)، أدوية لتنظيم نظم القلب  
(مثل أمبودرون، كينيدين).
- أدوية مضادة للكتئاب (مثل مضادات الاكتئاب  
الثلاثية الحلقاء، الليثيوم)، أدوية مضادة للذهان.  
أدوية مضادة للتهاب ومسكنة للألم لاسترويدية  
(NSAIDs)، أدوية لتسكين الألم أو للآثاب  
المغفصل الروماتويدي بما في ذلك العلاج بالذهب.  
أدوية مضادة للصرع (مثل فينيتوين،  
كاربامازيبين)، ريفامبيسين (لعلاج السل).

- أدوية تحتوي على البوتاسيوم أو إضافات  
البوتاسيوم.
- أدوية مضادة للسعال والزكام، أدوية لخفض الوزن  
تحتوي على مركب حالك لودي.
- أدوية لعلاج السكري (أدوية لإعطاء عن طريق  
الفم، إينسولين).

- استيميزول أو تيريفينادين (دواء ان لعلاج  
الحساسية).
- ميثازولام (دواء لاضطرابات النوم).

- حياضات الليتا (أدوية لعلاج فرط ضغط الدم  
ومشاكل القلب).

- قد يضطر طبيبك إلى تغيير جرعتك الدوائية وأو  
أخذ تأديرات وقائية أخرى إذا كنت تستعمل حاجبات  
مستقبل الأجيوتستين 2 أو اليكسكيرين (انظر البند "لا  
يجوز استعمال الدواء إذا" والبنء "تحذيرات خاصة  
تتعلق باستعمال الدواء").

- لا يجوز تناول الدواء بالتزامن مع حبة جريفيروت  
أو مع عصير الجريفيروت.
- يجب تناول ليركانابرينل تيفاع قبل وجبة الطعام  
بـ 15 دقيقة على الأقل.

## استعمال الدواء واستهلاك الكحول

قد يزيد الكحول من تأثير ليركانابرينل تيفاع ذلك  
بوصي بعدم استهلاك الكحول أو بالحرص على تقييد  
استهلاك الكحول.

## الحمل والإرضاع

أخبري الطبيب إذا كنت تتلقين أنك حامل أو قد تصابين  
حاملًا. سيوصيك الطبيب عادة بالتوقف عن استعمال  
ليركانابرينل تيفاع قبل أن تحملي أو فور اكتشاف أنك  
حامل وستقدم لك المشورة باستعمال دواء آخر بدلاً  
من ليركانابرينل تيفاع.

لا يوصى باستعمال ليركانابرينل تيفاع خلال فترة  
الحمل ويمنع استعماله إذا كان هناك قلقاً (أكثر  
من 3 أشهر) لأنه قد يسبب ضرراً شديداً للجنين.

## الإرضاع

أخبري طبيبك إذا كنت مرضعاً أو على وشك البدء  
بالإرضاع. لا يوصى بإرضاع الأطفال الرضعة  
الحديثي الولادة (الإرضاع الأولي بعد الولادة) خاصة  
الذين خلال فترة بليركانابرينل تيفاع. إذا كان  
عمر الطفلة الرضيع أكبر من ذلك، فسيفدك لك طبيبك  
المعلومات بخصوص الأفضليات والصعوبات المتعلقة  
باستعمال ليركانابرينل تيفاع خلال فترة الإرضاع،  
بالمقارنة مع علاجات أخرى.

## السفافة واستعمال الماكينات

قد يسبب طبيبك إذا كنت مرضعاً أو الضعف، التعب أو  
الغفاس. إذا كنت تعاني من هذه الأعراض فامتنع عن  
قيادة السيارة، عن تشغيل الماكينات الخطرة أو عن  
أي نشاط يتطلب اليقظة.

## معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء

يحتوي هذا الدواء على أقل من 23 ملغ من سيكوديوم  
في القرص فلذلك يعتبر خالياً من سيكوديوم.

## 3. كيف تستعمل الدواء؟

يجب استعمال المستحضر دوماً وفق تعليمات الطبيب.  
عليك استشارة الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكن متأكدًا  
من الجرعة الدوائية ومن كيفية العلاج بالمستحضر.  
ليركانابرينل تيفاع غير مخصص لعلاج الأوالاد  
والمراهقين الذين سنهم دون الـ 18. الجرعة الدوائية  
وكيفية العلاج سيحددهما الطبيب فقط.

الجرعة الدوائية الاعيادية عادة هي قرص واحد في  
اليوم، في نفس الساعة.

## بمب تجاوب الجرعة الموصى بها.

يجب ابتلاع القرص كاملاً مع كأس ماء.  
يجب تناول ليركانابرينل تيفاع قبل وجبة الطعام بربع  
ساعة على الأقل، ويوصى بتداوله قبل وجبة الإفطار.  
لا يجوز شطر الأقراص، لا تتوفر معلومات عن  
الهرس/المضغ.

## ملفوق العلاج الذين لديهم مشاكل في الكلىة المسنؤن:

سيتم تحديد الجرعة الدوائية من قبل الطبيب وفقاً  
لوظيفة الكلىة لديك  
**الفحوص والمراقبة**

قد يفحص الطبيب وظائف الكلىة لديك، ضغط الدم  
وزمة الكهارل (مثل البوتاسيوم) في الدم وفارق  
الدمية ثابته.

إذا تمسبت تناول هذا الدواء في الوقت المطلوب  
فقط الجرعة التي سيبها وتناول الجرعة القادمة  
كالمعتاد. لا يجوز تناول جرعتين في نفس اليوم. قد  
لا تتناول خطراً جرعة دوائية أكبر من اللازم، فقد  
يطرأ انخفاض زائد على ضغط الدم وقد يصبح  
نبض القلب سريعاً أو غير منتظم. إذا تناولت جرعة  
مفرطة أو إذا قام ولدك بتناول الدواء خطأ، فتوجه فوراً  
إلى الطبيب أو إلى غرفة الطوارئ أو المستشفى  
واصلح بك عوة الدواء.

يجب المواظبة على العلاج حسب توصية الطبيب.  
حتى لو طرأ تحسن على حالتك الصحية، فلا يجوز  
التوقف عن العلاج بالدواء دون استشارة الطبيب.

لا يجوز تناول الأدوية في العتمة راجع الملصق  
وتأكد من الجرعة في كل مرة تتناول فيها الدواء.  
ضع النظارات الطبية إذا كنت تتناولها فيها.  
إذا توفرت لديك أسئلة إضافية حول استعمال الدواء،  
فاستشر الطبيب أو الصيدلي.

## 4. الأعراض الجانبية

مثل كل دواء، قد يؤدي استعمال ليركانابرينل تيفاع  
إلى نشوء أعراض جانبية قد بعض المستعملين.  
تعالني من أي واحد منها.

قد تكون بعض الأعراض الجانبية خطيرة.  
يجب التوجه إلى الطبيب فوراً عند ظهور رد فعل  
تحسسي مصحوب بانتفاخ الوجه، الشفويين، اللسان أو  
الحنجرة مما قد يسبب صعوبات في التنفس أو في البلع.  
عند البدء بالعلاج بليركانابرينل تيفاع قد تتعرض بالضعف  
أو بالدوار أو بتمشؤن الزوية. يحدث ذلك في أعقاب  
هبوط فجائي في ضغط دمك، في حالة كئيبة، يجب  
الاستلقاء. لا تكن لا تزال قلقاً، فأخبر طبيبك.

أعراض جانبية شائعة (أعراض تظهر عند 10-1  
مستعملين من بين 100):  
صداع، دوار، سعال.

**أعراض جانبية غير شائعة (أعراض تظهر عند 10-1 مستعملين من بين 1,000):** تغيرات في مقاييس الدم مثل انخفاض مستوى الصفائح، ارتفاع مستوى البوتاسيوم في الدم، صفة (طفح) شعور بالذراع الانتفاخ إلى وضعية الكوع، فيرنجيو (دوار)، نبض سريع أو غير منتظم (خفقان)، احمرار مفاصل الوجه، الرقبة أو الصدر (تورّد)، ضغط دم منخفض، ألم في البطن، إمساك، غثيان، مستويات مرتفعة لإنزيمات الكبد، احمرار الجلد، ألم في المفاصل، ارتفاع في وتيرة التبول، ضعف، تعب، شعور بالحُمى، انتفاخ الكاحل.

**أعراض جانبية نادرة (أعراض تظهر عند 10-1 مستعملين من بين 10,000):**

رد فعل تحسسي، طفح في الأذنين، آغماء، جفاف في الحنجرة، ألم في الحنجرة، صعوبات في الهضم، شعور بالملوحة في اللسان، إسهال، جفاف الفم، انتفاخ اللثة، رد فعل تحسسي مصحوب بانتفاخ الوجه، الشفتين، اللسان أو الحنجرة مع صعوبات في البلع أو في التنفس، طفح جلدي، شرى، الاستيقاظ ليلاً بهدف التبول، إنتاج كميات كبيرة من البول، الضعف الجنسي.

**أعراض جانبية أخرى ناعبة من استعمال إنابرايل أو ليركاتابريل كل على حدة:**

**أعراض جانبية شائعة جداً (أعراض تظهر عند أكثر من مستعمل واحد من بين عشرة):**

تثؤن الرئوية.

**أعراض جانبية شائعة (أعراض تظهر عند 10-1 مستعملين من بين 100):**

انتفاخ، ألم في الصدر، تغيرات في نظم القلب، ذبحة صدرية، ضيق التنفس، تغيرات في حاسة الذوق، ارتفاع في مستوى الكرياتينين في الدم (يمكن تشخيصه عادةً بواسطة الفحوص المخبرية).

**أعراض جانبية غير شائعة (أعراض تظهر عند 10-1 مستعملين من بين 1,000):** فقر الدم (يشمل فقر الدم الانحلالي) والاحلال، هبوط جلطاتي في ضغط الدم، ارتباك، قلة النوم أو الميل إلى النوم، الشعور بالوخز في الجلد أو اندام الشعور في الجلد، نوبة ليلية (تتبع على ما يبدو من ضغط دم منخفض جداً لدى متلقي العلاج المعرضين للخطر، بما في ذلك أولئك الذين يعانون من مشاكل في جريان الدم في القلب أو في الدماغ)، سكتة دماغية (على ما يبدو نتيجة لضغط دم منخفض جداً لدى متلقي العلاج المعرضين للخطر)، سيلان الأنف، ألم في الحنجرة وحمى، ربو، حركة بطيئة للغذاء في الأمعاء، التهاب البنكرياس، تقيؤ، تهيؤ في المعدة، فرح، قهيم، زبدان متعرق، حكة أو طفح جلدي، ساقط الشعر، خلل في وظيفة الكلى، قصور الكليتين، مستويات مرتفعة للبروتين في البول (يفسأ في الفحص)، تقلص في العضلات، شعور آغم شديد، حمى مرتفعة، مستويات منخفضة للسكر أو للفسفودوم في الدم، مستويات مرتفعة للورنيا في

الدم (تُقاس في فحوص الدم).

**أعراض جانبية نادرة (أعراض تظهر عند 10-1 مستعملين من بين 10,000):**

تغيرات في مقاييس الدم مثل الانخفاض في عدد خلايا الدم البيضاء، تنبيب النخاع العظمي، أمراض مناعية ذاتية، ألم عظمي أو مشاكل في النوم، ظاهرة رينو (برودة وشحوب في راحتي اليدين والقدمين نتيجة جريان دموي ضئيل)، رشاش في الرئتين، التهاب الأذن، التهاب الرئتين، مشاكل في الكبد مثل تدني وظيفة الكبد، التهاب الكبد، برقان (اصفرار الجلد والعينين) و مستويات مرتفعة للبيليروبين (يُقاس في فحوص الدم)، حماسي متعددة الأشكال (نقاط حمراء يشاكل مختلفة على الجلد)، متلازمة سيوفيتس-جوسون (حالة جلدية خطيرة مع احمرار وطفح الجلد، حويصلات أو جروح أو انفصال طبقة الجلد العلوية عن الطبقات السفلية)، تضاول إنتاج البول، تضخم الغدة الزهيمية لدى الرجال.

**أعراض جانبية نادرة جداً (أعراض تظهر عند أقل من مستعمل واحد من بين 10,000):**

انتفاخ الأمعاء ورممة وعائية في الأمعاء).

**أعراض جانبية نادرة (أعراض تظهر عند 10-1 مستعملين من بين 1,000):**

ذبحة صدرية (ألم في الصدر عقب نقص الدم في القلب)، تقيؤ، حرقة الفؤاد، الإم في العضلات.

**أعراض جانبية نادرة جداً (أعراض تظهر عند 10-1 مستعملين من بين 10,000):** ألم في الصدر.

قد يحدث لدى متلقي العلاج الذين يعانون من ذبحة صدرية قاتمة ازدياد في وتيرة النوبات، ومنها أو شبتها في أعقاب استعمال الأدوية التي ينتمي إليها ليركاتابريين. قد تحدث حالات معدودة من الوتة الطفلية.

**إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقم أحد الأعراض الجانبية، أو إذا كنت تعاني من عرض جانبي لم يذكر في النشرة، فليطلب استشارة الطبيب.**

**التبليغ عن الأعراض الجانبية**

بالإمكان التبليغ عن أعراض جانبية لوزارة الصحة بواسطة الضغط على الرابط "التبليغ عن أعراض جانبية عقب العلاج الدوائي" الموجود في الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة ([www.health.gov.il](http://www.health.gov.il)) والذي يوجه إلى الاستمارة المتصلة للتبليغ عن أعراض جانبية، أو عن طريق الدخول إلى الرابط: <https://sideeffects.health.gov.il>

**5. كيف يجب تخزين الدواء؟**

امنع التمسك! نأ الدواء، ولكن دواء آخر، يجب حفظه في مكان مغلق بعيداً عن متناول الأولاد وأولئك الأطفال الرضع ومجال زويتهم، وبذلك ستمنع التمسك أو تسبب التقيؤ بدون تعليمات صريحة من الطبيب. لا يجوز استعمال الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية (exp. Date) المدون على العبوة. يشير تاريخ

انتهاء الصلاحية إلى اليوم الأخير من نفس الشهر. يجب التخزين في درجة حرارة دون 25 درجة مئوية. لا يجوز تخزين أدوية مختلفة في نفس العبوة.

**6. معلومات إضافية**

**بالإضافة إلى المركبات الفعالة يحتوي ليركاتابريل تيغاف 10/20 على:**

Microcrystalline cellulose, Pregelatinised starch, Sodium starch glycolate (type A), Hypromellose, Sodium hydrogen carbonate, Anhydrous colloidal silica, Titanium dioxide (E171), Talc, Macrogol 6000, Magnesium stearate

**بالإضافة إلى المركبات الفعالة يحتوي ليركاتابريل تيغاف 10/20 على:**

Microcrystalline cellulose, Pregelatinised starch, Sodium starch glycolate (type A), Sodium hydrogen carbonate, Hypromellose, Anhydrous colloidal silica, Titanium dioxide (E171), Talc, Macrogol 6000, Magnesium stearate, Iron oxide yellow (E172)

**كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العبوة**

ليركتابريل تيغاف 10/20: أقراص مطبقة، دائرية، باللون الأبيض الضارب إلى اللبني، مطبقة من كلا الجانبين.

ليركتابريل تيغاف 10/20: أقراص مطبقة، دائرية، باللون الأصفر الفاتح الضارب إلى الصفرة، محذبة من كلا الجانبين.

الأقراص معبأة في شرائط حويصلات. أحجام العبوة: 7، 10، 14، 15، 28، 30 قرصاً. قد لا تتوافق جميع أحجام العبوة.

اسم صاحب الامتياز وعنوانه: أيبك للتسويق مرض. (من مجموعة تيغاف)

ص.ب. 8077، تانينا.

اسم المصنع وعنوانه:

تيغاف للصناعات الصيدلانية مرض.

ص.ب. 3190، بيتاح تيغاف.

تم تحرير النشرة في أيار/مايو 2020.

ورقة تسجيل الدواء في سجل الأدوية الرسمي في وزارة الصحة:

ليركتابريل تيغاف 10/20: 164.44.35533

ليركتابريل تيغاف 10/20: 164.45.35534

من أجل التبسيط وتسهيل القراءة، تمت صياغة هذه النشرة بصيغة المتكرر. على الرغم من ذلك، فإن الدواء مخصص لكلا الجنسين.