



אוקטובר 2020

רופא/ת, רוקחת/ת נכבד/ה

חברת טבע מודיעה על העדכוניים הבאים בעלון לצרכן של התכשיר

Metformin Teva Tablets

מטפורמין טبع TABLETS

Contains: Metformin Hydrochloride 850mg

שינויי התוויה, משטר מינון ועדכוניים בעלון לצרכן

התוויה כפי שאושרה בתעוזות הרישום:

התוויה המאושרת בישראל הורחבה, להכללת שימוש בילדים וمتבגרים מגיל 10 ומעלה.

Treatment of type 2 diabetes mellitus, particularly in overweight patients, when dietary management and exercise alone does not result in adequate glycaemic control.

- In adults, Metformin Teva may be used as monotherapy or in combination with other oral antidiabetic agents or with insulin.
- In children from 10 years of age and adolescents, Metformin Teva may be used as monotherapy or in combination with insulin.

A reduction of diabetic complications has been shown in overweight type 2 diabetic adult patients treated with metformin as first-line therapy after diet failure

ברצוננו להודיע שהעלון לצרכן עודכן, בפירוט שלහלו כלולים העדכוניים העיקריים בלבד (תוספות מסומנות באדום):

1. למה מיועדת התרופה?

- התרופה מיועדת לטיפול בסוכרת מסוג 2, במיוחד במקרים עם משקל עזף, כשיוני בתזונה והתعاملות לבדם אינם מספיקים לייצוב רמות הגלוקוז בדם.
- **במبالغים מטפורמין טبع מתוודה לטיפול יחיד או בשילוב עם תרופות פומיות אחרות לטיפול בסוכרת או עם אינסולין.**
 - **בילדים מגיל 10 ובמתבגרים, מטפורמין טبع מתוודה לטיפול יחיד או בשילוב עם אינסולין.**

2. לפני השימוש בתרופה

אין להשתמש בתרופה אם:

[...]

הנр סובל מזמן ציהום כגן ציהום המשפייע על הריאות/**מערכת הנשימה**/כליות. ציהום חמור עלול לגרום לביעות כלירות, אשר יכולות להוביל להתקפות חמצת לקטית (ראה סעיף "ażhorot myichdot haenguvot beishimosh batrufah").

ażhorot myichdot haenguvot beishimosh batrufah:

סיכון לחמצת לקטית

מטפורמין טبع עלול לגרום לתופעת לוואי נדירה מאוד אף גם חמורה מאוד, הנקראת חמצת לקטית, במיעוד אם הכליות שלך אין מתפקדות כראוי. הסיכון לפתח חמצת לקטית עולה גם במצבים הבאים: כאשר הסוכרת אינה מוזנת, **ziehomin chmorim**, צום ממושך, צריכת אלכוהול ממושכת, בעת התיבשות (ראה פירוט מטה), בעיות בכבד ובכל מצב רפואי בו יש רידזה באספект החמצן לאיברי הגוף (כגון מחלת לב חריפה וחמרה). אם אחד מהמצבים מעלה חלים עלייך, היועץ ברופא להנחיות נוספות. במהלך הטיפול במטפורמין טבע הרופא יבדק את תפקוד הכליות שלך לפחות פעמיים בשבוע או בתדירות גבוהה יותר אם אתה **קשיש** או אם יש הרעה בתפקוד הכליות שלך. **היועץ ברופא אם הינך סובל מליקוי בתפקוד הכליות.**

ילדים ומתבגרים

נתונים מוגבלים לגבי ילדים ומתבגרים הראו כי תופעות הלוואי היו דומות בסוגן ובחווארן לאלו המדווחות במבוגרים.

בדיקות ומעקב

- במהלך הטיפול, הרופא שלך יבצע בדיקות סדריות למדידת גליקוז בدم ויתאים את המינון של מטפורמין טبع לרמות האלקוז בدمך. יש להיות בקשר רציף עם הרופא. **ניתור זה חשוב במיוחד במקרה של טיפול ילדים ומתבגרים או בקשישים.**
- בתקופת הטיפול במטפורמין טבע הרופא יערוך בדיקות לתפקוד הכליות לפחות פעמיים בשבוע. **בקשישים** או **באנשים הסובלים מירידה בתפקוד הכליתי**, ישחק ששהיה צורך לעורר בדיקה בתדירות גבוהה יותר.

תגובהות בין תרופתיות

אם אתה לוקח או אם **לקחת לאחרונה**, תרופות אחרות כולן תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר עליך לרופא או לרוקח. ישן ותזדקק לניטור תכוף יותר של רמות האלקוז בדם ותפקוד הכליות, או שיתכן והרופא ייתאים עבורך את מינון מטפורמין טبع, במיוחד אם אתה לוקח:

- תרופות שמגדילות את כמות השתן (משתנים).
- תרופות לטיפול בכאב ודלקת (NSAID ומעכבי COX-2, כמו איבופרופן וסלוקוקסיב).
- תרופות מסויימות לטיפול ביתר לחץ דם (מעכבי ACE, **וווסמי הרצפטור לאנג'יאוטנסין II**).
- אגוניסטים לרצפטור בטא-2 כגון סאלבוטאמול או טריבורטאלין (לטיפול באסתמה).
- קוורטיקו-וטראדיים (לטיפול במצבים שונים, כגון טיפול בדלקת עור חמורה או באסתמה).

- תרופות העולות להשפע על רמות מטפורמין טבעי בدمך, במיוחד במקרה של תפקוד כליתי ירוד (כגון וראפאAMIL, ריפאמיצין, סימטידין, דולוטגראבר, רנוולזין, טרימטופרים, ננדטיניב, איסבוקונזול, קורזוטיניב, אלופרב).
- תרופות אחרות לטיפול בסוכרת. נטילת מטפורמין טבעי במקביל לתרופות אחרות לטיפול בסוכרת עלול להעלות את הסיכון להיפוגליקמיה.

הriterion והנקה
במהלך ההירון יתכן שתזדקקי לאינסולין כדי לטפל בסוכרת שלך

3. כיצד תשתמש בתרופה?

ילדים מגיל 10 ומעלה ומتابגרים:

המינון ההתחלתי הוא בדרך כלל 500 מ"ג או 850 מ"ג (טבליה אחת) פעם ביום. המינון היומי המקסימלי הינו 2000 מ"ג ביום מחולק ל-2 או 3 מנות. הטיפול בילדים בגילאי 10-12 שנים מומלץ רק אם ניתנה הנחיה מפורשת מהרופא כיון שהניסיונות בקבוצת גיל זו מוגבל.

מבוגרים:

המינון ההתחלתי המetable נормלי בדרך כלל הינו 500 מ"ג או 850 מ"ג (טבליה אחת) 2-3 פעמיים ביום. המינון היומי המקסימלי הינו 2550 מ"ג ביום, מחולק ל- 3 מנות.

אם הנך סובל מליקוי בתפקוד הכליתי, יתכן והרופא ירשום לך מינון נמוך יותר.
אם הנך מטופל גם באינסולין, הרופא ינחה אותך כיצד להתחיל טיפול במטפורמין טבעי.

אין לחצות את הטבליה של מטפורמין טבעי 850 מ"ג. כאשר נדרש מינון של 500 מ"ג, יש לשתמש בתרופה המכילה מטפורמין 850 מ"ג שניית לחצotta (לקבלת מינון של 425 מ"ג), ואשר יכולה להיות חילופה לטבליה המכילה 500 מ"ג.

העלון לצרכן נשלח לפרסום במאגר התרופות שבאתר האינטראנט של משרד הבריאות

.וניתן לקבללו מודפס ע"י פניה לחברת טבעי. <http://www.health.gov.il>