

אוקרים

רח' אצ"ל 57, רמת גן, ישראל

אוקטובר 2020

רופא/ה, רוקח/ת נכבד/ה,

הנדון: עדכון עלון לצרכן של התכשיר:

קריפלוקס 10% תמיסה וטרינרית Kariflox 10% oral solution veterinary

מרכיב פעיל:

Enrofloxacin 100mg/ml

Per os in drinking water

צורת מינון:

התוויה מאושרת:

Treatment of infections caused by the following bacteria susceptible to enrofloxacin:

Chickens	Turkey
<i>Mycoplasma gallisepticum</i> , <i>Mycoplasma synoviae</i> , <i>Avibacterium paragallinarum</i> , <i>Pasteurella multocida</i> , <i>E.coli</i>	<i>Mycoplasma gallisepticum</i> , <i>Mycoplasma synoviae</i> , <i>Pasteurella multocida</i>

Enrofloxacin should be used only after sensitivity of the bacteria has been confirmed and there is no alternative therapy (due to resistance to other antibiotics).

חברת צמל ביו-פארמה בע"מ מבקשת להודיעכם על העדכונים הבאים בעלון לרופא של התכשיר. בהודעה זו מצוינים השינויים המהווים החמרה או חידוש בלבד, והן מודגשות בצהוב. הסרת מידע משמעותי מודגש בצבע אפור עם קו חוצה.

3. למה התרופה מיועדת ?

לטיפול בזיהומים הרגישים לאנרופלוקסצין בתרנגולות פטם והודיים.

<u>בהודיים:</u>	<u>בתרנגולות:</u>
<i>Mycoplasma gallisepticum</i> , <i>Mycoplasma synoviae</i> , <i>Pasteurella multocida</i>	<i>Mycoplasma gallisepticum</i> , <i>Mycoplasma synoviae</i> , <i>Avibacterium paragallinarum</i> , <i>Pasteurella multocida</i> , <i>E.coli</i>

יש לתת את התכשיר רק לאחר שהוכחה רגישות החיידק ונמצא כי אין אלטרנטיבה טיפולית (הוכחה עמידות לתכשירים אחרים).

6. חיות מטרה

תרנגולות לפיטום והודיים

9. זמן המתנה

זמן המתנה לשחיטה: 7 ימים לתרנגולות פטם ו-13 יום להודיים.
לא לשימוש במטילות ביצים לצריכה.

10. אזהרות

אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בחיית מטרה:

טיפול בזיהומי מיקופלסמה עלול לא למגר את החיידק.

אזהרות מיוחדות הנוגעות לבטיחות האדם המטפל בתכשיר:

אנשים בעלי רגישות ידועה לפלורוקינולונים או לאחד ממרכיבי התכשיר צריכים להמנע ממגע עם התכשיר. יש להימנע ממגע עם העור והעיניים.

יש להשתמש בכפפות ולהימנע ממגע עם התכשיר בזמן הכנסתו למי השתייה. במקרה של מגע יש לשטוף מיידית בכמות גדולה של מים. אם תופעות כמו רגישות בעור מופיעות אחרי חשיפה לתכשיר, יש לקבל ייעוץ רפואי ולהראות את עלון התכשיר לרופא המטפל. נפיחות בפנים, בשפתיים או בעיניים כמו גם קשיי נשימה הן תופעות חמורות המחייבות טיפול רפואי מיידי. אין לעשן, לאכול או לשתות בזמן השימוש בתכשיר.

...

מינון יתר: מינון יתר יכול לגרום לשלשולים. בתצרוכת ממושכת של מי שתייה עם התכשיר כגון בימים חמים, עלולה לגרום לנזק בסחוס.

חוסר התאמה: בהעדר מחקרים לגבי התאמה אין לערבב תכשיר זה עם תכשירים וטרינריים אחרים.

העלון המאושר נשלח לפרסום במאגר התרופות שבאתר משרד הבריאות וניתן לקבלו מודפס על ידי פנייה לבעל הרישום.

בברכה,

איציק פרפל

רוקח ממונה, אודים