

עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים (תכשירים) התשמ"ו - 1986
התרופה משווקת על פי מרשם רופא בלבד

ארקו-טבע 120 מ"ג טבליות מצופות	ארקו-טבע 90 מ"ג טבליות מצופות	ארקו-טבע 60 מ"ג טבליות מצופות	ארקו-טבע 30 מ"ג טבליות מצופות
אטוריקוקסיב 120 מ"ג Etoricoxib 120 mg	אטוריקוקסיב 90 מ"ג Etoricoxib 90 mg	אטוריקוקסיב 60 מ"ג Etoricoxib 60 mg	אטוריקוקסיב 30 מ"ג Etoricoxib 30 mg

הרכב

כל טבליה מצופה מכילה:

אטוריקוקסיב 120 מ"ג Etoricoxib 120 mg	אטוריקוקסיב 90 מ"ג Etoricoxib 90 mg	אטוריקוקסיב 60 מ"ג Etoricoxib 60 mg	אטוריקוקסיב 30 מ"ג Etoricoxib 30 mg
--	--	--	--

למידע על מרכיבים בלתי פעילים ראה סעיף 6 - "מידע נוסף".

קרא בעיון עלון זה עד סופו בטרם תשתמש בתרופה.

- עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח.
- תרופה זו נרשמה לטיפול עבורך. אל תעביר אותה לאחרים. היא עלולה להזיק להם אפילו אם נראה לך כי מצבם הרפואי דומה.
- התרופה אינה מיועדת לילדים ומתבגרים מתחת לגיל 16 שנים.

1. למה מיועדת התרופה?

ארקו-טבע 30 מ"ג עוזרת להוריד את הכאב והנפיחות (דלקת) במפרקים ובשרירים של אנשים הסובלים מדלקת מפרקים ניוונית (אוסטיאוארטריטיס).

ארקו-טבע 60 מ"ג עוזרת להוריד את הכאב והנפיחות (דלקת) במפרקים ובשרירים של אנשים הסובלים מדלקת מפרקים ניוונית (אוסטיאוארטריטיס), דלקת מפרקים שגרונת (ראומטואיד ארטריטיס) ודלקת חוליות מקשחת (ankylosing spondylitis).

ארקו-טבע 90 מ"ג עוזרת להוריד את הכאב והנפיחות (דלקת) במפרקים ובשרירים של אנשים הסובלים מדלקת מפרקים שגרונת (ראומטואיד ארטריטיס) ודלקת חוליות מקשחת (ankylosing spondylitis). **ארקו-טבע 90 מ"ג** משמשת גם לטיפול קצר-טווח בכאב בינוני לאחר ניתוח דנטלי.

ארקו-טבע 120 מ"ג עוזרת להוריד את הכאב והנפיחות (דלקת) במפרקים ובשרירים של אנשים הסובלים משיגדון (גאוט).

קבוצה תרפויטית: ארקו-טבע הינה תרופה מקבוצת תרופות הנקראת מעכבי COX-2 סלקטיביים. אלו משתייכים לקבוצת תרופות הנקראת נוגדי דלקת שאינם סטרואידים (NSAIDs).

מהי דלקת מפרקים ניוונית (אוסטיאוארטריטיס)?

דלקת מפרקים ניוונית הינה מחלה של המפרקים. היא נגרמת כתוצאה מפירוק הדרגתי של סחוס אשר מרפד את קצות העצמות. הדבר גורם לנפיחות (דלקת), כאב, רגישות, קשיון ומוגבלות.

מהי דלקת מפרקים שגרונת (ראומטואיד ארטריטיס)?

דלקת מפרקים שגרונת הינה מחלה דלקתית ארוכת טווח של המפרקים. היא גורמת לכאב, קשיון, נפיחות ואבדן מתגבר של תנועה במפרקים עליהם היא משפיעה. היא עשויה לגרום גם לדלקת באיזורים אחרים של הגוף.

מהו שיגדון (גאוט)?

שיגדון הינה מחלה של התקפים פתאומיים וחוזרים של דלקת מכאיבה מאוד ואודם של המפרקים. היא נגרמת על ידי משקעים של גבישים מינרליים במפרקים.

מהי דלקת חוליות מקשחת (ankylosing spondylitis)?

דלקת חוליות מקשחת הינה מחלה דלקתית של עמוד השדרה ומפרקים גדולים.

2. לפני השימוש בתרופה

אין להשתמש בתרופה אם:

- הינך אלרגי (רגיש) ל-אטוריקוקסיב או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה (מפורטים בסעיף 6- "מידע נוסף")
- הינך אלרגי לתרופות נוגדות דלקת שאינן סטרואידיות (NSAIDs), כולל אספירין ומעכבי COX-2 (ראה סעיף 4- "תופעות לוואי")
- יש לך כיב פעיל בקיבה או דימום בקיבה או במעי
- יש לך מחלת כבד חמורה
- יש לך מחלת כליות חמורה
- הינך בהיריון או עשויה להיות בהיריון או הינך מניקה (ראי "היריון, הנקה, ופוריות")
- הינך מתחת לגיל 16 שנים
- יש לך מחלת מעיים דלקתית, כגון מחלת קרוהן, דלקת כיבית של המעי הגס או דלקת של המעי הגס
- יש לך לחץ-דם גבוה שאינו נשלט על ידי טיפול (בדוק עם הרופא שלך או אחות אם אינך בטוח האם לחץ הדם שלך נשלט היטב)
- אתה סובל מבעיות בלב כולל אי-ספיקת לב (בינונית או חמורה), אנגינה (כאב חזה)
- אתה סובל ממחלת לב איסכמית, היה לך התקף לב או ניתוח מעקפים או מחלת כלי דם היקפית (זרימת דם ירודה ברגליים או בכפות הרגליים עקב היצרות או חסימת כלי דם)
- היה לך כל סוג שהוא של שבץ (כולל מיני-שבץ, התקף איסכמי חולף או TIA). אטוריקוקסיב עלול להגביר מעט את הסיכון להתקף לב ולשבץ ולכן אין ליטול אותו בחולים שהיו להם בעבר בעיות לבביות או שבץ.

אם אתה חושב כי אחד מאלו נוגע אליך, אל תיטול את הטבליות עד שתתייעץ עם הרופא שלך.

אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה

לפני הטיפול בארקו-טבע ספר לרופא אם:

- יש לך היסטוריה של דימום בקיבה או של כיבים.
- אתה סובל מהתייבשות, לדוגמה בעקבות התקף ארוך של הקאה או שלשול.
- יש לך נפיחות עקב אגירת נוזלים.
- יש לך היסטוריה של אי-ספיקת לב או כל מחלת לב אחרת.
- יש לך היסטוריה של לחץ-דם גבוה. **ארקו-טבע** יכולה להעלות לחץ-דם באנשים מסוימים, במיוחד במינונים גבוהים, והרופא שלך ירצה לבדוק את לחץ הדם שלך מדי פעם.
- יש לך היסטוריה של מחלת כבד או כליות.
- הינך מקבל טיפול לזיהום. **ארקו-טבע** עלולה להסוות או להסתיר חום אשר הינו סימן של זיהום.
- יש לך סוכרת, כולסטרול גבוה או אם הינך מעשן. גורמים אלה יכולים להגדיל את הסיכון שלך למחלת לב.
- הינך אישה המנסה להרות.
- הינך מעל גיל 65 שנים.

אם אינך בטוח אם אחד הסעיפים הרשומים מעלה חל עליך, **דבר עם הרופא שלך לפני נטילת ארקו-טבע** בכדי לברר אם תכשיר זה מתאים לך.

ארקו-טבע עובדת היטב במידה שווה בחולים בוגרים צעירים ובחולים מבוגרים יותר. אם הינך מעל גיל 65 שנים, הרופא שלך ירצה להשגיח עליך כראוי. אין צורך בהתאמת מינון בחולים מעל גיל 65 שנים.

ילדים ומתבגרים

אין לתת תרופה זו לילדים ומתבגרים מתחת לגיל 16 שנים.

תגובות בין תרופתיות

אם אתה לוקח, או אם לקחת לאחרונה, תרופות אחרות, כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח.

בפרט, אם הינך נוטל אחת מהתרופות הבאות, הרופא שלך ירצה לעקוב אחרך על מנת לבדוק כי התרופות שלך פועלות כראוי, לאחר תחילת הטיפול בארקו-טבע:

- תרופות אשר מדללות את הדם (נוגדי קרישה) כמו וארפרין
- ריפאמפיצין (אנטיביוטיקה)
- מטוטרקסאט (תרופה המשמשת לדיכוי מערכת החיסון, ולעיתים קרובות משמשת לטיפול בדלקת מפרקים שגרונתית (ראומטואיד ארטריטיס))
- ציקלוספורין או טקרולימוס (תרופות לדיכוי מערכת החיסון)
- ליתיום (תרופה לטיפול בסוגים שונים של דיכאון)
- תכשירים המיועדים לטיפול בלחץ-דם גבוה ובאי-ספיקת לב, הנקראים מעכבי ACE וחוסמי הרצפטור לאנגיוטנסין, לדוגמה אנלפריל, רמיפריל, לוסרטן ו-וואלסרטן
- משתנים
- דיגוקסין (תרופה לאי-ספיקת לב וקצב לב לא סדיר)
- מינוקסידיל (תרופה לטיפול ביתר לחץ-דם)
- סאלבוטאמול טבליות או תמיסה למתן דרך הפה (תרופה לאסתמה)

- גלולות למניעת היריון (השילוב עלול להגדיל את הסיכון שלך לתופעות לוואי)
- טיפול הורמונלי חלופי (השילוב עלול להגדיל את הסיכון שלך לתופעות לוואי)
- אספירין, הסיכון לכיבים בקיבה גדול יותר אם אתה נוטל **ארקו-טבע** עם אספירין.
- אספירין למניעת התקפי לב או שבץ:
- ניתן ליטול **ארקו-טבע** עם **מינונים נמוכים** של אספירין. אם הינך נוטל כעת מינון נמוך של אספירין כדי למנוע התקפי לב או שבץ, אין להפסיק ליטול אספירין ללא התייעצות עם הרופא שלך.
- אספירין ותרופות נוגדות דלקת שאינן סטרואידיות אחרות (NSAIDs):
- אין ליטול אספירין **במינון גבוה** או תרופות אנטי-דלקתיות אחרות בזמן נטילת **ארקו-טבע**.

שימוש בתרופה ומזון

ניתן ליטול טבליות **ארקו-טבע** עם או בלי האוכל. תחילת ההשפעה של **ארקו-טבע** עשויה להיות מהירה יותר כאשר היא ניטלת ללא אוכל.

היריון, הנקה ופוריות

אין ליטול טבליות **ארקו-טבע** במהלך ההיריון. אם הינך בהיריון או חושבת כי את עשויה להיות בהיריון, או אם הינך מתכננת להיכנס להיריון, אין ליטול את הטבליות. אם נכנסת להיריון, הפסיקי לקחת אותן והתייעצי עם הרופא שלך. התייעצי עם הרופא במידה ואינך בטוחה או זקוקה לעצה נוספת.

הנקה

לא ידוע אם **ארקו-טבע** מופרשת בחלב אם. אם הינך מניקה, או מתכננת להניק, התייעצי עם הרופא שלך לפני נטילת **ארקו-טבע**. אם הינך נוטלת **ארקו-טבע**, אין להניק.

פוריות

ארקו-טבע אינה מומלצת בנשים המנסות להרות.

נהיגה ושימוש במכונות

סחרחורת וישנוניות דווחו בחלק מהחולים שנטלו **ארקו-טבע**. אל תנהג אם אתה מרגיש סחרחורת או ישנוניות. אל תשתמש בכלים כלשהם או מכונות אם אתה מרגיש סחרחורת או ישנוניות.

3. כיצד תשתמש בתרופה?

יש להשתמש בתכשיר תמיד בהתאם להוראות הרופא. עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אינך בטוח בנוגע למינון ואופן הטיפול בתכשיר.

המינון ואופן הטיפול ייקבעו על ידי הרופא בלבד.

אין ליטול יותר מהמנה המומלצת למצבך. הרופא שלך ירצה לדון בטיפול שלך מדי כמה זמן. חשוב כי תשתמש במנה הקטנה ביותר אשר שולטת בכאב שלך ולא תיטול **ארקו-טבע** לזמן ארוך יותר מהדרוש. זאת מכיוון שהסיכון להתקפי לב ולאירועים מוחיים עשוי לעלות לאחר טיפול ממושך, במיוחד במינונים גבוהים.

קיימים חוזקים שונים לתכשיר זה והרופא שלך ירשום את החוזק המתאים עבורך בהתאם למחלתך.

המינון המומלץ בדרך כלל הינו:

דלקת מפרקים ניוונית (אוסטיאוארטריטיס)

המינון המומלץ הוא 30 מ"ג פעם ביום, עם הגדלה מירבית ל- 60 מ"ג פעם ביום, במקרה הצורך.

דלקת מפרקים שגרונת (ראומטואיד ארטריטיס)

המינון המומלץ הוא 60 מ"ג פעם ביום, עם הגדלה מירבית ל- 90 מ"ג פעם ביום במידת הצורך.

דלקת חוליות מקשחת

המינון המומלץ הוא 60 מ"ג פעם ביום, עם הגדלה מירבית ל- 90 מ"ג פעם ביום במידת הצורך.

למצבי שיגדון ארטריטי חריף ולכאב לאחר ניתוח דנטלי, יש להשתמש באטוריקוקסיב רק לתקופת הכאב הסימפטומטי.

שיגדון (גאט)

המינון המומלץ הוא 120 מ"ג פעם ביום, שבו יש להשתמש רק בשלב האקוטי של הכאב, מוגבל למקסימום 8 ימי טיפול.

כאב לאחר ניתוח דנטלי

המינון המומלץ הוא 90 מ"ג פעם ביום, מוגבל למקסימום 3 ימי טיפול.

מטופלים עם בעיות כבד

- אם יש לך מחלת כבד קלה, אין ליטול יותר מ- 60 מ"ג פעם ביום.
- אם יש לך מחלת כבד **מתונה**, אין ליטול יותר מ- 30 מ"ג פעם ביום.

אין לעבור על המנה המומלצת.

שימוש בילדים ומתבגרים

אין לתת ארקו-טבע לילדים ומתבגרים מתחת לגיל 16 שנים.

קשישים

אין צורך בהתאמת מינון במטופלים קשישים. כמו עם תרופות אחרות, יש לנקוט זהירות עם מטופלים קשישים.

אופן המתן

ארקו-טבע מיועדת למתן דרך הפה. יש ליטול את הטבליות פעם ביום. ניתן ליטול **ארקו-טבע** עם או בלי אוכל. יש לבלוע את התרופה עם כמות קטנה של מים.

אין מידע לגבי כתישה/חציה/לעיסה של הטבליות.

אם נטלת בטעות מינון גבוה יותר

לעולם אין ליטול יותר טבליות ממה שהרופא המליץ. אם נטלת יותר מדי טבליות **ארקו-טבע**, עליך לגשת לקבלת טיפול רפואי מיידי.

אם נטלת מנת יתר או אם בטעות בלע ילד מן התרופה, יש לפנות מיידי לחדר מיון של בית חולים ולהביא אריזת התרופה איתך.

אם שכחת ליטול את התרופה

חשוב ליטול **ארקו-טבע** כפי שרשם הרופא שלך. **אם החמצת נטילת מנה**, יש ליטול את הטבליה הבאה בזמנה הרגיל, ביום שלמחרת. אין לקחת מנה כפולה כדי לפצות על המנה שנשכחה.

יש להתמיד בטיפול כפי שהומלץ על-ידי הרופא. גם אם חל שיפור במצב בריאותך, אין להפסיק הטיפול בתרופה ללא התייעצות עם הרופא.

אין ליטול תרופות בחושך! בדוק התווית והמנה בכל פעם שהינך נוטל תרופה. הרכב משקפיים אם הינך זקוק להם. אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היוועץ ברופא או ברוקח.

4. תופעות לוואי

כמו בכל תרופה, השימוש בארקו-טבע עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשימת תופעות הלוואי, ייתכן ולא תסבול מאף אחת מהן.

אם הינך מפתח כל אחד מהסימנים הבאים, עליך להפסיק את הטיפול בארקו-טבע ולפנות לרופא מיידי (ראה סעיף 2-**"לפני השימוש בתרופה"**):

- קוצר נשימה, כאבים בחזה ונפיחות בקרסוליים שמופיעים או מחמירים
- הצהבה של העור והעיניים (צהבת) - אלו הם סימנים לבעיות בכבד
- כאב בטן חמור או מתמשך או צואה שחורה
- תגובה אלרגית - שיכולה לכלול תגובות עוריות כגון כיבים או שלפוחיות, או התנפחות של הפנים, השפתיים, הלשון או הגרון העלולים לגרום קשיי נשימה

תופעות הלוואי הבאות עלולות להתרחש במהלך הטיפול בארקו-טבע:

תופעות לוואי שכיחות מאוד (משפיעות על יותר ממשתמש אחד מתוך 10)

- כאב בטן

תופעות לוואי שכיחות (משפיעות על 1 עד 10 משתמשים מתוך 100)

- מכתשית יבשה (דלקת וכאב לאחר עקירת שן);
- התנפחות של הרגליים ו/או כפות הרגליים עקב אצירת נוזלים (בצקת);
- סחרחורת, כאב ראש;
- פלפיטציות (דפיקות לב מהירות או לא סדירות), קצב לב לא סדיר (אריתמיה);
- עלייה בלחץ הדם
- צפצופים או קוצר נשימה (עווית סימפונות);
- עצירות, גזים (עודף גזים), דלקת קיבה (דלקת של רירית הקיבה), צרבת, שלשול, קשיי עיכול (דיספפסיה)/אי-נוחות בטנית, בחילה, הקאה, דלקת של הוושט, כיבים בפה;
- שינויים בבדיקות דם הקשורות לכבד;
- חבורות;
- חולשה ועייפות, מחלה דמוית שפעת

תופעות לוואי לא-שכיחות (משפיעות על 1 עד 10 משתמשים מתוך 1,000)

- דלקת הקיבה והמעיים (דלקת של מערכת העיכול המערבת הן את הקיבה והן את המעי הדק/שפעת הבטן), דלקת של דרכי הנשימה העליונות, דלקת בדרכי השתן;
- שינויים בערכים של בדיקות מעבדה (ירידה במספר תאי הדם האדומים, ירידה במספר תאי הדם הלבנים, ירידה בטסיות);
- רגישות יתר (תגובה אלרגית הכוללת סרפדת אשר עשויה להיות חמורה באופן שידרוש טיפול רפואי מיידי);
- עלייה או ירידה בתיאבון, עלייה במשקל;
- חרדה, דיכאון, ירידה בחדות החושים;
- ראייה, הרגשה או שמיעה של דברים שאינם קיימים (הזיות);
- שינויים בטעם, אי-יכולת לישון, חוסר תחושה או עקצוץ, ישנוניות
- טשטוש ראייה, גירוי בעין ואדמומיות;
- צלצולים באוזניים, ורטיגו (תחושה של סחרור בזמן עמידה במקום);
- קצב לב לא סדיר (פרפור פרוזדורים), קצב לב מהיר, אי-ספיקת לב, הרגשה של התהדקות, לחץ או כבדות בחזה (אנגינה פקטוריס), התקף לב;
- הסמקה, שבץ, מיני-שבץ (התקף איסכמי חולף), עלייה חמורה בלחץ הדם, דלקת של כלי הדם;
- שיעול, קוצר נשימה, דימום מהאף;
- נפיחות בקיבה או במעי, שינויים בדפוס עשיית הצרכים, יובש בפה, כיב קיבה, דלקת של רירית הקיבה העלולה להיות חמורה ולהוביל לדימום, תסמונת המעי הרגיז, דלקת של הבלב;
- התנפחות של הפנים, פריחה בעור או גרד בעור, אדמומיות של העור;
- התכווצות/עווית שרירים, כאב/נוקשות שרירים;
- רמות גבוהות של אשלגן בדם שלך, שינויים בבדיקות דם או שתן הקשורות לכליות שלך, בעיות חמורות בכליות;
- כאב בחזה

תופעות לוואי נדירות (משפיעות על 1 עד 10 משתמשים מתוך 10,000):

- אנגיואדמה (תגובה אלרגית המלווה בהתנפחות של הפנים, השפתיים, הלשון ו/או הגרון אשר עלולה לגרום לקושי בנשימה או בבליעה, ועשויה להיות חמורה באופן שידרוש טיפול רפואי מיידי)/תגובות אנאפילקטיות הכוללות שוק (תגובה אלרגית חמורה הדורשת טיפול רפואי מיידי);
- בלבול, חוסר מנוחה;
- בעיות בכבד (דלקת כבד);
- רמות נמוכות של נתרן בדם;
- אי-ספיקת כבד, הצהבה של העור ו/או העיניים (צהבת);
- תגובות עוריות חמורות

אם הופיעה תופעת לוואי, אם אחת מתופעות הלוואי מחמירה, או כאשר אתה סובל מתופעת לוואי שלא צוינה בעלון, עליך להתייעץ עם הרופא.

דיווח על תופעות לוואי

ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי עקב טיפול תרופתי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות (www.health.gov.il) המפנה לטופס המקוון לדיווח על תופעות לוואי, או על-ידי כניסה לקישור:

<https://sideeffects.health.gov.il>

5. כיצד לאחסן את התרופה?

מנע הרעלה! תרופה זו, וכל תרופה אחרת, יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם וטווח ראייתם של ילדים ו/או תינוקות, ועל-ידי כך תמנע הרעלה. אל תגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא. אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (exp. date) המופיע על גבי האריזה. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו החודש.

יש לאחסן מתחת ל-25°C.

יש לאחסן באריזה המקורית על מנת להגן מאור.

אין להשליך תרופות לביוב או לפח אשפה ביתי. שאל את הרוקח איך להשליך תרופות שאינן בשימוש עוד. אמצעים אלו יסייעו להגן על הסביבה.

6. מידע נוסף

נוסף על המרכיב הפעיל התרופה מכילה גם:
ליבה:

Calcium hydrogen phosphate (anhydrous), Microcrystalline cellulose, Crospovidone (Type A), Povidone (K25), Magnesium stearate.

ציפוי הטבליה:

ארקו-טבע 30 מ"ג

,Hypromellose Titanium dioxide ,Talc ,Hydroxypropylcellulose ,medium chain Triglycerides, Microcrystalline cellulose, Indigo Carmine (Blue 2) Al-lake(E132), Iron oxide red (E172)

ארקו-טבע 60 מ"ג

Hypromellose, Titanium dioxide, Talc, Hydroxypropylcellulose, medium chain Triglycerides, Iron oxide yellow (E172), Indigo Carmine (Blue 2) Al-lake(E132), Brilliant blue (Blue 1) Al-lake(E133), Iron oxide black (E172)

ארקו-טבע 90 מ"ג

Hypromellose, Titanium dioxide, Talc, Hydroxypropylcellulose, medium chain Triglycerides.

ארקו-טבע 120 מ"ג

Hypromellose, Titanium dioxide, Talc, Hydroxypropylcellulose, medium chain Triglycerides, Iron oxide yellow (E172), Indigo Carmine (Blue 2) Al-lake(E132), Iron oxide black (E172), Brilliant blue (Blue 1) Al-lake(E133)

כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה

ארקו-טבע טבליות מצופות זמינות בארבעה חוזקים:

ארקו-טבע 30 מ"ג טבליות מצופות עגולות, קמורות משני הצדדים, בצבע כחול, בצדה האחד של הטבליה מוטבע "30" וצדה השני חלק

ארקו-טבע 60 מ"ג טבליות מצופות עגולות, קמורות משני הצדדים, בצבע ירוק כהה, בצדה האחד של הטבליה מוטבע "60" וצדה השני חלק

ארקו-טבע 90 מ"ג טבליות מצופות עגולות, קמורות משני הצדדים, בצבע לבן, בצדה האחד של הטבליה מוטבע "90" וצדה השני חלק

ארקו-טבע 120 מ"ג טבליות מצופות עגולות, קמורות משני הצדדים, בצבע ירוק בהיר, בצדה האחד של הטבליה מוטבע "120" וצדה השני חלק

גודל אריזות:

ארקו-טבע 30 מ"ג: אריזות בגודל 7, 10, 14, 28, 30 טבליות מצופות במגשיות.

ארקו-טבע 60,90,120 מ"ג: אריזות בגודל 7, 10, 14, 30 טבליות מצופות במגשיות.

ייתכן ולא כל גדלי האריזות משווקים.

שם בעל הרישום וכתובתו:

אביק שיווק בע"מ (מקבוצת טבע), ת"ד 8077, נתניה

שם היצרן וכתובתו:

טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ, ת"ד 3190, פתח תקווה

העלון נערך באוקטובר 2020

מספרי רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות:

ארקו-טבע 30 מ"ג טבליות מצופות: 160.75.35104

ארקו-טבע 60 מ"ג טבליות מצופות: 160.78.35105

ארקו-טבע 90 מ"ג טבליות מצופות: 160.77.35106

ארקו-טבע 120 מ"ג טבליות מצופות: 160.76.35107

לשם הפשטות ולהקלת הקריאה, עלון זה נוסח בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.