

ולפורה**טבליות לעיסה**

כל טבלית לעיסה מכילה:

500 מ"ג ברדל כטצ'רטו סוכרו פיר אוקסידIRON as Sucroferric oxyhydroxide

לרשימת חומרים בלתי פעילים ואליגנים בתכש"ר - ראה פרק 2

"מידע חשוב על חלק מהמריכבים של התוropa" וסעיף 6 -

"ידוע נסוף".

מ"ג בודק נסוף.

קרא בעיון את העلون עד סופו בטרם תשמש בתוropa.

על זה מילדי מידע ממצחי על התוropa. אם יש לך שאלות

טבולה זו רושמה עבורה. אין לעבר או להרока

הזרפה זו רושמה עבורה. היא עלולה

להזיק להם אפילו אם בראה לך כי מצבם הרופאי דומה.

1. למה מיועדת התוropa?

ולפורה מיועדת לסייע רפואיות הדוחן בסוסום בחולי מחלת כליות כרונית (CKD), המטופלים בהמודיאליה (HD) או דיאליה פריטוניאלית (PD).

קבוצה רפואיית: תרופות לטיפול ביתר אשגן וביתר דרחן.**2. לפני השימוש בתוropa:****A אין לשימוש בתוropa אם:**

- הך אלרגי (ג'ישי) לחומר הפעיל או לאחד ממרכיביו התוropa (ראה סעיף 6).
- היתה לך בעבור הצטברות ברזל חריפה באיברים (הטומקורטודיזים).
- הך סובל מפל הפרעה אחרת הקשורה ברמות ברזל גבוהות.

اذדרה מיחוזות הנוגעות לשימוש בתוropa:

B לפני הטיפול בולפורה, ספר לרופא אם: סבלת בשלושת החודשים האחרונים מולדקת ב仄ק (פריטוניאום - הרקמה הדקה שועוטפת את הדופן הפכנית של הבطن).

- הך סובל מבעה ממשותית קיביה ו/או בכבד.
- עברת ניתוח נרחב בקיביה ו/או במעיים.

אם אתה לא בטוח אם האמור לעיל חל عليك, היועץ ברופא או ברוקח לפני בטלת התוropa.

ולפורה עלולה לגרום לצואה שחורה. כל דימום אפשרי ממערכת העיכול שלך (בטן ומעי) עשוי להיות מוסתר ע"י הצואה השחורה. אם יש לך צואה שחורה, גם תספיקים כמו עיפופות מוגברת וקוצר בשימה, יש להיעזץ מידית ברופא שלך (ראה סעיף 4).

C ילדים ומתבגרים:

לא קיים מידע לגבי בטיחות ויעילות השימוש בתכש"ר זה בילדים ומתבגרים. תרופת זו אינה מיועדת לילדים ומתבגרים מתחת לגיל 18.

D אינטראקציות/תגובה בין תרופות:

אם אתה לך תרופה אחרת, או תרופה לאחרונה, תרופות אחרות, כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כן לרופא או לרוקח. במקרה אם אתה לך:

- אלדרורוטס (טיפול במחלות עצם), דוקטיסיצילין (אנטיביטייקה), מכיוון שיתಡע שתרופות אלו מוגבות עם ברזל.
- לבוטיוקסין (טיפול בתפקוד לקוי של בלוטת התריס), מכיוון שתרופה זו יש פוטנציאל להיגע עם ולפורה.

הקד ליטול תרופות אלה לפחות שעה אחת לפני בטלה. ולפורה או לפחות שעתיים אחרי בטלה ולפורה.

התיעץ עם הרופא אם אין בסות.

E שימוש בתוropa ומדון:

יש לשלוט את הטבילה עם האוכל (ראה סעיף 3).

F הרין והנקה:

אין מידע לגבי השפעת התוropa במהלך הרין או הנקה. יש להתייעץ עם הרופא לפני התחלת הטיפול בתוropa אם הנקה, חוסר שברק בהרין, מחבנתת ליריכס בהרין או מיקנה. הרופא ייעץ לך אם ליטול את התוropa במהלך הרין, ע"פ שיקולי סיכון-ਊולות בתקופת ההריון.

אם את נסעה, הרופא יזכיר לך להפסיק להרין או להפסיק ליטול את התוropa, תוך התחשבות בתועלות טיפול בעורך כתוצאה מההנקה. מנהנקה.

לא סבר שהתרופה תעבור לחלב האם.

G נהיגה ושימוש במכוניות:

ולפורה לא אמורה להיות השפעה משמעותית על יכולת הנהיגה או על הפעיל כלים או מוכנות.

H מידע חשוב על חלק מהמריכבים של התוropa:

התוropa מכילה עמילן וכורוז. במידעה ונאמר לך על ידי הרופא שרך שרך לך בראשו או איבריהם לסוכנים מסוימים, צור קשר עם הרופא ייעוץ לפני השימוש בתוropa זו.

ולפורה עלולה להזיק לשיניים. במייה וshall ליטול את התוropa, ש להיזהר ולהקח בחשבון שככל טבילה עליה של ולפורה מילוי כ-1.4 גר חמימות.

3. כיצד תשמש בתוropa?

יש לשמש בתכש"ר תמיד בהתאם להוראות הרופא. עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אין בטוח בנוגע למינון ואופן הטיפול בתכש"ר.

המיכון ואופן הטיפול יקבע על ידי הרופא בלבד. המיכון המקביל בדרכו כלל הוא: 3 טבליות לעיסה ביום (1,500 מ"ג בדרכו).

המינה היומיות המריבית המומלצת היא עד 6 טבליות לעיסה ביום (3,000 מ"ג בדרכו).

אין לעبور על המנה המומלצת

יש ליטול את טבילה הלעיסה במהלך המהלך האורחוה וללעום אותה. במידת הצורך ניתן ליטול הלעיסה, על מנת להקל על הגוף. אין לבלוע את טבילה הלעיסה בשולמותה. יש לחלק את כנת טבליות הלעיסה היומיות בהתאם למספר האורחות שלך ביום.

בעת נתילת ולפורה, עליך להציג את טיפוליים ודיאטה המומלצת עבורך כפי שהנובה אוותך הרופא, כגון: נתילת תוספִי סידן, ויטמין D3, או תכשימים דומי סיידן.

אם נטלת מנתן יתר או אם בטעות בעלך מין התוropa, פנה מיד לרופא או לחדר מין של בית חולים והבא את ארידת הרופאה איתך. אם בטעות נטלת יתר או מידי נטלות לעיסה של ולפורה, אין להפסיק את הטיפול וליטול טבליות לעיסה נספה. פנה מיד לרופא.

אם שכחת ליטול תוropa זו בזמן הדרוש, קח את המנה הבאה עם הארוחה בדעת הרגלי. אין ליטול מנה כפולה על מנת לפחות את המנה הששכחה.

אם אתה מפסיק את נתילת התוropa, רמות הדוחן בדעת

עלולות לעלות. גם אם חל שיפור במצבך אוירוך, אין להפסיק את הטיפול בהרופאה. יש להתמיד בטיפול כפוי שהומולץ על ידי הרופא.

אין ליטול תרופות בחושך! בדוק תווותית והמבה בכל פעעם שהן נועל תרופת. המרכיבים אמורים דבקות להם. **אם יש לך שאלות נוספת נספה בכווג לשימוש בתוropa, הייעוץ ברופא או ברוקח.**

4. תופעות לוואי:

כמו בכל תרופה, השימוש מולפורה יכולה לגרום לתופעות לוואי בדעת הגוף. אל תבהל מקרה רשות תופעות הלוואי. יתכן ולא תסבול מכך ממשן.

תופעות לוואי שכיחות מוגבלות (טיפות ביורט מושתמש אחד מתוך עשרה):

שלשול (בדרכו לכל מופיע בתחילת הטיפול, ומשתפרק עם המתיקות הטיפול בולפורה), צואזה שחורה.

אם בוכום לצואזה שחורה, יש לך סטטיניסים כבון עיפוי וקוצר נשימה, יש ליצור מיד קשר עם הרופא (ראה סעיף 2).

תופעות לוואי שכיחות מוגבלות (טיפות ביורט מושתמשים מתוך 100):

בחילות, עצירות, הקאות, קשיי עיכול, כאב בקיביה או בעורם, גדים, שכיבי בצעב השיניים, שניבו בטעם.

תופעות לוואי שאיבן שכיחות (טיפות ביורט מושתמשים מתוך 1,000):

כפיפות בבטן, דלקת בקיביה, אי כוחות בבטן, קשיי ביליה, רפלוקס קבבי וישי (חויצה שעולה מהקביה לאושט), שניני בצע הלשון, רמת סיידן גבוהה או נמוכה בדם, עיפות, גרד, פריחה, כאב ראש, קוצר נשימה.

אם הופיעה תופעת לוואי, אם אתה מטופל מתופעת הלוואי מחרירה, או כאשר אתה סובל מתופעת לוואי עם הרופא בעולו, עליך להתיעץ עם הרופא.

דיווח על תופעות לוואי:

יתכן לך תופעות לוואי בדעת הגוף. אל תבהל מקרה רשות תופעות "דיז'ו" על תופעות לוואי עקב טיפול תרופתי".

שנמצא בדרך הבת של אחר מושך הבריאות (www.health.gov.il). המפה להטוטס המukan לדיווח על תופעות לוואי, או ע"י כניסה לכתובת: <https://sideeffects.health.gov.il/>

5. איך לאחסן את התוropa?

מנג הרעלתו התוropa זו וכל תרופה אחרת יש לשמרם במקומות סורר מוחץ להשא ידים טוחן ריימיט של ילדים/אים או מינון ועל ידי כך תמנע הרעללה. אל תגרום להראה ללא הוואה מפורשת מהרופא.

אין להשתמש בתוropa אחרי תאריך התגובה (exp. date) המופיע על גב ארידה. תאריך התגובה מותיחס ליום האחרון של אותו חדש.

יש לאחסן במפרוטורה הנמוכה מ-25 °C. ניתן להשמתש בתוropa עד 90 ימים מעת חישוב התקבוק. אחסן בארידזה המקורית.

6. מידע נוסף:

נוסף על החומר הפעיל התוropa מכילה גם: Woodberry flavour, Magnesium stearate, Silica (Colloidal, Anhydrous), Neohesperidin-dihydrochalcone.

כיצד נראה התוropa ומה תוכן הארידזה?

בקבוק פלסטיק המכיל 30-90 טבליות לעיטה. טבליות הלעיסה עגולות וצבען אדום-חום, ומוטבע עלייה אחד רקeting PA500.

לא כל גודל הארידזות עשוי להיות משוקים.

שם בעל הרישום וכותבו: כט בע"מ, רחוב החרש 4, הדר הכרמל.

שם הייצור וכותבו:

Vifor (International), Rechenstrasse 37

St. Gallen 9014, Switzerland

פורטט עלון זה קבוע ע"מ משרד הבריאות ותוכנו: מושך בריאות וטובן בדעת 06/2016 ועדותן בהתאם להוראות משרד הבריאות בתאריך 07/2020.

מספר רישום התוropa בפנקס התוropa הממלכתי משרד הבריאות: 156-48-34557-00.

שם הפשטות ולהקלת הקיראה, עלון זה נוסח בלשון זכר. אף זאת, התוropa מיועד לבני שבי המינים.