

עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים (תכשירים) התשמ"ו - 1986

התרופה משוקת על פי מרשם רופא בלבד

דיובאן 40 מ"ג טבליות מצופות

הרכב:

כל טבליה מצופה מכילה:

Valsartan 40 mg

ולסרטן 40 מ"ג

דיובאן 80 מ"ג טבליות מצופות

הרכב:

כל טבליה מצופה מכילה:

Valsartan 80 mg

ולסרטן 80 מ"ג

דיובאן 160 מ"ג טבליות מצופות

הרכב:

כל טבליה מצופה מכילה:

Valsartan 160 mg

ולסרטן 160 מ"ג

חומרים בלתי פעילים ולארגוניים:
ראה סעיף 6 "מידע נוסף".

קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש בתרופה.
עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח.

תרופה זו נרשמה לטיפול במחלתך. אל תעביר אותה לאחרים. היא עלולה להיקח אפילו אם נראה לך כי מחלתם דומה.

1. למה מיועדת התרופה?

דיובאן 40 מ"ג מיועדת לטיפול באי ספיקת לב והפחתת אישפויים בחולים עם אי סבילות לתרופות המעכבות אננים המהפך אנגיוטנסין (ACEi). לטיפול לאחר אוטם שריר הלב, כדי לשפר הישרדות.
דיובאן 80 מ"ג דיובאן 160 מ"ג מיועדות לטיפול ביתר לחץ דם. לטיפול באי ספיקת לב והפחתת אישפויים בחולים עם אי סבילות לתרופות המעכבות אננים המהפך אנגיוטנסין (ACEi). לטיפול לאחר אוטם שריר הלב, כדי לשפר הישרדות.

• יתר לחץ דם מעלה את עומס העבודה על הלב והעורקים. אם יתר לחץ הדם אינו מטופל, עלולה להיגרם פגיעה בכלי הדם של המוח, הלב והכליות. הוצאה עלולה לגרום לשבץ, אי ספיקת לב או אי ספיקת כליות. יתר לחץ דם מעלה את הסיכון להקטפת כליות לחץ הדם לרמות הקינות מורידה את הסיכון להתפתחות הפרעות אלו.
• יתר לחץ דם מעלה את עומס העבודה על הלב והעורקים. אם יתר לחץ הדם אינו מטופל, עלולה להיגרם פגיעה בכלי הדם המוח, הלב והכליות. הוצאה עלולה לגרום לשבץ, אי ספיקת לב או אי ספיקת כליות. יתר לחץ דם מעלה את הסיכון להקטפת כליות לחץ הדם לרמות הקינות מורידה את הסיכון להתפתחות הפרעות אלו.
• לטיפול בחולים בוגרים לאחר התקף לב (אוטם שריר הלב), זאת כדי לשפר הישרדות ולמפחית בעיות לב נוספות.
• לטיפול באי ספיקת לב סימפטומטית בחולים בוגרים. אי ספיקת לב כוללת קוצר נשימה, נפיחות של הרגליים וכופת הרגליים עקב הצטברות נוזלים. אי ספיקת לב פירושה ששריר הלב אינו יכול לדחוף את הדם מספיק חזק כדי לספק את כל הדם הנדרש לגוף.

קבוצה תרפויטית:

חוסם הקולטן (הרצפטור) לאנגיוטנסין II.

דיובאן שייכת לקבוצת תרופות החוסמות את הקולטן לאנגיוטנסין II, הן מסייעות בשליטה על יתר לחץ דם. אנגיוטנסין II הוא חומר טבעי המצוי בגוף הגורם לכלי הדם להתרחק ועל-ידי כך גורמת עלייה בלחץ הדם. דיובאן פועלת בחסימת ההשפעה של אנגיוטנסין II, כתוצאה מכך כלי הדם נרפים, ולחץ הדם יורד.

2. לפני השימוש בתרופה

⚠ אין להשתמש בתרופה אם:

• אתה בעל רגישות יתר (אלרגי) לחומר הפעיל ולסרטן או לכל אחד מהמרכיבים הנספים אשר מכילה התרופה (המפורטים בסעיף 6)

• הינך סובל מהפרעה חמורה בתפקודי הכבד

• הינך בהריון מעל 3 חודשים (עדיף להימנע מדיובאן גם בתחילת ההריון - ראי סעיף "הריון והנקה")

• הינך מטופל בתרופה הורדת לחץ דם המכילה אליסקירן (aliskiren) כיוון שהינך חולה בסוכרת או סובל מתפקוד כליותי לקוי

אם אתה מטבצים אלו לרונוטי אליך, ידע את הרופא מבלי ליטול דיובאן.

אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה:

⚠ לפני הטיפול בדיובאן, ספר לרופא אם:

- יש לך מחלת כבד
- יש לך מחלה חמורה של הכליה או הינך עובר דיאליזה
- אתה סובל מהיצרות עורק הכליה
- עברת לאחרונה השתלת כליה
- יש לך מחלת לב חמורה, אחרת מאשר אי ספיקת לב או התקף לב

היתה לך אי פעם נפיחות בלשון ובפנים שנגרמה עקב תגובה אלרגית הקרויה אנגיודמה, כאשר נטלת תרופה אחרת (כולל מעכבי ACE), ספר לרופא שלך. אם תסמינים אלו חלים עליך בעת נטילת דיובאן, **יש להפסיק מייד לקחת דיובאן, ולעולם אין לקחת דיובאן שוב.** ראה גם בסעיף 4, "תופעות לוואי"

• הינך נוטל תרופות שמעלות את כמות האשלגן בדם. זה כולל תוספי אשלגן או תחליפי מלח המכילים אשלגן, תרופות אוצרות אשלגן הפרני. ייתכן וידרש ממך לבדוק את כמות האשלגן בדם במרווחי זמן קבועים

• הינך סובל מאלדוסטרוניזם, מחלה בה בלוטות יותרת הכליה (אדרנל) שלך מייצרות עודף של הורמון האלדוסטרון. במקרה כזה לא מומלץ להשתמש בדיובאן

• איבדת כמות גדולה של נוזלים (התייבשות) עקב שלשולים והקאות או נטות גבוהות של תרופות משתנות

• הינך נוטל אחת מהתרופות הבאות המשמשות לטיפול ביתר לחץ דם:

- תרופה מסוג מעכבי ACE (אנים המהפך אנגיוטנסין) (לדוגמא; אנלפריל, לזינופריל, רמ'פירל), במיוחד אם יש לך בעיות כלשהם לתרופות לסוכרת

- אליסקירן
- אם אתה מטופל במעכב ACE בשילוב עם תרופות אחרות (אדרנל) שלך מייצרות עודף של הורמון האלדוסטרון. במקרה כזה לא מומלץ להשתמש בדיובאן
- חוסמי קולטנים) מינורלוקוטיקואיד (MRA) (לדוגמא ספירונולקטון, אפלרנון) או חוסמי בטא (לדוגמא; טנופרולול) עיי גם במידע בסעיף "אין להשתמש בתרופה אם:"

עליך לספר לרופא אם את חושבת שהינך (או עשויה להיות) בהריון. נטילת דיובאן לא מומלצת בשלבים מוקדמים של ההריון, **אין לקחת דיובאן** אם את יותר משלושה חודשים בהריון, כיוון שעלול להיגרם נזק רציני לעובר אם הינך משתמשת בתרופה בשלב זה (ראי סעיף "הריון והנקה").

לילדים:

תרופה זו אינה מיועדת לתינוקות, ילדים ומתבגרים מתחת לגיל 18 שנים.

⚠ בדיקות ומעקב:

ייתכן שהרופא שלך יבדוק את תפקודי הכליה שלך, לחץ דם וכמות האלקטרוליטים בדם (לדוגמא; אשלגן) במרווחי זמן קבועים.

⚠ אם אתה לוקח, או לא לקחת לאחרונה, תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי מזונה, ספר על כך לרופא **ולרוקח.** הטיפול יכול להיות מושפע אם דיובאן נלקחת יחד עם תרופות מסוימות. ייתכן כי יהיה צורך לשנות את הנוון, לנקוט אמצעי זהירות או במקרים מסוימים להפסיק ליטול את אחת התרופות. במיוחד יש לייצע את הרופא או הרוקח אם אתה לוקח את התרופות הבאות:

• תרופות אחרות המשמשות להורדת לחץ דם, בעיקר משתנים, מעכבי ACE (כגון אנלפריל, לזינופריל וכו') או אליסקירן (ראה גם בסעיפים "אין להשתמש בתרופה אם:" ו- "אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה")

• תרופות שמעלות את כמות האשלגן בדם. אלה כוללות תוספי אשלגן או תחליפי מלח המכילים אשלגן, תרופות אוצרות אשלגן והפרין

• סוג מסוים של משככי כאבים הקרויים נוגדי דלקת שאינם סטראוידים (NSAIDs)

• אנטיביוטיקות מסוימות (מקבוצת הריפאמיצין), תרופה המשמשת להגנה מפני דחיית שתל (ציקלופורין) או תרופה אנטי-רטרוויראלית המשמשת לטיפול בוויהם HIV/אייДС (רינוואויר). תרופות אלו עשויות להגביר את ההשפעה של דיובאן

• ליתיום, תרופה שמשמשת לטיפול בסוגים מסוימים של מחלות פסיכיאטריות

בנוסף:

• אם הינך **מטופל לאחר התקף לב,** השילוב עם מעכבי ACE (תרופה לטיפול בהתקף לב) אינו מומלץ
• אם הינך מטופל **באי ספיקת לב,** שילוב משולש של: **מעכבי ACE, תרופות אחרות לטיפול באי ספיקת לב הידועות כאנטגוניסטים (בעלי פעילות חסימה) לקולטני מינורלוקוטיקואיד (MRA)** (לדוגמא ספירונולקטון, אפלרנון) או **חוסמי בטא** (לדוגמא טנופרולול), **שילוב זה אינו מומלץ.**

⚠ שימוש בתרופה ומזון:

הינך ליטול דיובאן עם או בלי מזון.

⚠ הריון והנקה:
• **עליך לספר לרופא אם את חושבת שהינך בהריון (או עשויה להיות בהריון).**

יש להניח שהרופא שלך ייעץ לך להפסיק לקחת דיובאן לפני שתכסי להריון או מייד עם היוודע שהינך בהריון. הוא ייעץ לך לקחת תרופה אחרת במקום דיובאן. דיובאן אינה מומלצת בשלבים ראשוניים של ההריון ו**אין** לקחתה מסיום החדוש השלישי להריון, כיוון שהתרופה עלולה לגרום לנזק רציני לתינוק במידה והשתמשות בה אחרי החדוש השלישי להריון.
• **ספרי לרופא שלך אם את מניחה או מתכננת להתחיל להניק,** דיובאן אינה מומלצת לאמהות אשר מניקות והרופא שלך כנראה יבחב בטיפול אחר עבורך אם ברוצנך להניק, במיוחד אם תינוקך לא עתה נוול, או נולד טרם זמנו.

⚠ הנחה ושימוש במנוחה:

לפני הנחה ברכב, שימוש במכוונת או ביצוע כל פעילות המחייבת ריכוז, עליך לוודא שהינך יודע כיצד דיובאן משפיע עליך. כמו תרופות רבות אחרות המשמשות לטיפול ביתר לחץ דם, דיובאן עלולה לגרום לסחרחורת ולפגיעה בריכוז.

3. כיצד תשתמש בתרופה?

יש להשתמש בתכשיר תמיד בהתאם להוראות הרופא.

עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אינך בטוח בנוגע למינון ואופן הטיפול בתכשיר.

המינון ואופן הטיפול יקבעו על-ידי הרופא בלבד. המינון המקובל תלוי בהתוויה לה נרשמה התרופה.

ניתן להשתמש בדיובאן בחולים בני 65 ומעלה.

תרופה זו אינה מיועדת לתינוקות, ילדים ומתבגרים מתחת לגיל 18.

אין לעבור על המנה המומלצת.

בדרך כלל, חולים עם יתר לחץ דם אינם מבהינים בסמינים של הבעיה. רבים חשים כרגיל. לכן יש חשיבות להתמיד בביקורים אצל הרופא שלך, גם אם הינך חש בטוב.

צורת נטילה:

ניתן ליטול דיובאן עם או בלי מזון. אין מידע לגבי כתישה או לעיסה של הטבליה המצופה. יש לבלוע דיובאן עם כוס מים. יש ליטול דיובאן באותו הזמן כל יום. להוראות חצייה נא לעיין בסעיף "כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה".

אם נטלת בטעות מינון גבוה

אם הינך חש סחרחורת חמורה ו/או עלילפון פנה מייד לרופא שלך ועבור למצב שכביה. אם נטלת מנת יתר או אם בטעות בלע ילד מן התרופה, פנה מייד לרופא או לאחד מיון של בית חולים והבא אריזת התרופה איתך.

אם שכחת ליטול דיובאן

אם שכחת לקחת מנה, קח אותה מייד כשזכרת. אם מועד נטילת המנה הבאה כמעט הגיע, דלג על המנה ששכחת. אין ליטול מנה כפולה. קח את המנה הבאה בזמן הרגיל והיוועץ ברופא. יש להתמיד בטיפול כפי שהומלץ על-ידי הרופא.

גם אם חל שיפור במצב בריאותך, אין להפסיק הטיפול בתרופה ללא התייעצות עם הרופא. הפסקת הטיפול עלולה להחמיר את מחלתך. טרם ההפסקה יש לדון עם הרופא או הרוקח בהשלכות ההפסקה.

אין ליטול תרופות בחושך! בדוק התווית והמנה בכל פעם שהינך נוטל תרופה. הרכב משקפיים אינו הינך זקוק להם. אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היוועץ ברופא או ברוקח.

4. תופעות לוואי

כמו בכל תרופה, השימוש בדיובאן עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשימת תופעות הלוואי. ייתכן ולא תסבול מאף אחת מהן.

תופעות לוואי מסוימות עלולות להיות רציניות ונדרשת מעורבות רפואית מיידיית: יש לפנות מייד לרופא אם יש לך תסמינים של אנגיודמה (תגובה אלרגית מסוימת) כגון

• נפיחות של הפנים, הלשון או הגרון
• קשיי נשימה ובליעה

• גרד וסרפדת.

אם אתה חש באחד מהתסמינים שהזכרו, הפסק את נטילת דיובאן וצור קשר מידי עם הרופא שלך (ראה גם סעיף "אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה").

תופעות לוואי נוספות:

תופעות לוואי שכיחות (תופעות שמופיעות עד משתמש 1 מתוך 10 משתמשים):

• סחרחורת

• לחץ דם נמוך עם או ללא תסמינים כגון סחרחורת והתעלפות במעבר למצב עמידה

• ירידה בתפקודי כליות (סימנים של ליקוי בכליות)

תופעות לוואי לא שכיחות (תופעות שמופיעות עד משתמש 1 מתוך 100 משתמשים):

• תגובה אלרגית: אנגיודמה) ראה בסעיף "אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה". יש לפנות מייד לרופא לעזרה רפואית
• אובדן הכרה פתאומי (התעלפות)

• תחושת סחרור (ורטיגו)

• ירידה חמורה בתפקודי הכליות (סימנים של אי ספיקת כליות חריפה)

• עוויות שרירים, קצב לב לא תקין (סימנים של היפרקלמיה - עודף אשלגן)

• קוצר נשימה, קשיי נשימה בזמן שכביה, נפיחות של כפות הרגליים או הרגליים (סימנים של אי ספיקת לב)

• כאב ראש

• שיעול

• כאב בטן

• בחילה

• שחלה

• עייפות

• חולשה

תופעות לוואי בשכיחות לא ידועה (לא ניתן להעריך שכיחותן מהנתונים הקיימים):

• שלפוחיות בעור (סימן לדלקת עור [דרמטיטיס] שלפוחייתית)

• תגובות אלרגיות מלוות בפריחה, גרד וסרפדת, תסמינים של חום, נפיחות מפרקים וכאב מפרקים, כאבי שרירים, יתכנו תסמינים של נפיחות בלוטות הלימפה ו/או תסמינים דמויי שפעת (סימנים של מחלת סרום - serum sickness)

• כתמים סגולים-אדומים, חום, גרד (סימנים של דלקת בכלי הדם הקרויה גם וסקוליטיס)

• דימום או הופעת חבורות שאינם רגילים (סימנים של טרומבוציטופניה - רמה נמוכה של טסיות דם)

• כאב שרירים (מיאלגיה)

• חום, כאב גרון או כיבים בפה כתוצאה מזהומים (תסמינים של נגיף הרמט המוגלובין וירידה באחוז תאי דם אדומים בדם (העלולה לאמניה)

• עלייה ברמת האשלגן בדם (העלולה במקרים חמורים, לעורך עוויות שרירים וקצב לב לא סדיר)

• עלייה בערכי תפקודי הכבד (עשויה להצביע על נזק לכבד) כולל עלייה בבילירובין בדם (עלולה, במקרים חמורים, לגרום להצהבה של העור והעיניים)

• עלייה ברמת אוריאה חנקנית בדם ועלייה ברמות הקריאטינין בסרום (שכיחות הצבוע על תפקוד כליות לא תקין)

• רמות נמוכות של נתרן בדם (אשר יכולות לעורר עייפות, בלבול, שרירים רוטטים ו/או עוויות במקרים חמורים)

התדירות של תופעות לוואי מסוימות עשויה להשתנות בהתאם למצבך. לדוגמא, תופעות לוואי כגון סחרחורת וירידה בתפקוד הכליות נראו בתדירות נמוכה יותר בחולים שטופלו ביתר לחץ דם לעומת חולים שטופלו באי ספיקת לב או לאחר התקף לב שקרה לאחרונה.

אם הפגיעה תופעת לוואי, אם אחת מתופעות הלוואי מחמירה לא כנשר אתה סובל מתופעת לוואי שלא צויינה בעלון, עליך להתייעץ עם הרופא.

דיווח על תופעות לוואי

ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי עקב טיפול תרופתי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות (www.health.gov.il) המפנה לטופס המקוון לדיווח על תופעות לוואי, או ע"י כניסה לקישור: https://sideeffects.health.gov.il

5. איך לאחסן את התרופה?

• מנע הרעלה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם וטווח ראייתם של ילדים ו/או תינוקות ועל-ידי כך תמנע הרעלה. אל תגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא.

• אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (exp. date) המופיע על גבי האריזה. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו חודש.

תנאי אחסון:

אחסן בטמפרטורה הנמוכה מ־C 30'. יש לאחסן באריזה המקורית כדי להגן מלחות.

אין לאחסן תרופות שונות באותה אריזה. אין להשתמש אם האריזה פגומה.

אין להשליך תרופות דרך מי שופכין או אשפה ביתית, שאל את הרוקח כיצד לפנות תרופות שאין בהן עוד צורך, זאת כדי להגן על איכות הסביבה.

6. מידע נוסף

נוסף על החומר הפעיל התרופה מכילה גם:

Microcrystalline cellulose, crosopovidone, magnesium stearate, colloidal anhydrous silica.

ציפוי הטבליה מכיל:

Hypromellose, titanium dioxide (E171), macrogol 8000, iron oxide yellow (E172), iron oxide red (E172), iron oxide black (E172) (only 40 mg and 160 mg).

כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה:

דיובאן 40 מ"ג טבליות מצופות: טבליה צהובה אובאלית בעלת קצוות משופעים, עם קו חצייה בצד אחד, עם הטבעה "D" ו- "O" בצדי הקו ו- "NVR" בצד השני של הטבליה. גודל האריזה: 14 או 28 טבליות (ייתכן שלא כל גדלי האריזה משווקים).

ניתן לחצות את הטבליה לשתי מנות שוות.

דיובאן 80 מ"ג טבליות מצופות: טבליה אדומה בהירה עגולה בעלת קצוות משופעים, עם קו חצייה בצד אחד, עם הטבעה "D" ו- "V" בצדי הקו ו- "NVR" בצד השני של הטבליה. גודל האריזה: 14, 28, 56 או 98 טבליות (ייתכן שלא כל גדלי האריזה משווקים).

פס חצייה נועד להקל על חציית הטבליה לצורך הקלה על הבליעה ולא כדי לחצותה לשתי מנות שוות.

דיובאן 160 מ"ג טבליות מצופות: טבליה אפורה-כתומה אובאלית, עם הטבעה "DX" בצד אחד ו- "NVR" בצד השני של הטבליה. גודל האריזה: 14, 28, 56 או 98 טבליות (ייתכן שלא כל גדלי האריזה משווקים). **ללא פס חצייה.**

בעל הרישום היבואן וכותבתו:
נוברטיס ישראל בע"מ, ת.ד. 7126, עלון אביב, ישראל.

תלן זה נערך באוקטובר 2020

מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות:

דיובאן 40 מ"ג טבליות מצופות: 31281 42 137

דיובאן 80 מ"ג טבליות מצופות: 30548 85 127

דיובאן 160 מ"ג טבליות מצופות: 30549 86 127

לשם הפשטות ולהקלת הקריאה, עלון זה נוסח בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.