

עלון לצרכן לתכשיר וטרירני
התרופה משווקת על פי מרשם רופא וטרירני בלבד
לשימוש בבעלי חיים בלבד

1. שם התרופה הווטרירנית, צורתה וחוזקה סולפמתופרימ פרמיקס וטרירני Sulfamethoprim Premix Veterinary

אבקה לערבוב במזון

2. חומרים פעילים

כל 1 ק"ג מכיל: סולפהדיאזין 250g sulfadiazine
טרиметופרימ 50g trimethoprim

לפירוט החומרים הבלתי פעילים ראה סעיף 13.

3. למה מיועדת התרופה

התרופה מיועדת לטיפול במחלות זיהומיות הנגרמות על ידי חיידקים הרגישים לתכשיר בתרנגולי פטם, תרנגולי הודו, עגלים (pre-ruminating) לפני הקמת מערכת העלאת גירה) ודגים.

קבוצה תרפויטית

אנטיביוטיקה מקבוצת תרופות הסולפה המשולבות עם טרימתופרימ.

4. התוויות נגד

אין להגיש לעגלים עם מערכת מפותחת של מעלי גירה. אין להגיש לבעלי חיים עם לקוי חמור בכבד, כליה או מערכת הדם.

אין להגיש לבעלי חיים עם רגישות לסולפונאמידים או לכל אחד ממרכיבי התרופה.

5. תופעות לוואי

שקיעת גבישים בכליות הינו סיכון תיאורטי, ודווח לעיתים נדירות.

לעיתים נדירות רגישות יתר לסולפונאמידים.

ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי עקב טיפול תרופתי" שנמצא

בדף הבית של אתר משרד הבריאות (www.health.gov.il) המפנה לטופס המקוון לדיווח על תופעות לוואי, או ע"י כניסה לקישור:

<https://sideeffects.health.gov.il>

6. חיות מטרה

תרנגולי פטם

תרנגולי הודו

עגלים יונקים (Pre-ruminating)

דגים

7. אופן המתן והמינון

המינון המומלץ בתרנגולי פטם ובתרנגולי הודו הוא 1 ק"ג סולפמתופרימ פרמיקס לכל 1000 ק"ג מזון. משך הטיפול: 5-7 ימים.

עגלים: המינון המומלץ הוא 3 ק"ג סולפמתופרימ פרמיקס לכל 1000 ק"ג מזון. משך הטיפול 7 ימים.

לדגים: המינון המומלץ הוא 240 גרם סולפמתופרימ פרמיקס לכל 1 טון דגים משקל חי. משך הטיפול: 10-7 ימים. צריכת המזון

משתנה בדגים בהתאם לטמפרטורת המים. לצורך התאמת המינון לקצב צריכת המזון יש להיוועץ עם הרופא הווטרירני.

8. אופן השימוש בתכשיר

להגשה על ידי ערבוב במזון בהתאם להוראות הרופא הווטרירני.

9. זמן המתנה

תרנגולי פטם: 8 ימים.

תרנגולי הודו: 5 ימים

עגלים: 21 ימים

דגים: 30 יום בטמפרטורה 23°C

10. אזהרות

• אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בחיית המטרה

עבור תרנגולי פטם והודים:

במקרים של ירידה בתיאבון, יש להתאים את הרכיז במזון על מנת להשיג את המינון הנכון. כדי למנוע שקיעת גבישים בכליות,

צריכת מים נאותה הינה חיונית, במיוחד עם בעלי חיים הסובלים מנזק כלייתי.

אזהרות מיוחדות הנוגעות לבעלי חיות האדם המטפל בתכשיר

• בזמן ערבוב התכשיר במזון, על העובד להימנע ממגע התכשיר בעור ובעיניים ומשאיתו, וזאת על ידי שימוש באמצעי מיגון

מתאימים. לכן יש להשתמש בכפפות ובמסכת מגן בעת הטיפול במזון עם תכשיר זה. יש לשתוף ידיים לאחר השימוש בתכשיר זה.

• סולפונאמידים יכולים לגרום לתגובה אלרגית לאחר חשיפה בעקבות הזרקה, שאיפה, בליעה, או מגע בעור. רגישות יתר

לסולפונאמידים יכולה לגרום לרגישות צולבת עם אנטיביוטיקות אחרות. לעיתים התגובות האלרגיות לחומרים אלו יכולות

להיות חמורות.

1. אין לבוא במגע עם מוצר זה אם ידוע שקיימת רגישות לסולפונאמידים.

2. אם אתה מפתח תסמינים כמו פריחה בעור, או קשיי נשימה, פנה לרופא והבא איתך עלון זה.

11. הוראות אחסון

• מנע הרעלה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם וטווח ראייתם של ילדים ו/או תינוקות ועל

אין כך תמנע הרעלה.

• ידע להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (exp. Date) המופיע על גבי האריזה. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון

של אותו החודש.

• תנאי אחסון: מתחת ל-25°C.

12. הוראות בדבר השמדת התכשיר/שאריות התכשיר בתום השימוש

כל שארית של תכשיר וטרירני או כל פסולת שהתקבלה משימוש בתכשיר וטרירני יש להשמיד כפסולת רעילה, אין להשליך לביוב.

13. מידע נוסף

• נוסף על החומרים הפעילים התרופה מכילה גם: Calcium carbonate, Sipernat S22

• גודל האריזה: 1 ק"ג, 3 ק"ג. ייתכן שלא כל גודלי האריזות משווקים.

• היצרן ובעל הרישום: אביק תוצרים וטרירניים בע"מ. ת.ד. 489 אזור תעשייה בית שמש.

עלון זה נבדק ואושר על ידי משרד הבריאות בתאריך: 05/2019.

מספר רישום התכשיר בפנקס התכשירים הממלכתי במשרד הבריאות: 081-23-92209