

الفحوصات والمتابعة:
قبل البدء في العلاج وعند استعمال الدواء، يجب إجراء فحص عينين عند طبيب العيون.

أثناء فترة العلاج سوف يتم توجيهك لإجراء فحوصات دم لفحص ما إذا كان العلاج ناجعاً والتأكد من أنه لا تظهر أعراض جانبية توادي إلى اضطرابات في جهاز الدم.

يجب إجراء فحوصات كبد كل فترة ذلك لأن المرض تيروزينيا من نوع 1 يؤثر على الكبد.

يجب الحضور لفحص متابعة عند الطبيب كل ستة أشهر ويجب الحضور للمراقبة خلال فترات زمنية أقصر في حال وظفهرت أعراض جانبية.

التفاعلات / ردود الفعل بين الأدوية:
إذا كنت تتناول أو تناولت مؤخراً أدوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبية ومكمالت غذائية، احث عن ذلك للطبيب أو الصيدلي.
أورفادين كبسولات صلبة ممكن أن تتشوش على تأثير الأدوية الأخرى، على سبيل المثال:

- أدوية للصرع على سبيل المثال فينتوين (phenytoin)
- أدوية مضادة لتخثر الدم على سبيل المثال كومادين /وارفارين (coumadin /warfarin)

استعمال الدواء والطعام:
إذا بدأت تناول العلاج بأورفادين كبسولات صلبة مع الطعام، فمن المفضل استمرار تناول أورفادين كبسولات صلبة مع الطعام طوال العلاج.

الحمل، الإرضاع والخصوبة:
لم يتم فحص سلامة أورفادين كبسولات صلبة عند النساء الحوامل والمرضعات. يجب إعلام الطبيب المعالج في حال كنت تخطفين للحمل. في حال كنت حاملاً يجب إعلام الطبيب المعالج فوراً.
لا يجوز استعمال الدواء عند الإرضاع.

السياحة واستخدام الماكينات:
من الممكن أن يكون تأثير ضئيل يؤدي إلى الضرر بالباقطة عند استعمال هذا الدواء، لذلك يجب توخي الحذر عند قيادة المركبة، وعند تشغيل الماكينات الخطيرة وعند كل نشاط يستوجب الباقطة.

يمكن أن يظهر أثناء العلاج تأثير محتمل على الرؤية. في حال عايشته، يجب الامتناع عن السياحة أو تشغيل ماكينات خطيرة حتى عودة رؤيتك لوضعها الطبيعي.

3. كيفية استعمال الدواء؟

يجب استعمال المستحضر بحسب تعليمات الطبيب دائماً. عليك الاستيقاظ من الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكن واثقاً من الجرعة الدوائية وكيفية استعمال المستحضر.

بداية العلاج بأورفادين كبسولات صلبة يجب أن يكون بتعليمات ورقابة طبيب ذو خبرة في علاج مرضى يعانون من تيروزينيا من نوع 1.

الجرعة الدوائية الاعتيادية هي: 1 ملغ في اليوم لكل كيلوغرام وزنك، سلالم الطبيب الجرعة الدوائية من أجلك بشكل شخصي.
من المفضل إعطاء الجرعة الدوائية مرة واحدة في اليوم.

مع ذلك، بسبب محدودية المعلومات حول المتعالجين الذين يزنون أقل من 20 كغم، يوصى لهؤلاء المرضى بتنقية الجرعة إلى مرتين في اليوم.

إذا كانت لديك مشاكل في البلع، ممكن فتح الكبسولة وخلط المسحوق مع كمية قليلة من الماء أو تركيبة غذائية فوراً قبل تناول الدواء.
لا يجوز تجاوز الجرعة الدوائية الموصى بها.

إذا تناولت جرعة مفرطة أو بلع طفلاً بالخطأ من الدواء، توجه حالاً إلى الطبيب أو لغرفة الطوارئ في المستشفى وأحضر ملوك عليه الدواء.

إذا نسيت تناول الدواء في الوقت المحدد، لا تتناول جرعة مضاعفة. تناول

الجرعة الدوائية التالية في الوقت الاعتيادي واستشر الطبيب.

Orfadin™ 2 mg Hard capsules

Orfadin™ 5 mg Hard capsules

Orfadin™ 10 mg Hard capsules

أورفادين 2 ملغ كبسولات صلبة

أورفادين 5 ملغ كبسولات صلبة

أورفادين 10 ملغ كبسولات صلبة

التركيب:

المادة الفعالة:

كل كبسولة من أورفادين 2 ملغ كبسولات صلبة تحتوي على Nitisinone 2 mg

كل كبسولة من أورفادين 5 ملغ كبسولات صلبة تحتوي على Nitisinone 5 mg

كل كبسولة من أورفادين 10 ملغ كبسولات صلبة تحتوي على Nitisinone 10 mg

لقائمة المركبات غير الفعالة ومبنيات الحساسية في المستحضر انظر البند 6، "معلومات إضافية".

اقرأ النشرة بتمعن حتى نهايتها قبل استعمالك للدواء. تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء. إذا كانت لديك أسلمة إضافية، راجع الطبيب أو الصيدلي.

وصف هذا الدواء لعلاج مرضك. لا تعطه لآخرين. فهو قد يضرهم حتى ولو بدا لك أن مرضهم مشابه.

1. لأي غرض مخصص هذا الدواء؟

يوصف أورفادين كبسولات صلبة لعلاج مرض وراثي يسمى تيروزينيا من نوع 1.

في هذا المرض يكون جسمك غير قادر على تفكك كامل للحمض الأميني تيروزين (الأحماض الأمينية هي لبناء لبناء البروتينات في أجسامنا)، نتيجة لذلك تتراكم في الجسم مادة تضر به. أورفادين كبسولات صلبة يمنع منذ البداية تفكك الحمض الأميني تيروزين ونتيجة لذلك لا تتراكم المادة المضرة في جسمك.

لأن التيروزين يبقى في الجسم، فيجب الحفاظ عند العلاج بأورفادين كبسولات صلبة على نظام غذائي خاص مبني على غذاء ذو كميات منخفضة من التيروزين والفينيل الأدين.

الفصيلة العلاجية: لعلاج حال في النظام الأيضي الحيوي.

2. قبل استعمال الدواء:

لا تستعمل المستحضر إذا:

- كنت حساساً (اليرجي) للمادة الفعالة nitisinone أو لأي من المركبات الإضافية التي يحويها الدواء (انظر البند 6، "معلومات إضافية").
- كنت مريضاً.

تحذيرات خاصة تتعلق باستعمال الدواء

قبل العلاج بأورفادين كبسولات صلبة احث للطبيب:

• في حال ظهور احمرار أو كل علامة أخرى في العينين فيجب الترجمة للطبيب فوراً لفحص العينين. مشاكل في العينين ممكن أن تشير إلى نقص في الرقابة الغذائية.

يجب المواظبة على العلاج كما أوصى به الطبيب.

لا توقف تناول الدواء أو تغير الجرعة الدوائية دون استشارة طبيبك، حتى لو بدا لك أن الدواء لا يعلم كما يجب.

لا تتناول الأدوية في العتمة! تتحقق من طابع الدواء ومن الجرعة في كل مرة تتناول فيها دواء. ضع النظارات الطبية إذا كنت بحاجة لها. إذا توفرت لديك أستنة إضافية حول استعمال الدواء، استشر الطبيب أو الصيدلي.

4. الأعراض الجانبية:

كما في كل دواء، قد يسبب استعمال أورفادين كبسولات صلبة أعراضًا جانبية لدى قسم من المستعملين. لا تجزع عند قراءة قائمة الأعراض الجانبية من المحمّل إلا تعانى من أي منها.

في حال لاحظت أعراضًا جانبية تتعلق بالعينين، تكلم مع طبيبك فوراً من أجل فحص العينين. العلاج بواسطة nitisinone يؤدي إلى مستويات عالية من التبروزين بالدم ومن الممكن أن يؤدي لأعراض تتعلق بالعينين. هذه الأعراض تتنتج بسبب مستويات تبروزين أعلى.

أعراض جانبية شائعة (common) أعراض تظهر لدى 10-100 مستعملين من كل 100:

• التهاب بالعينين (التهاب الملتحمة)

• عدمة والتهاب بقنية العينين (كيراتيتيس)

• حساسية للضوء (رهاب الضوء) وألام العينين

أعراض جانبية غير شائعة (uncommon) أعراض تظهر لدى 1-10 مستعملين من كل 1,000:

• التهاب بالجفون (belpharitis)

أعراض جانبية إضافية:

أعراض جانبية شائعة (common) أعراض تظهر لدى 1-10 مستعملين من كل 100:

• ارتفاع مستوى صفائح الدم (تروميتوسيتونانيا) وخلايا الدم البيضاء (لوبوكابي)، نقص في نوع معين من خلايا الدم البيضاء (جرانولوميتوسيتونانيا)

أعراض جانبية غير شائعة (uncommon) أعراض تظهر لدى 1-10 مستعملين من كل 1,000:

• ارتفاع بعد خلايا الدم البيضاء (leucocytosis)

• حكة (pruritus)، التهابات في الجلد التي تصاحبها نقش الجلد (exfoliative dermatitis) وطفح إذا ظهر عرض جاني، أو تفاقمت إحدى الأعراض الجانبية أو في حال عانيت من أعراض جانبية لم تذكر في النشرة، عليك استشارة الطبيب.

بالإضافة إلى ذلك، تجنب التلقيح عن الأعراض الجانبية لوزارة الصحة بواسطة الضغط على الرابط "تبليغ عن أعراض جانبية عقب علاج دوائي" الموجود على الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة (www.health.gov.il) الذي يوجهك للنموذج المباشر للتلقيح عن أعراض جانبية، أو عن طريق دخول الرابط: <https://sideeffects.health.gov.il>

5. كيفية تخزين الدواء؟

تجنب التسمم! يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء آخر في مكان مغلق، بعيداً عن متناول أيدي و المجال رؤية الأطفال وأو الرضع وبهذا الشكل تمنع التسمم. لا تسبب التقويم بدون تعليمات صريحة من الطبيب.

لا تستعمل الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية (exp. Date) الذي يظهر على العبوة الخارجية. يشير تاريخ الصلاحية إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.

لا ترمي الأدوية بال المياه العادمة أو القمامات البنتية. اسأل الصيدلي كيف يتم رمي الأدوية التي لم تعد تستعملها. هذه التدابير تساعد في الحفاظ على البيئة.