

أجيسيرك 16 أقراص

التركيب:

يحتوي كل قرص على: 16 ملغ بيتا-هستين ثنائي الهيدروكلوريد

(Betahistine dihydrochloride 16 mg)

المواد الغير فعالة في المُستحضر - انظر للبند 6 "معلومات إضافية"

اقرأ النشرة بامعان حتى نهايتها قبل أن تستعمل الدواء. تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء. إذا كانت لديك أسئلة إضافية، توجه إلى الطبيب أو إلى الصيدلي. وُصف هذا الدواء للعلاج من أوجك. لا تعطه إلى آخرين. فهو قد يضر بهم حتى لو بدأ لك أن وضعهم الطبيّ مشابه.

1. لأيّ غرض مخصص الدواء؟

لعلاج متلازمة مينبير، لعلاج أعراض الدوار المُحيطي.

الفصيلة العلاجية: مُضادات الدوار.

يحتوي أجيسيرك على بيتاهستين وهو مُضاهيء للهيستامين المُستعمل لعلاج أعراض متلازمة مينبير:

دوخة (دوار)، رنين في الأذنين (طنين)، فقدان السمع أو صعوبة في السمع.

يعمل أجيسيرك عن طريق تحسين تدفق الدم في الأذن الداخلية، مما يقلل من تراكم الضغط.

2. قبل استعمال الدواء

لا يجوز استعمال الدواء إذا:

- كنت حساساً (أزجياً) لبيتا-هستين (المادة الفعالة) أو لأيّ واحد من المركبات الإضافية التي يحتوي عليها الدواء (انظر للبند 6).
- كنت تعاني من ورم في الغدة الكظرية (وَرَم القوائم).

تحذيرات خاصة بخصوص استعمال الدواء

قبل العلاج بأجيسيرك استشر الطبيب إذا:

- كنت تعاني من الربو
 - كنت تعاني من فرقة المعدة
 - كنت حاملاً، تعتقدين بأنك حامل أو تخططين للدخول في حمل
 - كنت مرضعة
- إذا كانت أيّ من الحالات الموصوفة أعلاه تطبق عليك، سوف ينصحك الطبيب فيما إذا كان من الأمن لك البدء في تناول أجيسيرك.
- قد يرغب الطبيب أيضاً في متابعة وضع الرّبو لديك خلال العلاج بأجيسيرك.

التداخلات/التفاعلات بين الأدوية

- إذا كنت تأخذ أو إذا أخذت في الأونة الأخيرة أدوية أخرى، بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبيب وإضافات تغذية، أخبر الطبيب أو الصيدلي بذلك. على وجه الخصوص يجب إعلام الطبيب أو الصيدلي قبل بدء العلاج بأجيسيرك إذا كنت تتناول:
- أدوية من فصيلة مثبطات أكسيداز احادي الأمين (MAOIs) لعلاج الاكتئاب أو مرض الباركنسون. قد تزيد هذه الأدوية من تأثير أجيسيرك.
 - أدوية مُضادة للهيستامين التي قد تقلل من تأثير أجيسيرك، كذلك، قد يقلل أجيسيرك من تأثير الأدوية المُضادة للهيستامين.

الأطفال والمراهقون

لا يوصى بأجيسيرك للعلاج لدى الأطفال ما دون جيل 18، وذلك لعدم وجود معطيات كافية عن السلامة والنجاعة.

استعمال الدواء والطعام
يمكن تناول أجيسيرك مع أو بعد الطعام.

الحمل والإرضاع

- لا تتناول أجيسيرك عندما تكونين حاملاً، إلا إذا قرّر طبيبك بأنّ هذا ضروري.
- من غير المعروف إذا كان أجيسيرك ينتقل إلى حليب الأم. لا ترضعي إذا كنت تتناولين أجيسيرك، إلا إذا أمرك طبيبك.

السياقة واستعمال الآلات

من غير المقترض أن يضر أجيسيرك بقدرتك على السياقة أو استعمال الآلات أو الألات. بالرغم من ذلك، تذكر أن الأمراض التي تتناول من أجلها هذا الدواء (الدوار، الطنين وفقدان السمع المرتبطة بمتلازمة مينبير) يمكن أن تجعلك تشعر بالدوخة أو الغثيان، وقد تؤثر على قدرتك على سياقة وتشغيل الآلات.

3. كيف تستعمل الدواء؟

يجب الاستعمال دائماً بموجب تعليمات الطبيب. سوف يلائم الطبيب الجرعة وفقاً لوضعك الطبيّ. قد لا يكون تأثير أجيسيرك فورياً.

عليك التحقق من الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكن متأكدًا فيما يتعلق بالجرعة وطريقة العلاج بالمستحضر. الجرعة وطريقة العلاج تُحدّدان من قبل الطبيب فقط.

الجرعة الاعتيادية بشكل عام للبالغين هي: 16 ملغ ثلاث مرات في اليوم.

إذا لزم الأمر، يمكن أن تبدأ بجرعة من 8 ملغ ثلاث مرات في اليوم. في حال كان مطلوبًا جرعة من 8 ملغ يمكن استعمال مستحضرات أخرى المسجلة في إسرائيل والتي تحتوي على بيتا-هستين ثنائي الهيدروكلوريد 16 ملغ في أقراص التي يمكن شطرها للحصول على 8 ملغ.

الجرعة اليومية تتراوح بين 24 ل- 48 ملغ ويوصى بأن تُقسم إلى ثلاث جرعات بشكل متساوي على مدار اليوم وذلك للتأكد من أن مستوى الدواء في جسمك ثابت.

حاول تناول الأقراص في نفس الوقت في كل يوم.

لا يجوز تجاوز الجرعة الموصى بها.

طريقة تناول: يجب بلع الدواء مع ماء. من المستحسن تناول الدواء مع الطعام.

سحق/شطّر/مضغ: لتسهيل البلع، يمكن شطر القرص للاستعمال الفوري إذا لزم الأمر. يجب بلع كلا النصفين واحداً تلو الآخر فوراً بعد الشطر. لا توجد معلومات بشأن السحق والمضغ.

إذا تناولت عن طريق الخطأ جرعة أعلى

إذا تناولت جرعة مفرطة أو إذا بلغ طفلك أو شخص آخر من الدواء عن طريق الخطأ، توجه فوراً إلى الطبيب أو إلى غرفة الطوارئ في المستشفى وأحضر عبوة الدواء معك.

إذا نسيت تناول الدواء

إذا نسيت تناول هذا الدواء في الوقت المحدد، لا يجوز تناول جرعة مضاعفة للتعويض عن الجرعة المنسية. خذ الجرعة التالية في الوقت الاعتيادي واستشر الطبيب.

يجب المواومة على العلاج بموجب ما أمرك به الطبيب. حتى لو طرأ تحسن على حالتك الصحية، لا يجوز التوقف عن العلاج بالدواء دون استشارة طبيبك.

لا يجوز تناول أدوية في الظلام! تحقّق من المصق والجرعة في كل مرة تتناول بها دواء. ضع النظرات الطبية إذا كنت بحاجة إليها.

إذا كانت لديك أسئلة إضافية فيما يتعلق باستعمال الدواء، استشر الطبيب أو الصيدلي.

4. الأعراض الجانبية

كما في أيّ دواء، قد يسبب أجيسيرك أعراضاً جانبيةً لدى

جزء من المستخدمين. لا تفزع من قراءة قائمة الأعراض الجانبية. قد لا تعاني من أي واحد منها.
يجب إيقاف الاستعمال والتوجه فوراً إلى الطبيب إذا ظهرت الأعراض الجانبية التالية:
ردود فعل أرجية على سبيل المثال:
• طفح أحمر في الجلد أو التهاب وتهيج في الجلد.
• انتفاخ في الوجه، في الشفتين، في اللسان أو في العنق. قد تسبب تلك صعوبات في التنفس.

أعراض جانبية شائعة (تظهر لدى 1-10 مستخدمين من بين 100):

غثيان، صعوبات في الهضم، آلام رأس.
أعراض جانبية إضافية:
تهيج، طفح، شرى (رد فعل أرجي لأوعية الدم في الجلد)، اضطرابات معتدلة في الجهاز الهضمي مثل تقيؤات، أوجاع في البطن وشعور بالانتفاخ في البطن.
إن تناول أجيبرك مع الطعام سوف يساعد على تقليل هذه الأعراض.
إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقم أحد الأعراض الجانبية، أو عندما تعاني من عرض جانبي لم يُذكر في النشرة، عليك استشارة الطبيب.

5. كيف تخزن الدواء؟

- تجنب التسمم! يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء آخر في مكان مغلق بعيداً عن متناول أيدي ونظر الأطفال و/أو الرضع، وبذلك تمنع التسمم. لا تسبب التقيؤ بدون أمر صريح من الطبيب.
- لا يجوز استعمال الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية (exp. date) الذي يظهر على العبوة. تاريخ انتهاء الصلاحية يرجع إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.
- يجب التخزين في مكان بارد، ما دون 25 درجة مئوية.
- يجب الوقاية من الضوء ومن الرطوبة.
- لا يجوز إلقاء الأدوية بواسطة مصرف المجاري أو النفايات المنزلية. اسأل الصيدلي عن كيفية التخلص من الأدوية التي لم تعد قيد الاستعمال. هذه الوسائل سوف تساهم في الحفاظ على البيئة.

6. معلومات إضافية

- إضافة للمادة الفعالة يحتوي الدواء أيضاً على:
Microcrystalline cellulose, Mannitol, Talc, Citric acid monohydrate, Silica colloidal anhydrous
- كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العبوة:
أقراص معبئة في لويحات (بليسترات). كل عبوة تحتوي على 30 قرص.
- الأقراص مستديرة، بلون أبيض، ومعلمة بخط شطر في جانب واحد وفي الجانب الثاني بختم "أجيبرك".
- المنتج وصاحب التسجيل: پريجو إسرائيل مستحضرات دوائية م.ض.، ص.ب. 16، يروحام.
- تم التنقيح في حزيران 2020.
- رقم تسجيل الدواء في سجل الأدوية الحكومي في وزارة الصحة: 5687.27365.
- للتبسيط وتسهيل القراءة، تمت صياغة هذه النشرة بصيغة المذكور. لكن الدواء مُخصص لكلا الجنسين.