



سايتوتك™ 200 مكغ أقراص

تحتوي كل قرص على:

ميسوپروستول 200 mcg (misoprostol 200 mcg)
للقائمة الماء غير الفعالة ونبضات الحساسية، انتظار البند 2 "معلومات مهمة عن قسم من مركيبات الدواء والبند 6 "معلومات إضافية".

أقرأ النشرة بتمعن حتى نهايتها وذلك قبل البدء باستعمال الدواء. تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء. إذا كانت لديك أسئلة إضافية، توجه إلى الطبيب أو الصيدلي.

وصف هذا الدواء لعلجك. لا تتعطه للأخرين؛ لأنّه قد يضرّهم، حتى لو بدا لك تشابه بين حالتك الطبيعية وحالتهم.

هذا الدواء غير مخصوص للأطفال والمرأهقين دون سن 18 سنة.

1. لم أخذ هذا الدواء؟

• لعلاج قرحة المعدة أو قرحة الإثنى عشر.

• لعلاج ومنع البروز، القرحات أو الأفات في المعدة/الإثنى عشر نتيجة استعمال المستحضرات المصادة للالتهاب الاستيرويدية (NSAIDs)، عند استعمال مستحضرات NSAIDs لفترة طويلة.

• للعلاج الممنوع مع مفهوم يسمونه لاقف العمل - بموجب مصادقة من لجنة إيقاف العمل وفق قانون العقوبات 1977.

• فتيل العمل في الثلث الأول من الحمل:

يهدف الاستعمال إلى إفراغ الرحم في حالات فشل العمل في الثلث الأول من الحمل، بما في ذلك: عرض كيس العمل داخل الرحم، ونقص الصدى المنعكس من الجنين، إجهاض فانت (missed abortion) حتى الأسبوع 11+6، وطول الجنين 40 ملم) أو إجهاض غير كامل.

يُستخدم المستحضر بعد إثبات وجود كيس العمل داخل الرحم، والتخطي المتعلق بفشل العمل الموكد. يمكن استعمال المستحضر لهذا الهدف في إطار العلاج الإسعافي (ambulatory).

في إيقاف العمل بعد استعمال مفهومين. هناك حاجة إلى موافقة واعية ومتأنية طيبة.

• لتبين وتوسيع عنق الرحم للقيام بإجراءات في الرحم، مثل: كشط الرحم، تنظير الرحم، إدخال لول رحمي، وما شابه، وذلك استناداً إلى اعتبارات سريرية. يمكن استعمال المستحضر لهذا الهدف في إطار العلاج الإسعافي.

طريقة الإعطاء - مهبلية (vaginal)، تحت اللسان، عبر الخد (عن طريق تجويف الفم)، فموية (الابتلاع عبر الفم)، أو شرجية (عن طريق فتحة الشرج) والجرعة تحدده حسب قرار الطبيب المعالج.

المجموعة الجاهزة:

تحتوي سايتوتك™ على ميسوپروستول، الذي يشبه مركباً كيميائياً يدعى بروستاجلاندينين الذي ينتجه جسمك بشكل طبيعي. تنتفع البروستاجلاندينات في العدة والأمعاء، وتساعد في الحفاظ على غطاء الجهاز الهضمي (الطبقة المخاطية).

يتنفس سايتوتك™ إلى مجموعة أدوية تُعرف بمضادات القرحات.

يمكن أن تساعد أقراص سايتوتك™ في منع حدوث القرحات في المعدة أو في القرحات نتيجة تناول مستحضرات الالتهابات وفيه داعي: الإثنى عشر. يمكن أن تحدث القرحات التي تؤدي إلى انسداد كمية البروستاجلاندينات في المعدة والمعوي، ما قد يؤدي إلى مشاكل في الهضم وحدوث قرحيات. تستبدل أقراص سايتوتك™ هذه البروستاجلاندينات وتساعد على حماية المعدة والأمعاء، وهذا يمكن تعبئته تناول القرحات.

NSAIDs. يخفض سايتوتك™ أيضاً مستوى الحمض ويرفع البيكريلونات (ثنائي الكربونات) في إفرازات المعدة.

2. قبل استعمال الدواء
ممنوع استعمال الدواء إذا:

X كانت لديك أدوية حساسية (أرجية) للمادة الفعالة أو لأيٍ من المكونات الإضافية التي يحتوي عليها الدواء أو لأدوية الأخرى التي تحتوي على نظائر البروستاجلاندينات (انظر الفصل 6).

X كانت امرأة في سن الإخصاب، ولا تستعملن وسائل ناجحة لمنع الحمل لكي تتجنبي أن تصبحي حاملاً (انظري الفصل "الحمل والإرضاخ"، لمزيد من المعلومات)، إذا كنت حاماً، تناولين أن تصبحي حاملاً أو إذا لم يكن تتجنبي فخص الحبل سلبياً لأن العلاج قد يسبب الإهاض، والولادة المبكرة أو

العاءات الحادة لدى المولود (انظري الفصل "الحمل والإرضاخ"، لمزيد من المعلومات)، فيما عدا حالات العلاج الممنوع مع مفهوم يسمونه لاقف العمل.

- بموجب مصادقة من لجنة إيقاف العمل وفق قانون العقوبات 1977.

X كانت مرضعة (يمكن أن يسبب العلاج الإسهال لدى طفلها).

تحذيرات خاصة متعلقة باستعمال الدواء

قبل استعمال سايتوتك™ أغير/آخر الطبيب إذا:

• كنت حاماً أو تخطيطن للحمل (انظري الفصل "الحمل، الإرضاخ والخصوبة").

- بسبب الخطر على الجنين، يجب إيقاف علاجك فوراً.
- كت امرأة في سن الإخصاب (انظري الفصل "الحمل، الإرضاخ، والخصوبة")، وقد تصبحين حاملاً خلال فترة العلاج بالدواء. بسبب الخطر على الجنين، من المهم استعمال وسائل من حمل ناجحة أثناء العلاج بالدواء.
- كانت تعاني من مرض قلبي، ضغط مرتفع أو منخفض أو من مرض في الأوعية الدموية.
- كانت تعاني من مرض التهابي في الأمعاء.
- كانت تعاني من خلل في أيام الكلى.
- كانت لديك قليلة للتعرض للجفاف.

إذا كنت امرأة شابة قبل سن انقطاع الطمث، سوف يصف الطبيب لك سايتوتك™ فقط إذا كان متأكداً من أنه معرضة لخطر عالٍ لتطور قرحة نتيجة استعمال مستحضر

مضاد للالتهاب غير ستراتيجي خاص بك.

الأطفال والمهارهقون

سايتوتك™ معد لاستعمال فقط لدى البالغين فوق سن 18 عاماً.

الفحوصات والمتابعة

يجب إجراء فحص مد للحمل للتأكد من أن النتيجة سلبية قبل بدء العلاج لدى النساء اللواتي قد يصبحن حوانل أثناء العلاج بالدواء.

التفاعلات بين الأدوية

إذا كنت تتناول، أو تناولت مؤخراً، أدوية أخرى، بما فيها أدوية دون وصفة طبية ومكملات غذائية، أخير الطبيب أو الصيدلي بذلك، لا سيما إذا كنت تتناول:

- أدوية مضادة للحموضة تحتوي على مغبيسيوم نظراً لأن الدم قد يسبب تفاقم الإسهال.
- أدوية من عائلة مضادات الالتهاب غير الستيرويدية (NSAIDs) لأنه في حالات نادرة قد يسبب الدمج تورماً في راحتي القولون أو البين وارتفاع إنزيمات الكبد.
- أدوية لعلاج أمراض القلب.

استعمال الدواء والغذاء

يجب تناول الدواء بعد الطعام.

الحمل، الإرضاخ والخصوبة

لا يجوز استعمال الدواء إذا كنت حاماً، تخطيطن للحمل أو مرضعة (فيما عدا في حالات العلاج الممنوع مع مفهوم يسمونه لاقف العمل - بموجب مصادقة من لجنة إيقاف العمل، وفق قانون العقوبات 1977).

سيخبرك طبيبك المخاطر إذا أصبحت حاماً، لأن سايتوتك™ قد يسبب الإهاض، الولادة المبكرة أو العاهات الخلقية. لدى النساء الحوامل اللواتي تعرضن لهذا الدواء في الثلث الأول من الحمل، شوهد ارتفاع في العاهات الخلقية بمعدل 3 أضعاف تقريباً، خاصة شلل في الوجه، اهاتات في الأطراف، شدود (anomaly) في الدماغ والجمجمة. إذا تعرضت لسايتوتك™ أثناء الحمل، استشيري طبيبك. إذا قررت متأنية العمل، يجب إجراء متأنية مكثفة وفحوصات أولتراسوند متكررة قبل الولادة مع الاهتمام بشكل خاص بالأطراف والرأس.

يتبعين على النساء اللواتي قد يصبحن حوانل أثناء فترة العلاج بالدواء أن يستعملن وسائل منع حمل مؤوث بها، لأن سايتوتك™ قد يسبب إجهاضاً أو ضرراً في الرحم.

يكون الخطر على الرحم أكبر في المراحل المتقدمة من الحمل، إذا اجتررت عملية قصورية في المرضى أو إذا أخذت حمضة أطفال أو أكثر. إذا كنت تتناولين أن تصبحي حاماً، استشيري طبيبك لأنك سوف تخدعيني إلى إيقاف العلاج بسايتوتك™.

إذا كنت امرأة شابة قبل سن انقطاع الطمث، سوف يصف لك طبيبك سايتوتك™ فقط إذا كنت معرضة لخطر تطور قرحة نتيجة استعمال مستحضرات مضادة للالتهاب غير ستراتيجي (NSAIDs).

السيادة واستعمال الماكولات

قد يسبب الدواء دوخة، لهذا يتطلب استعماله توخي الحذر أثناء السيادة وتشغيل الماكولات الخطرية، حتى تعرف كف يوثر الدواء فيك.

معلومات مهمة عن قسم من مركيبات الدواء

يحتوي سايتوتك™ على أقل من 1 مليمول من الصوديوم (23 ملг) في القرص. لهذا يعتبر "خاليًا من الصوديوم".

3. كيف تستعمل الدواء؟

يجب استعمال المستحضر دائمًا حسب تعليمات الطبيب. عليك أن تتحقق من الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكون متأكداً فيما يتعلق بالجرعة وطريقة العلاج بالمستحضر.

الجرعة وطريقة العلاج يحدّثهما الطبيب فقط.

يُمنع تجاوز الجرعة الموصى بها.

لا يجوز سحق/شطر/مضغ الدواء. لأن تاثير طرق الإعطاء هذه لم تُتحقق بعد.

إذا تناولت جرعة مفرطة أو إذا أبلغت ولد خطأ من هذا الدواء، توجه حالاً إلى الطبيب أو إلى عيادة الطوارئ التابعة للمستشفى مصطحبة عينة الدواء.

إذا نسيت تناول هذا الدواء في الوقت المحدد، عليك تناول جرعة فور تذكرك، إلا إذا أنت لا تتناول الجرعة القادمة. ولكن لا يجوز إطلاقاً تناول جرعة مضاعفة.

يجب الدواه على العلاج وفق توصيات الطبيب.

حتى إذا طرأ تحسن على حالتك الصحية، لا يجوز لك التوقف عن استعمال الدواء من دون استشارة الطبيب.

يُمنع تناول الأدوية في الظلام! تتحقق من الملصق على عبوة الدواء ومن المرجوة الدوائية في كل مرة تتناول فيها دواء، ضع النظارات الطبية إذا كنت بحاجة إليها. إذا كانت لديك أسلنة إضافية تتعلق باستعمال الدواء، استشر الطبيب أو الصيدلي.

4. الأعراض الجانبية

مثل أي دواء، قد يسبب استعمال سايتوتك™ أعراضًا جانبية لدى بعض المستخدمين، لهذا لا تفزع عند قراءة قائمة الأعراض الجانبية، فقد لا تعاني منها.

يجب التوقف عن الاستعمال والتوجه فوراً لتلقي مساعدة طبية وذلك في حال حدوث رد فعل تحسسي:

- توরم الوجه، الشفتين، اللسان أو الحنجرة (angioedema).

• صعوبة في التنفس

• توrim الأطراف (الددين وراحتي القدمين) وجود علامات على صدمة ناقية (فرط التحسس الحاد تجاه مركيبات المستحضر الذي قد يسبب هبوط ضغط الدم حتى فقدان الوعي).

يجب التوجه إلى الطبيب فوراً إذا:

- عانيت من نزيف حاد متواصل أو مؤلم.

- عانيت من تقلصات استثنائية في الرحم.

تم الإبلاغ عن الأعراض التالية عند استعمال سايتوتك™:

أعراض جانبية شائعة جداً (تحتوى لدى أكثر من 1 من أصل 10 مستعملين):
طفح حاردي، اسهال. الإسهال هو العارض الجانبي الأكثر شيوعاً، ويكون حاداً أحياناً.
ينخفض احتمال الصداع بالإمساك عند تناول سايتوتك™ مع الطعام.

أعراض جانبية شائعة (ظهور لدى حتى 1 من بين 10 مستعملين):
اضطرابات في الهضم، غثيان، تقيؤات، ألم في البطن، توّرم، إمساك، دوخة، صداع،
وعاهات خلقية (ضرر لدى الجنين). إذا أصبحت حاماً خلال العلاج بالدواء، توقفي
فوري عن استعمال العلاج بسيتوتك™، واستشيري الطبيب.

أعراض جانبية ليست شائعة (ظهور لدى حتى 1 من بين 100 مستعمل):
دوره شهرية غير منتظمة، اضطرابات في الدورة الشهرية، حمى، ألم حاد في
الرحم، نزيف مهبلي لدى النساء بعد سن انقطاع الطمث (menopause).

أعراض جانبية نادرة (ظهور لدى حتى 1 من بين 1,000 مستعمل):
تشنجات، تمزق نسيج رحم (انقباب الرحم)، بعد إعطاء بروستاتاجلوبينات في الثلث الثاني أو الثالث من الحمل، لا سيما لدى النساء اللواتي أجنبن في الماضي أو النساء اللواتي لديهن نسبة بعد عملية قيصرية، لهذا عليهن التوجه لتلقي مساعدة طبية طارئة.

أعراض جانبية إضافية ذات وتيرة غير معروفة (لم يحدد شيوخها بعد): ردود فعل تحسسية (فرط التحسس)، بما في ذلك: توّرم الوجه، وراحتي القدمين، الوجه، الشفتين، اللسان أو الحنجرة الذي قد يسبب صعوبة كبيرة في التنفس؛ نزيف حاد متواصل أو مؤلم؛ قشريررة؛ ارتفاع درجة حرارة الجسم، تشنجات استثنائية في

5. كيف يُخزن الدواء؟

- تجنب التسمم: يجب حفظ هذا الدواء، وكل دواء آخر، في مكان مغلق، بعيداً عن متناول أيدي ومحال رؤية الأولاد وأو الأطفال، وهكذا تجنب التسمم. لا تُثبتب التقويم دون تعليمات صريحة من الطبيب.
- يُمنع استعمال الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية (exp. date) (الظاهر على العبوة). تاريخ انتهاء الصلاحية ينبع إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.
- يجب تخزين الدواء بدرجة حرارة أقل من 30°C.

6. معلومات إضافية

إضافة إلى المادة الفعالة، يحتوي الدواء أيضًا على:

Microcrystalline cellulose, hydroxypropyl methyl cellulose, sodium starch glycolate, milled hydrogenated castor oil flake.

كيف يبدو الدواء وماذا تحوي العبوة:

سيتوتك™ 200 مكغ: قرص سداسي الشكل لونه أبيض-كريمي.

صاحب التسجيل و عنوانه: فايزر بي. إف. إيه فارماسيتيكا إسرائيل م.ض، شارع

شنkar 9، هرتسليا بيترور 46725

اسم المنتج و عنوانه: بيراميل هيلتكير UK م.ض، نورثمبرلاند، UK.

رقم تسجيل الدواء في سجل الأدوية الرسمي في وزارة الصحة:

سيتوتك™ 200 مك: 037.78.25161

لتيسبيط هذه النشرة وتسهيل قراءتها، ورد النص بصيغة المذكورة. على الرغم من ذلك،
الدواء معد لأنباء كلا الجنسين.

تم تحريرها في 11/2020.