

**روسيا**

20 مل/0.2 مل, 40 ملخ/0.4 مل, 60 ملخ/0.6 مل, 100 ملخ/0.8 مل, 100 ملخ/1.0 مل  
ملحق جاهزة للاستعمال  
كل محتفظة جاهزة للاستعمال ذات نظام أمان تحتوي على:  
إينوكساريدين صوديوم 20 ملخ, 40 ملخ, 60 ملخ أو 100 ملخ  
Enoxaparin Sodium 20 mg, 40 mg, 60 mg, 80 mg or 100 mg

للماء الماء الغير فعالة, رجاءً انظر البند 6.

اقرء النشرة بتمعن حتى تهابها قبل استعمال الدواء. تحتوي هذه النشرة على معلومات ملخصة عن الدواء. إذا كان لديك أسلحة إضافية، توجه إلى الطبيب أو إلى الصيدلي.

وَصْفَ هَذَا الدَّوَاء مِنْ أَجْلِ عَلَاجِكَ، لَا تَعْطِهُ إِلَى أَخْرَيْنَ. فَهُوَ قَدْ يُسَبِّبُ الضررَ لَهُمْ حَتَّى إِذَا بَدَأُوكَمَ الْجَنِّيَّةَ

التنفس، انتفاخ الشفتين، الفم، الحلق أو العينين).

يُعطى كروسيلا على حسب الجرعة الموصوفة في كل مرة تحقن فيها دواء. ضع نظارات إذا كنت بحاجة إليها.

لا يجوز حقن أدوية في الظل! تحقق من الملصق والجرعة في كل مرة تحقن فيها دواء. ضع نظارات إذا كنت بحاجة إليها.

إذا كانت لديك أسلحة إضافية حول استعمال الدواء، استشر الطبيب أو الصيدلي.

**4. الأعراض الجانبية**

كما في كل دواء قد يسبب استعمال كروسيلا أعراض جانبية لدى جزء من المستخدمين. لا تفزع من قراءة قائمة الأعراض

الجانبية. من الممكن أن لا تتعافى من أي واحدة منها.

كما في أدوية مشابهة أخرى (أدوية تقليل تذكر الدم)، قد يسبب استعمال كروسيلا تزيقاً الذي قد يكون مهدداً للحياة في بعض الحالات لا يمكن رؤيتها التالية.

إذا كنت تتعافى أي حذف تزيقاً والذي لا يتوقف من تلقاء نفسه أو إذا كان لديك علامات لزيف مفرط (ضعف غير معتمد،

تعب، شحوب، دوخة، المرأس أو انتفاخ غير مفهوم). استشر طبيب فوراً.

قد يقرئ طبيبك أن ينصحك تحت إشراف أكثر قرباً أو ينذر مواتك.

يجب إيقاف استعمال كروسيلا والتوجه إلى الطبيب فوراً إذا كنت تطور علامات أياً كانت لرد فعل أرجي وخي (مثل صعوبة

في التنفس، انتفاخ الشفتين، الفم، الحلق أو العينين).

علىك اختيار الطبيب فوراً  
إذا كان لديك أي علامة لإمساد داء دموي من قبل خثرة مثل:

- ألم في أمعاء، انتفاخات، احمرار، اعراضه أو سعال مموجي - هذه هي أعراض خثار الأوردة العميق.

- ضيق تنفس، انتفاخ في أحد الرئتين، اعراضه أو سعال مموجي - هذه هي أعراض الانصمام الرئوي.

- إذا كان لديك طفح مؤلم على شكل نقاط حمراء دائرة تحت الجلد، التي لا تختفي عندما تتضخم عليها.

قد يطلب منك طبيبك القيام بفحص دم لفحص عدد الصفائح الدموية.

**أعراض جانبية شائعة جداً (أعراض التي تظهر لدى أكثر من مستخدم من بين 10)**

• ارتفاع في إنزيمات الكبد.

**أعراض جانبية شائعة (أعراض التي تظهر لدى 1-10 مستخدمين من بين 100):**

• ظهور لديك خدمات أهلية من العيادة. قد يحدث هذا الأمر بسبب مشكلة في الدم مع تعداد صفائح دموية منخفض.

• بقع روزرية على جلدك. من المرجح أن تظهر هذه في منطقة حقن كروسيلا.

• طفح في الجلد (شري، شرارة).

• جلد أحمر مثل اللحاء.

• كدمة أو ألم في موقع الحقن.

• انتفاخ في تعداد كريات الدم الحمراء.

• تعدد صفائح دموية مرتفعة.

• المرأس.

**أعراض جانبية غير شائعة (أعراض التي تظهر لدى 1-10-1 مستخدمين من بين 1,000):**

• المرأس وخيه فجائي. قد يكون هذا الأمر علامة لزيف المخاغ.

• حساسية وانتفاخ في المعدة. قد ينصحك طبيبك بقص ذلك عن طريق القيام بفحص دم.

• ارتفاع في عدد الحمضات (باليورينيزات) في الدم. يستطع طبيبك فحص ذلك عن طريق القيام بفحص دم.

• تناقض الشفاعة.

• تداخل العظام (وضع حيث تكون فيه الاحتمال أعلى لأن تكسر عظامك) بعد استعمال طبول الأحمد.

• وخز قلة احساس وضفت عضلات (خصوصاً في القسم السفلي من الجسم) حيث لا تستطيع السيطرة على موعد قضاء حاجتك.

• فقدان السيطرة على المثانة البولية أو الأمعاء (حيث لا تستطيع السيطرة على موعد قضاء حاجتك).

• كثافة صلبة أو نتوء في موقع الحقن.

إذا ظهر عرض جانبية، إذا تفاقم أحد الأعراض الجانبية أو عندما تعاني من عرض جانبية لم يذكر في النشرة، عليك استشارة الطبيب.

**التبليغ عن أعراض جانبية**

يمكن التبليغ عن أعراض جانبية لوزارة الصحة من خلال الضغط على الرابط "التبليغ عن أعراض جانبية عقب علاج دوائي" الموجود في الصفحة الرئيسية في موقع وزارة الصحة ([www.health.gov.il](http://www.health.gov.il)) الذي يوجه إلى النموذج الإلكتروني

التبليغ عن أعراض جانبية، أو عن طريق الدخول الرابط: <https://sideeffects.health.gov.il>

**5. كيفية تخزين الدواء؟**

• تجنب التسخيم: يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء آخر في مكان مغلق بعيداً عن متداول أيدي ومحال رؤية الأطفال / أو الرضيع وبذلك

تمنع التسميم. لا تنسى التقوير بعد أمر صريح من الطبيب.

• لا يجوز استعمال الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية (exp. date) الذي يظهر على ظهر العبوة والمحفنة. تاريخ انتهاء الصلاحية يرجع إلى اليوم الأخير من نفس الشهور.

• يرجى حفظ هذا الدواء في مكان مغلق بعيداً عن متداول أيدي ومحال رؤية الأطفال.

• لا تستعمل الدواء إذا كانت المحفنة ممهورة أو أن المحول غير صالح.

• كروسيلا محاصرة في الأدوية عن طريق ماء العجارة أو الماء. يجب التخلص من أي بقايا المحول الذي لم يتم استعماله.

• لا يجوز التخلص من الأدوية عن طريق ماء العجارة أو الماء. يجب التخلص من أي بقايا المحول الذي لم يتم استعماله.

• تجنب الأستعمال. هذه الوسائل تساهم في الحفاظ على البيئة.

**6. معلومات إضافية**

إضافة إلى المادة الفعالة، يحتوي الدواء أيضاً على:

Water for injections

كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العبوة:

كروسيلا هو محلول صافي، بلون شفاف-أصفر شاحب، الموجود داخل محفظة جاهزة للاستعمال مع إبرة وغطاء وأقرا.

كروسيلا 20 ملخ/0.2 مل: كل عبوة تحتوي على 20, 10, 6, 2 أو 50 محفظة.

كروسيلا 40 ملخ/0.4 مل: كل عبوة تحتوي على 20, 10, 6, 2 أو 30 محفظة.

كروسيلا 60 ملخ/0.6 مل: كل عبوة تحتوي على 24, 12, 10, 6 أو 30 محفظة.

كروسيلا 80 ملخ/0.8 مل: كل عبوة تحتوي على 24, 12, 10, 6 أو 30 محفظة.

كروسيلا 100 ملخ/1.0 مل: كل عبوة تحتوي على 24, 12, 10, 6 أو 30 محفظة.

قد لا تكون جميع أجزاء العبوات مسوقة.

صاحب التسجيل وعنوانه: سامال بيوفارما، ض، شارع همچشم 20، بيتح تكفا.

رقم تسجيل الدواء في سجل الأدوية الحكومي في وزارة الصحة: 162-88-35673.

تحصنت هذه النشرة وتم المصادقة عليها من قبل وزارة الصحة في شباط 2020.

التبليغ وتسهيل القراءة، تم صياغة هذه النشرة بصيغة المذكرة. بالرغم من ذلك، الدواء مخصوص لأبناء كلا الجنسين.

التبليغ وتسهيل القراءة، تم صياغة هذه النشرة بصيغة المذكرة.

يُنصح بالرجوع إلى النشرة قبل استخدام كروسيلا.

**7. تعليمات استعمال الدواء**

كيف تحقن نفسك بکروسيلا

إذا كنت قادر على حقن نفسك بکروسيلا، سيريك طبيب أو الممرضة كافية فعل ذلك. لا تحاول حقن نفسك إذا لم تخضع لارشد حول كيفية فعل ذلك. إذا لم تكن متأكداً مما يجب فعله، ابحث في "حقن تحقن الجلد" على تطبيق الآلام والكمادات في موقع الحقن.

سيساعد الحقن الصحيح تحث الجلد (يُدعى "حقن تحقن الجلد") على تقليل الآلام والكمادات في موقع الحقن.

قبل الحقن الذاتي لکروسيلا:

اجمع الأعراض التي أنت بحاجتها: محفظة ضمادة كحول أو صابون وماء وغطاء لجمع المحفنة.

يجب فحص عدم تضرر المحفنة وأن المحلول صالح. لا يجوز إدخال الماء في كمية الدواء التي تنتهي.

يجب فحص البطن من أشكال تعلم ما هي كمية الدواء التي تنتهي.

يجب فحص البطن من أجل رؤية فيما إذا كان الحقن السليبي قد سبب ألم إرازا، تغير في لون الجلد، انتفاخ، افراز، أو إذا كانت منطقة الحقن ما زالت تؤلمك. إذا كان الأمر كذلك، تحدث مع الطبيب أو الممرضة.

تعليمات للحقن الذاتي لکروسيلا:

تحضير موقع الحقن:

يجب اختيار منطقة في الجهة اليمنى أو اليسرى من بطنه. يجب أن تكون المنطقة المختاراة على بعد 5 سم على

الحقن التي تتحققها قبل بث الحقن.

</