

נובמבר 2020

רופא /ה, רוקח/ת נכבד/ה

לפי אתר משרד הבריאות LEVO tablets לבו טבליות
(LEVOFLOXACIN HEMIHYDRATE 500 MG)

עדכונים בעלון לצרכן

ברצוננו להודיע שהעלון לצרכן עודכן. בפירוט שלהלן כלולים העדכונים העיקריים. שאר השינויים שנעשו בעלון הינם שינויים בפורמט העלון ושינויי נוסח, ואינם מפורטים מטה. תוספות המידע מודגשות **בצהוב**

עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים (תכשירים) התשמ"ו-1986
התרופה משווקת על פי מרשם רופא בלבד.

לבו
טבליות

הרכב:

כל טבליה מצופה מכילה:
לבופלוקסאצין (כהמיהידראט) 500 מ"ג
Levofloxacin (as hemihydrate) 500 mg

לרשימת המרכיבים הבלתי פעילים, אנא ראה סעיף 6 "מידע נוסף".

קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש בתרופה.

עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח. תרופה זו נרשמה לטיפול במחלתך. אל תעביר אותה לאחרים. היא עלולה להזיק אפילו אם נראה לך כי מצבם הרפואי דומה. התכשיר אינו מיועד לילדים או למתבגרים.

1. למה מיועדת התרופה?

קבוצה תרפויטית: אנטיביוטיקה ממשפחת הפלואורוקווינולונים.

פעילות רפואית:

טיפול בזיהומים בקטריאליים הנגרמים ע"י חיידקים הרגישים לתרופה: סינוסיטיס, זיהומים במערכת הנשימה התחתונה, זיהומים בדרכי השתן ובכליות, זיהומים בעור וברקמות רכות.

2. לפני השימוש בתרופה

אין להשתמש בתרופה אם:

- אתה רגיש (אלרגי) ללבופלוקסאצין, לכל אנטיביוטיקה אחרת ממשפחת הקווינולונים כגון מוקסיפולוקסצין, ציפרופלוקסצין או אופלוקסצין או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה (ראה סעיף 6 "מידע נוסף"). סימנים לתגובה אלרגית כוללים: פריחה, בעיות בבליעה או בנשימה, נפיחות בשפתיים, בפנים, בגרון או בלשון.
- הנך סובל או סבלת בעבר ממחלת הנפילה (אפילפסיה). הנך סובל או סבלת בעבר מבעיות בגידים כגון: דלקות בגידים, שנבעו מטיפול באנטיביוטיקה מקבוצת הפלואורוקווינולונים. הגיד מחבר בין שריר ועצם.
- הנך ילד או נער מתבגר.
- הנך בהריון, עשויה להיכנס להריון או חושבת שהנך בהריון.
- הנך מיניקה.

אל תיטול את התרופה אם אחד מהמצבים מעלה מתייחס אליך. אם אינך בטוח, דבר עם הרופא או הרוקח לפני נטילת לבו.

אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה:

לפני הטיפול בלב, ספר לרופא אם:

- הנך בן 60 או יותר.
- הנך נוטל תרופות ממשפחת הקורטיקוסטרואידים, הנקראות לפעמים סטרואידים (ראה סעיף אינטראקציות/תגובות בין תרופתיות).
- סבלת מנזק מוחי עקב שבץ או פגיעה מוחית אחרת.
- יש לך בעיות בכליות. הנך סובל מחוסר באנזים 6PD (glucose – 6 – phosphate dehydrogenase) .
- G deficiency' קיים סיכוי גבוה שתסבול מבעיות חמורות בדם בעת שתיטול תרופה זו.
- הנך סובל או סבלת בעבר מבעיות בריאותיות נפשיות.
- הנך סובל או סבלת בעבר מבעיות לב. יש לנקוט זהירות כשנוטלים תרופה כזו במידה ונולדת או שיש היסטוריה משפחתית של הארכת מקטע QT (הנצפה בבדיקת ECG, רישום הפעילות החשמלית של הלב), אם הנך סובל מחוסר איזון במלחים בדם (במיוחד אם יש רמה נמוכה של אשלגן או מגנזיום בדם). אם קצב הלב שלך איטי מאוד (נקרא "בריקרדיה"), אם יש לך אי ספיקת לב, אם חווית בעבר אוטם שריר הלב (התקף לב), אם הנך אישה או קשיש או אם הנך נוטל תרופות אחרות הגורמות לשינויים לא תקינים ב-ECG (ראה סעיף אינטראקציות/תגובות בין תרופתיות).
- יש לך סוכרת.
- הנך סובל או סבלת בעבר מבעיות בכבד.
- יש לך מחלה הגורמת לחולשת שרירים חמורה (myasthenia gravis).
- יש לך בעיות במערכת העצבים (peripheral neuropathy). אובחנת עם הרחבה או בליטה של כלי דם גדול (מפרצת באבי העורקים או מפרצת פריפריאלית של כלי דם גדול).
- הייתה לך בעבר דיסקציה של אבי העורקים (קרע בדופן אבי העורקים).
- יש לך היסטוריה משפחתית של מפרצת באבי העורקים או דיסקציה של אבי העורקים או גורמי סיכון אחרים או מצבים אחרים המגבירים את הנטייה להיווצרותם (לדוגמה הפרעות של רקמת החיבור כגון תסמונת מרפן, תסמונת אהלרס-דנלוס של כלי הדם, או תסמונות וסקולריות כגון דלקת עורקים ע"ש טאקאיאסו, דלקת עורק הרקה, מחלת בכצ'ט, יתר לחץ דם, או טרשת עורקים שידועה).
- פיתחת אי פעם פריחה חמורה או קילוף חמור של העור, שלפוחיות ו/ או פצעים בפה לאחר נטילת לבופלוקסצין.
- פנה אל הרופא, האחות או הרוקח כאשר אתה נוטל פלואורוקווינולון אם:
- הינך חש בכאב פתאומי, חמור בבטן, בחזה או בגב שלך, פנה מיד לחדר מיון.

במקרים נדירים לבו יכול לגרום לכאב ודלקת בגידים, בעיקר במטופלים מבוגרים או במטופלים הנוטלים קורטיקוסטרואידים. אם הנך חש בעיה כלשהי בגידים לאחר לקיחת התרופה אנא פנה לרופא מיד.

תרופות ממשפחת הפלואורוקווינולונים, בהן לבו, עלולות לגרום להחמרה של הסימפטומים של מחלת ה-myasthenia gravis כגון החמרת חולשת השרירים או בעיות בנשימה - אם הנך חש בתופעות אלו פנה לרופא מיד.

אם אינך בטוח אם אחת מהאזהרות לעיל מתייחסת אליך, פנה אל הרופא או הרוקח לפני נטילת לבו.

ילדים ומתבגרים

התרופה אינה מיועדת לילדים ולמתבגרים.

אינטראקציות/תגובות בין תרופתיות

אם אתה לוקח, או אם לקחת לאחרונה, תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח. זאת כיוון שלבו עלולה להשפיע על פעילות של תרופות אחרות ותרופות עלולות להשפיע על פעילות לבו.

במיוחד יש ליידע את הרופא או הרוקח אם אתה לוקח את התרופות הבאות, וזאת מכיוון ששילוב זה יכול להגדיל את הסיכון להופעת תופעות לוואי:

- קורטיקוסטרואידים, נקראים לפעמים סטרואידים -משמשים לטיפול בדלקות. הנך עלול להיות בסיכון גבוה יותר לדלקת ו/או קרע בגידים.
- וורפרין - משמש לדילול דם. הנך עלול להיות בסיכון גבוה יותר להופעת דימום. ייתכן שהרופא שלך יצטרך להפנות אותך לבדיקות דם סדירות, כדי לבדוק את יכולת הקרישה של הדם שלך.
- תיאופילין/טיפול בבעיות נשימה. הנך בעל סיכוי גבוה יותר לסבול מפרקוס בנטילה משולבת עם לבו.
- תרופות נוגדות דלקת לא סטרואידיות-המשמות למצבי כאב ודלקת כגון אספירין, איבופרופן, פנבופן, קטפורפן ואינדומטצין. הנך בעל סיכוי גבוה יותר לסבול מפרקוס בנטילה משולבת עם לבו.
- ציקלוספורין (לשימוש לאחר השתלת איברים) - נטילתו יחד עם לבו עלולה להגביר את תופעות הלוואי של ציקלוספורין.
- תרופות המשפיעות על אופן פעימות הלב. לרבות תרופות לטיפול בקצב לב לא תקין (תרופות אנטי-ארייתמיות כגון: קווידין, הידרוקווינין, דיסופיראמיד, סוטלול, דופטיליד, איבוטיליד ואמיאודארון), תרופות לטיפול בדיכאון (נוגדי דיכאון טריציקליים, כגון: אמיתריפטילין ואימיפרמין), תרופות לטיפול בהפרעות

פסיכיאטריות (תרופות אנטי פסיכוטיות), תרופות לטיפול בזיהומים חיידקיים (אנטיביוטיקות מקבוצת ה"מקולידים", כגון: אריתרומיצין, אזיתרומיצין וקלריתרומיצין).

- פרובנציד לטיפול בשיגדון. ייתכן שהרופא שלך ייתן לך מינון נמוך יותר, אם יש לך בעיות בכליות.
- סימטידין - לטיפול בצרבת ובכיבים במערכת העיכול. ייתכן שהרופא שלך ייתן לך מינון נמוך יותר, אם יש לך בעיות בכליות.
- ספר לרופא שלך אם אחד מהמצבים לעיל מתייחס אליך. אין לקחת לבו טבליות באותו זמן עם התרופות הבאות, וזאת מכיוון שהדבר עלול להשפיע על פעילות הלב:

טבליות ברזל (לטיפול באנמיה), תוספי אבץ, סותרי חומצה המכילים מגנזיום או אלומיניום (ניתנים לצרבת), דיאנוזין, סוקראלפאט (לכיבים בקיבה) (ראה סעיף 3: "אם הנך נוטל טבליות ברזל, תוספי אבץ, סותרי חומצה, דיאנוזין או סוקראלפאט" בהמשך).

בדיקות שתן לאופיאטים -

בזמן השימוש בלב, קיימת האפשרות של קבלת תוצאות חיוביות שגויות בבדיקת אופיאטים בשתן. אם נשלחת לבדיקת שתן, ספר לרופא שהנך נוטל לב.

בדיקות לשחפת -

בזמן השימוש בלב, עלולות להתקבל תוצאות שליליות שגויות בבדיקות מעבדה מסוימות לחיפוש החיידק הגורם לשחפת.

בדיקות סוכר -

בחולי סוכרת המטופלים בתכשירים נוגדי סוכרת פומיים או אינסולין יש לעקוב אחר רמות הסוכר בדם.

שימוש בתרופה ומזון - ניתן ליטול את התרופה עם הארוחה או בכל זמן בין הארוחות.

הריון והנקה -

אין להשתמש בלב אם:

הנך בהריון, עשויה להיכנס להריון או חושבת שהנך בהריון.

הנך מניקה או מתכננת להניק.

נהיגה ושימוש במכונית:

הנך עלול לסבול מתופעות לוואי לאחר נטילת תרופה זו הכוללות תחושות של סחרחורת, ישנוניות, תחושת סחרור (ורטיגו) או שינויים בראייה. חלק מתופעות לוואי אלו עלול להשפיע על היכולת שלך להתרכז ועל מהירות התגובה שלך. אם זה קורה, אין לנהוג או לעסוק בפעילות כלשהי המחייבת רמה גבוהה של תשומת לב.

3 כיצד תשתמש בתרופה?

תמיד יש להשתמש לפי הוראות הרופא.

עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אינך בטוח.

המינון ואופן הטיפול ייקבעו על ידי הרופא בלבד.

המינון המקובל בדרך כלל הוא:

דלקת ריאות: טבליה אחת של לבו פעם או פעמיים ביום.

דלקות בדרכי השתן: טבליה אחת של לבו פעם ביום.

זיהום בעור או ברקמות סמוכות, זיהום בשריר: טבליה אחת של לבו פעם או פעמיים ביום.

מבוגרים וקשישים עם בעיות בכליות

ייתכן והרופא ירשום לך מינון נמוך יותר. אין לעבור על המנה המומלצת.

אין לתת תרופה זו לילדים או למתבגרים.

יש לבלוע את התרופה עם מעט מים.

במידת הצורך ניתן לחצות את הטבליה לשימוש מידי. אין מידע לגבי כתישה או לעיסה של הטבליה.

אם הנך כבר נוטל טבליות ברזל תוספי אבץ, סותרי חומצה, דיאנוזין או סוקראלפאט, אין לקחת תרופות

אלה באותו זמן עם טאבניק. יש לחכות פרק זמן של שתיים לפחות לפני או לאחר נטילת טאבניק.

הגן על עורך מפני השמש

יש להימנע מחשיפה ישירה לשמש במהלך הטיפול בתרופה זו ובמשך יומיים נוספים לאחר שהנך מפסיק לקחת

אותה. זאת מכיוון שהעור שלך ייהפך לרגיש יותר לשמש ועלולים להגרם כוויות, עקצוץ או שלפוחיות חמורות

אם לא תנקוט באמצעי הזהירות הבאים:

• יודא שהנך משתמש בקרם עם מקדם הגנה גבוה

• חבוש תמיד כובע ובגדים המכסים את הזרועות והרגליים שלך

• הימנע משימוש במיטות שיזוף אם נטלת בטעות מינון גבוה יותר

אם נטלת בטעות מינון גבוה יותר או אם בטעות בלע ילד מן התרופה, פנה מיד לרופא או לחדר מיון של בית-חולים, והבא אריזת התרופה אתך. זאת על מנת שהרופא ידע מה נטלת. במינון יתר הנך עלול לסבול מהתופעות הבאות: התקפי פרכוסים, בלבול, סחרחורת, ירידה בהכרה, רעד ובעיות בלב- העלולים להוביל לאי סדירות בדופק, בחילה או תחושת צריבה בקיבה.

אם שכחת ליטול את התרופה בזמן הדרוש קח את התרופה מיד כשנזכרת, אלא אם כן הגיע הזמן ליטול את המנה הבאה. אין ליטול מנה כפולה על מנת להשלים את המנה שנשכחה.

יש להתמיד בטיפול כפי שהומלץ על ידי הרופא. גם אם חל שיפור במצב בריאותך, אין להפסיק הטיפול בתרופה ללא התייעצות עם הרופא או הרוקח.

אם אתה מפסיק את נטילת התרופה

אין להפסיק את נטילת התרופה רק כי אתה מרגיש טוב יותר. חשוב שתשלים את הטיפול כפי שנרשם על ידי הרופא. אם תפסיק את הטיפול מוקדם מדי, הזיהום עלול לחזור, מצבך עלול להחמיר או שהחיידיק עלול לפתח עמידות לתרופה.

אין ליטול תרופות בחושך! בדוק התווית והמנה בכל פעם שהינך נוטל תרופה. הרכב משקפיים אם הינך זקוק להם.

אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היוועץ ברופא או ברוקח.

4. תופעות לוואי

כמו בכל תרופה, השימוש בבלבו עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשימת תופעות הלוואי. ייתכן ולא תסבול מאף אחת מהן. תופעות אלו הן בדרך כלל קלות או בינוניות ולעיתים קרובות נעלמות לאחר זמן קצר.

יש להפסיק את השימוש בבלבו ולפנות מיד לרופא או לבית חולים אם הנך סובל מתופעות הלוואי הבאות:
נדיר מאוד (תופעות שיכולות להופיע ב-עד מטופל 1 מתוך 10,000):

- תגובה אלרגית. הסימנים יכולים לכלול: פריחה, קשיי נשימה או בליעה, נפיחות בפנים, בשפתיים, הגרון או בלשון.

יש להפסיק את השימוש בבלבו ולפנות מיד לרופא אם הנך מבחין באחת מתופעות הלוואי החמורות הבאות- ייתכן ותזדקק לטיפול רפואי דחוף:

נדיר (תופעות שיכולות להופיע ב-עד מטופל 1 מתוך 1,000)
נדיר:

- שלשול מימי, אשר עלול להיות דמי, ייתכן ומלווה בהתכווציות בבטן וחום גבוה. אלה עלולים להיות תסמינים של בעיה חמורה במעי.
- כאב או דלקת בגידים או ברצועות, אשר עלולים להוביל לקריעתם. גיד אכילס (בעקב) מושפע לעיתים קרובות יותר מגידים אחרים.
- פרכוסים.
- ראיית או שמיעת דברים שאינם קיימים (הזיות, פרנויה), שינוי בדעתך ובמחשבותיך (תגובות פסיכוטיות) עם סיכון למחשבות או מעשים אובדניים.
- תחושת דיכאון, בעיות נפשיות, חוסר שקט, חלומות מזרזים או סיוטים.
- ירידה ברמות הסוכר בדם (היפוגליקמיה) או ירידה ברמות הסוכר בדם המובילה לתרדמת (תרדמת היפוגליקמית). מידע זה חשוב עבור אנשים הסובלים מסוכרת.

נדיר מאוד:

- תחושת בעירה, עקצוץ, כאב או חוסר תחושה. אלה עלולים להיות תסמינים של 'ניורופתיה'.

תופעות לוואי שכיחות אינה ידועה (תופעות שכיחותן טרם נקבעה)

- פריחות עור חמורות הכוללות תסמונת סטיבנס-ג'ונסון ו'טוקסיק אפידרמל נקרוליזיס' (TEN). אלה יכולים להופיע ככתמים דמויי מטרה אדמדמים או כתמים עגולים, לעיתים קרובות עם שלפוחיות במרכזם, קילוף עור, כיב בפה, בגרון, באף, באיברי המין והעיניים ויתכן שיקדים אותם חום ותסמינים דמויי שפעת, רא סעיף 2.
- איבוד התיאבון, הצהבת העור והעיניים, צבע שתן כהה, גירוד או רגישות בבטן, אלו עלולים להיות סימנים של בעיות בכבד אשר עלולות לכלול כבדי קטלני.

אם ראייתך נפגעה או הנך סובל מהפרעה כלשהי בעיניים בזמן הטיפול בבלבו, יש להתייעץ באופן מיידי עם רופא עיניים.

התייעץ עם הרופא אם אחת מתופעות הלוואי הבאות מחמירות או נמשכת יותר ממספר ימים:
שכיח (תופעות שיכולות להופיע ב-עד מטופל 1 מתוך 10)

- בעיות שינה
- כאבי ראש, תחושת סחרחורת
- בחילות, הקאות ושלוש
- עליה באנזימי כבד מסויימים בדם.

לא שכיח (תופעות שיכולות להופיע בעד מטופל 1 מתוך 100)

- שינויים במספרם של חיידקים או פיטריות נוספים, זיהום ע"י פטריה שנקראת קנדידה שניתן וידרוש טיפול.
-
- שינויים במספר תאי הדם הלבנים בתוצאות בדיקות דם (לויקופניה, אאוזינופיליה).
- תחושת מתח(חרדה), תחושת בלבול, תחושת עצבנות, תחושת ישנוניות, רעד, תחושת סחרור (ורטיגו).
- קוצר נשימה (דיספניאה).
- שינויים בחוש הטעם, איבוד תיאבון, קיבה רגיזה או קשיי עיכול, כאב באזור הבטן, עצירות, תחושת נפיחות בבטן (גזים) או עצירות.
- גרדופריחה עורית, גרד חריף או סרפדת (אורטיקריה), הזעת יתר.
- כאב מפרקים או כאב שרירים.
- עלולות להופיע תוצאות חריגות בבדיקות דם עקב בעיות בכבד (עלייה בבילירובין) או בכליה (עלייה בקריאטינין).
- חולשה כללית.

נדיר (תופעות שיכולות להופיע ב- עד מטופל 1 מתוך 1,000)

- חבורות ודימומים שנגרמים בקלות בעקבות ירידה במספר טסיות הדם (טרומבוציטופניה)רמה נמוכה של תאי דם לבנים (נויטרופניה);
- תגובה מוגזמת של המערכת החיסונית (רגישות יתר).
- תחושת עקצוץ בידיים ובכפות הרגליים (פרסתזיה).
- בעיות בשמיעה (צלצולים באוזניים) ובראייה (ראיה מטושטשת).
- דפיקות לב מהירות באופן בלתי רגיל (טכיקרדיה) או לחץ דם נמוך.
- חולשת שרירים -חשוב בעיקר לחולי מיאסטנה גריביס (myasthenia gravis) – מחלה נדירה של מערכת העצבים).
- שינויים בתפקוד הכליה ולעיתים אי ספיקת כליה שעלולה לקרות כתוצאה מתגובה אלרגית של הכליה, הנקראת דלקת כליה אינטרסטיציאלית.
- חום
- **כתמי אדמנת (אריתמה) בעלי תיחום חד עם/בלי שלפוחיות, המתפתחים תוך שעות מרגע מתן לבופלוקסצין ונרפאים עם שיירי היפר-פיגמנטציה לאחר הדלקת, הדבר בדרך כלל חוזר באותו האזור של העור או הממברנה הרירית לאחר חשיפה חוזרת ללבופלוקסין.**

תופעות לואי שכיחות אינה ידועה (תופעות ששכיחותן טרם נקבעה) :

- ירידה בכדוריות הדם האדומות (אנמיה) העלולה לגרום להצהבה או לחיורון של העור עקב פגיעה בתאי הדם האדומים, ירידה במספרם של כל סוגי תאי הדם (פנציטופניה).
- חום, כאב גרון והרגשת חולי שאינה חולפת. ייתכן ונגרמים מירידה במספר תאי הדם הלבנים(אגרנוולוציטוזיס).
- **אובדן זרימת דם** (תגובה דמויית שוק אנפילקטי)
- עלייה ברמת הסוכר בדם (היפרגליקמיה) או ירידה ברמות הסוכר (היפוגליקמיה) מידע זה חשוב עבור אנשים החולים בסוכרת.
- שינויים בחוש הריח, אובדן חוש הריח או הטעם.
- בעיות בתנועתיות ובהליכה (דיסקנזיה, הפרעות אקסטרפירמידליות).
- אובדן הכרה או יציבה זמני (התעלפות)
- אובדן ראייה זמני, **דלקת בעיניים.**
- פגיעה בשמיעה או אובדן שמיעה.
- קצב לב מהיר באופן שאינו תקין,
- קצב לב לא סדיר מסכן חיים, לרבות דום לב, שינויים בקצב הלב (הנקראים "הארכת מקטע QT" אשר נצפה בבדיקת ECG, רישום הפעילות נחשמלית של הלב).
- קשיי נשימה או צפצופים (עיוות סימפונות).
- תגובות אלרגיות של הריאות.
- דלקת בלב לב.
- דלקת בכבד (הפטיטיס)
- רגישות מוגברת שלהעור לאור שמש ולאור אולטרה סגול.
- דלקת של כלי הדם בעקבות תובה אלרגית (ואסקוליטיס).
- דלקת ברירית הפה (סטומטיטיס).
- קרעים בשרירים והרס שריר (רבדומיליזיס).
- אודם ונפיחות במפרקים (דלקת מפרקים).
- כאב, כולל כאב בגב, בחזה ובגפיים.
- התקף פורפיריה בחולים עם פורפיריה (מחלה מטבולית נדירה מאוד)
- כאב ראש מתמשך עם או בלי טשטוש בראייה (עליה שפירה בלחץ התוך גולגלתי).

אם הופיעה תופעת לוואי, אם אחת מתופעות הלוואי מחמירה, או כאשר אתה סובל מתופעת לוואי שלא הוזכרה בעלון, עליך להתייעץ עם רופא.

דיווח על תופעות לוואי :

ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי עקב טיפול תרופתי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות (www.health.gov.il) המפנה לטופס המקוון לדיווח על תופעות לוואי. בנוסף, ניתן לדווח לחברת "אוניפארם בע"מ".

5. איך לאחסן את התרופה?

- מנע הרעלה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם וטווח ראייתם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעלה. אל תגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא.
- אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (exp. date) המופיע על גבי האריזה. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו חודש.
- יש לאחסן את התרופה בטמפרטורה מתחת ל- 25°C ובמקום מוגן מאור.

6. מידע נוסף

נוסף על החומר הפעיל התרופה מכילה גם:

Microcrystalline cellulose; Hydroxypropyl methylcellulose; Crospovidone; Sodium Stearyl Fumarate; Colloidal Silicon Dioxide; Opadry (white, yellow)

כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה:

לבו ארוזה בתוך מגשיות (בליסטר) אשר מוכנסות לתוך אריזת קרטון. טבליות של לבו הינן מצופות, אובליות, מוארכות עם קו חצייה מצידן האחד וצבען צהוב. עבור **לבו** קיימים גדלי אריזה של 5, 7, 10, 12 ו- 14 טבליות. לא כל גדלי האריזה משווקים

שם בעל הרישום: אוניפארם בע"מ, ת.ד. 21429 ת"א, 6121301.
שם היצרן וכתובתו: אוניפארם בע"מ, פארק תעשייה "מבוא כרמל".

מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות:

לבו: 129 35 30746 02

לשם הפשטות ולהקלת הקריאה, עלון זה נוסח בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.

נערך בנובמבר 2020

העלון לצרכן מפורסם במאגר התרופות שבאתר האינטרנט של משרד הבריאות

<http://www.health.gov.il> וניתן לקבלו מודפס ע"י פניה לבעל הרישום.

נבקש כי תיידע את המטופלים והלקוחות שלך אשר נוטלים את התרופה בשינויים שנעשו בעלון.