

نشرة طبية للمستهلك بموجب أنظمة الصيادلة (مستحضرات) 1986

يُسوق هذا الدواء بدون وصفة طبيب
مينيرالي محلول للشرب يحتوي كل 1 مل على:

چلوكوز مونوهيدرات 14.85 ملغم
كلوريد الصوديوم 2.70 ملغم
بوتاسيوم كلوريد 1.50 ملغم
سيترات الصوديوم 2.20 ملغم

لا يجوز استعمال الدواء إذا:

- كانت لديك حساسية (أرجية) للمواد الفعالة أو لأي واحد من المركبات الأخرى التي يحتوي عليها الدواء (انظر البند 6 - "معلومات إضافية").
- كنت تعاني من وذمة محيطية ورئوية (انفاسات) أو من مقدمات الارتعاج.
- كنت تعاني من عدم امتصاص/عدم تحمل الجلوكوز.
- كنت تعاني من تقيؤات شديدة جدًا، حالات إسهال وتجفاف مما يتطلب العلاج بالسوائل.
- كنت تعاني أو عانيت في الماضي من قصور القلب، مشاكل أو أمراض في الكلية.

تحذيرات خاصة تتعلق باستعمال الدواء:
١. قبل العلاج بمينيرالي، أخبر الطبيب إذا:
• كنت تعاني من مشاكل في الكبد.

٢. كنت تعاني من مشاكل في الكلية، بما في ذلك قلة أو انعدام البول.

٣. كنت تعاني من السكري.

٤. كنت متباعدة حمية غذائية قليلة الملح (الصوديوم) (انظر لاحقًا "معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء").

٥. كنت متباعدة حمية غذائية قليلة البوتاسيوم (انظر لاحقًا "معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء").

٦. لا يُعرض مخصوص هذا الدواء؟

مينيرالي مخصوص لإعادة الأملأح والسوائل من أجل منع التجفاف، في حالات مثل: الإسهال العابر (الحاد).

يحتوي مينيرالي على الجلوكوز والأملأح المختلفة التي تنتهي إلى فصيلة الأدوية المسماة محاليل الكهارل للإعطاء عن طريق الفم، والمستعملة لإعادة السوائل والأملأح التي فقدت من الجسم.

الفصيلة العلاجية: الكهارل المعطاة عن طريق الفم.

٢. قبل استعمال الدواء:

واليدين ساخنة، رطوبة الشفتين واللسان، عند فرضن جلد البطن يرجع الجلد إلى مكانه بشكل عادي): 10 مل لكل كلغ بعد كل تبرز سائل و 2 مل لكل كلغ بعد كل تقيؤ.
إذا كان وزن الولد غير معروف: دون وزن 10 كلغ (دون سن الثانية) - 50-100 مل بعد كل تبرز سائل أو تقيؤ.
فوق وزن 10 كلغ (من سن الثانية حتى العاشرة) - 100-200 مل بعد كل تبرز سائل أو تقيؤ.
يجب التشجيع على الشرب ما دام متلفي العلاج مستعدًا للشرب حتى يتلاشى الإسهال.
فقدان السوائل الخفيف - المتوسط (متلفي العلاج غير مرتفع أو متعب، عطشان، العينان غارقان بعض الشيء [لدى الأطفال الرضع] - اليافوخ (الثغرة في الجمجمة) غارق بعض الشيء)، فلة الدمع عند البكاء، انخفاض في التبول، أصابع الرجلين واليدين باردة، الشفتين واللسان متصلقة أو جافة، عند فرضن جلد البطن فإن الجلد يعود إلى مكانه ببطء): 50-100 مل لكل كلغ.
وبالإضافة إلى ذلك، يجب إضافة 10 مل لكل كلغ من وزن الجسم بعد كل تبرز سائل و 2 مل لكل كلغ من وزن الجسم بعد كل تقيؤ.

إذا كان وزن الولد غير معروف: دون وزن 10 كلغ (دون سن الثانية) - يجب إضافة 50-100 مل بعد كل تبرز سائل أو تقيؤ.
فوق وزن 10 كلغ (من سن الثانية حتى العاشرة) - يجب إضافة 100-200 مل بعد كل تبرز سائل أو تقيؤ.
فقدان شديد للسوائل أو مرض شديد (إسهال دموي، إسهال يستمر لأكثر من 48 ساعة، أكثر من 5 تقيؤات في اليوم، حمى فوق 39 درجة مئوية، متلفي العلاج نعسان، مرتفع، يشرب قليلاً أو غير قادر على الشرب، العينان غارقان بشكل ملحوظ [لدى الأطفال الرضع] - اليافوخ (الثغرة في الجمجمة) غارق بشكل ملحوظ)، انعدام الدموع، جفاف الشفتين واللسان، فلة التبول، أصابع الرجلين واليدين باردة): يجب التوجه إلى الطبيب.

بعد ما يقارب أربع ساعات من بداية العلاج، يجب إجراء تقييم لنجاح العلاج بال محلول ولتحسن فقدان السوائل. إذا كانت لا تزال هناك أعراض لفقدان السوائل في المكان تكرار العلاج إلى أن تختفي الأعراض. إذا طرأ تفاقم على الأعراض فيجب التوجه إلى الطبيب.
فقدان السوائل دون علامات على التجفاف (متلفي العلاج يقط، يشرب بشكل عادي، العينان ليست غارقتين، توجد دموع عند البكاء، التبول بشكل عادي أو أقل بعض الشيء من المعتاد، أصابع الرجلين الأطفال الرضع الذين يررضعون من أمهاتهم وأو يتغذون على بديل الحليب: يوصى بمواصلة التغذية

إذا كنت تستعمل الآن، أو قد استعملت مؤخرًا أدوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبيب، إضافات غذائية، فيتامينات وإضافات نباتية فأخبر الطبيب أو الصيدلي بذلك.
لا يُتوقع أن يؤثر العلاج بمينيرالي على استعمال أدوية أخرى.

الحمل، الإرضاع والخصوبة:
يمكنك استعمال مينيرالي إذا كنت حاملاً أو مريضاً.
معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء
تحتوي كل 100 مل من مينيرالي على 1.35 غم چلوكوز. إذا قال لك الطبيب إنك تعاني من حساسية لسوائل معينة، فيجب استشارة الطبيب قبل استعمال الدواء.

تحتوي كل 100 مل من مينيرالي على 5 ملغم صوديوم بيبنزوارات البرقان لدى المواليد (الذين يبلغون حتى 4 أسابيع من العمر).
تحتوي كل 100 مل من مينيرالي على 160 ملغم صوديوم، ما يعادل 8% من الاستهلاك اليومي للأقصى الموصى به للبالغ.

تحتوي كل 100 مل من مينيرالي على 79 ملغم بوتاسيوم. يجبأخذ هذه الكمية بعين الاعتبار لدى متلفي العلاج ذوي الوظيفة الكلوية المتعددة أو لدى متلفي العلاج الذين يتبعون حمية غذائية فيها تحديد للبوتاسيوم.

3. كيف تستعمل الدواء؟
عليك استشارة الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكن متأكداً من الجرعة الدوائية ومن كيفية العلاج بالمستحضر.

الجرعة الدوائية الاعتيادية عادة هي:
يجب الانتباه إلى أنه يجب إعطاء المحلول برشقات صغيرة، بفوائل زمنية قصيرة. رشفة إضافية كل عدّة دقائق.

يمكن استعمال مينيرالي لدى الأطفال الرضع الذين يبلغون أكثر من سنة من العمر.
لا يجوز استعمال مينيرالي لدى الأطفال الذين سُنهم دون السنة، من غير توصية الطبيب.

إذا كانت حالة الإسهال وأو التقيؤات شديدة، فيجب التوجه إلى الطبيب.
فقدان السوائل دون علامات على التجفاف (متلفي العلاج يقط، يشرب بشكل عادي، العينان ليست

5. كيف يجب تخزين الدواء؟

- امنع التسمم! هذا الدواء، وكل دواء آخر، يجب حفظه في مكان مغلق بعيداً عن متناول أيدي الأولاد وأو الأطفال الرضع ومجال رؤيتهم، وبذلك تمنع التسمم. لا تسبب التقيؤ بدون تعليمات صريحة من الطبيب.
- لا يجوز استعمال الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية (EXP) المدون على العبوة. يشير تاريخ انتهاء الصلاحية إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.
- يجب التخزين في درجة حرارة أقل من 25 درجة مئوية.
- للاستعمال حتى 3 أيام من يوم فتحه.

6. معلومات إضافية:

بالإضافة إلى المركبات الفعالة، يحتوي الدواء أيضاً على:

Purified water, Phosphoric acid Diluted 10%, Hydrochloric acid 10%,
Cherry flavour, Citric acid anhydrous, Sorbic acid, Sodium cyclamate,
Saccharin sodium, Sodium benzoate

كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العبوة: قبّينة ذات غطاء أمان للأولاد تحتوي على 500 مل من المحلول الصافي، العديم اللون المائل إلى الأصفر، برائحة الكرز.
المصنع وصاحب الامتياز وعنوانه: ك. ص ط للصناعات الكيميائية م.ض.، هاكيدما 3، قريات ملاخى.

حدّدت وزارة الصحة صيغة هذه النشرة ومحتهاها فحص وأقرّ من قبلها في 07/2019، وقد تم تحديث محتواها وفقاً لتعليمات وزارة الصحة في 11/2020.

رقم تسجيل الدواء في سجل الأدوية الرسمي في وزارة الصحة: 00-35149-43-162
من أجل التيسير ولتسهيل القراءة، تمت صياغة هذه النشرة بصيغة المذكر. على الرغم من ذلك، فإن الدواء مخصص لكلا الجنسين.

الاعتيادية (الإرضاع أو بديل الحليب) خلال فترة العلاج. يجب إعطاء محلول الشرب مينيرالي بحسب الجرعة الدوائية الموصى بها ومواصلة التغذية الاعتيادية بعد الإعطاء الأول لمحلول الشرب مينيرالي أو خلال 4-6 ساعات. يمكن التخزين في البراد إذا كان الولد يفضل المشروب البارد.

يمكن أن يسبب شرب المحلول ارتجاعات أو تقيؤات خفيفة. لا تمنع التقيؤات الخفيفة إمكانية العلاج بال محلول.
إذا استرجع الطفل أو تقيأ - حاولوا سقيه بالمحلول ببطء بواسطة ملعقة كبيرة أو برشفات صغيرة من أجل تحسين الإمتصاص.

إذا تناولت خطأ جرعة دوائية أكبر من الجرعة الدوائية المطلوبة:

إذا تناولت جرعة مفرطة أو إذا قام ولد ببلع الدواء خطأ، فتوجّه فوراً إلى الطبيب أو إلى غرفة الطوارئ في المستشفى وأحضر معك عبوة الدواء.

لا يجوز تناول الأدوية في العتمة! راجع الملصق وتأكد من الجرعة في كل مرة تتناول فيها الدواء.
ضع النظارات الطبية إذا كنت بحاجة إليها.
إذا توفرت لديك أسلمة إضافية حول استعمال الدواء، فاستشر الطبيب أو الصيدلي.

4. الأعراض الجانبية:

مثل كل دواء، قد يؤدي استعمال مينيرالي إلى حدوث أعراض جانبية عند بعض المستعملين. مع ذلك، لا يتوقع أن يسبب استعمال مينيرالي أعراضًا جانبية.

إذا ظهر عرض جانبي، أو إذا تفاقم أحد الأعراض الجانبية، فعليك استشارة الطبيب.
بإمكان التبليغ عن أعراض جانبية لوزارة الصحة بواسطة الضغط على الرابط "التبليغ عن أعراض جانبية عقب العلاج الدوائي" الموجود في الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة (www.health.gov.il) والذي يوجه إلى الاستمرارة المتصلة للت bliغ عن أعراض جانبية، أو عن طريق الدخول إلى الرابط: <https://sideeffects.health.gov.il>

