



**قابل للانعكاس على الكبد** بسبب الباراسيتامول. لا تنتظر حتى ظهور الأعراض، لأن فرط الجرعة قد لا يسبب في البداية أعراضاً يمكن ملاحظتها.

إذا ظهرت أعراض فرط الجرعة قد تكون:

- بالنسبة لحمض الأميني ساليسيليك (الأسبيرين): الدوار، الطنين في الأذنين، الصداع، التعرق، فرط التنفس، الحرارة المرتفعة، الغثيان، التقيؤات، الصداع، الارتباك أو انعدام الراحة، هبوط الدورة الدموية، أو الفشل التنفسي.
- بالنسبة لباراسيتامول: الأعراض الأولى التي قد تظهر - الغثيان، التقيؤات، انعدام الشهية، الشعور بنعاس، التعرق وبعد ذلك ألم في البطن.
- بالنسبة للكافيين: القلق، العصبية، انعدام الراحة، الأرق، الانفعال، تقلص العضلات، الارتباك، الاختلاجات، فرط السكر في الدم، تسارع القلب (نظم القلب السريع) أو اضطرابات في نظم القلب.

**حتى إذا لم تظهر هذه الأعراض أو إذا أخفقت، فمن الضروري التوجه لتلقي المساعدة الطبية بشكل فوري.**

**إذا نسيت تناول إكسيدول**

يجب تناول الدواء عند تذكرك لكن لا تتناول جرعة مضاعفة للتعويض عن جرعة منسية.

لا يجوز تناول أكثر من 8 حبوبلات خلال فترة 24 ساعة.

**لا يجوز تناول أيوية في الظلام! يجب التحقق من المصنع والجرعة في كل مرة تتناول فيها دواء.** ضع النظرات الطبية إذا كنت بحاجة إليها. إذا كانت لديك أسئلة إضافية بخصوص استعمال الدواء، استشر الطبيب أو الصيدلي.

#### 4. الأعراض الجانبية

كما في أي دواء، قد يسبب استعمال إكسيدول أعراضاً جانبية لدى جزء من المستخدمين. لا تفزع من قراءة قائمة الأعراض الجانبية. من الممكن أن لا تصاب بأي واحدة منها.

#### يجب إيقاف الاستعمال والتوجه إلى الطبيب فوراً إذا:

- ظهور رد فعل تحسسي مع انتفاخ في الوجه في الشفتين، في الفم في اللسان أو في الحنجرة. قد يسبب ذلك صعوبة في التنفس أو البلع. أيزأ عند التنفس وشعوراً بالضغط في الصدر (علامات الربو). قد يكون لديك أيضاً طفح جلدي أو حكة أو قد تصاب بالإغماء. طفح جلدي (يشمل الشرى، الحكة)، احمرار الجلد، حويصلات في الشفتين، العينين أو الفم، تقشر الجلد، جروح تقرحات في الفم.
- نزيف في المعدة أو في الأمعاء، فرحة المعدة أو فرحة الأمعاء، وقد تكون هذه الأعراض مصحوبة بألم بطن حاد، تقيؤ، نومي، براز نموي أو أسود.
- كما هو الحال عند العلاج بجميع مسكنات الألم وخافضات الحرارة، قد يحدث هذا الأمر في أي وقت خلال فترة العلاج دون سوابق وقد يكون مبعثاً. هذا العرض الجانبى خطير لدى المسنين بالتحديد.
- استمرار الجلد أو العينين (علامات على الفشل الكبدي).
- دوار (علامة على ضغط الدم المنخفض).
- نظم قلبي غير منظم.

#### أعراض جانبية إضافية

الأعراض الجانبية التالية تم التبليغ عنها بـ 16 بحث سريري التي تم إجراؤها على أكثر من 4,800 متعالج. أخبر طبيبك إذا كنت تلاحظ أي من هذه الأعراض الجانبية:

أعراض جانبية شائعة (common)- تظهر في لغاية 1 من بين 10 مستخدمين:

- عصبية دوار
  - غثيان، إيزعاج بطني
  - أعراض جانبية غير شائعة (uncommon)- تظهر في لغاية 1 من بين 100 مستخدمين:
  - أرق، ارتجاف، شعور بالخذر، صداع
  - طنين في الأذنين
  - جفاف في الفم، اسهال، تقيؤ
  - تعب، شعور بالعصبية
  - ارتفاع في نظم القلب
- أعراض جانبية نادرة (rare)- تظهر في لغاية 1 من بين 1,000 مستخدمين:

- ألم حلق، صعوبات بلع، شعور بالخذر أو تنمل حول الفم، فاضض أعاب
- انخفاض في الشهية، تغيرات في حساسية الذوق
- قلق، شفق، توتر
- اضطرابات في التركيز، فقدان الذاكرة، تغير في التنسيق الحركي (تنسيق)

#### الحركات

شعور بالألم في الوجيهتين والجبين

ألم عيني، اضطرابات رؤية

وهجات حر، مشاكل في أوعية الدم المحيطية (مثل في النزاعين أو الرجلين)

نزيف في الأنف، تنفس بطيء وسطحي، سيلان الأنف

تجشؤات، انتفاخ

فرط التعرق، حكة، طفح جلدي، مثير للحكة، ارتفاع في حساسية الجلد

تصلب العضلات، العظام أو المفاصل؛ المربقة؛ ألم ظهر، تشنج عضلات

ضعف، انزعاج في الصدر

أعراض جانبية شيوها غير معروف (أعراض جانبية لم يتم تحديدها شيوها)

عدم راحة، شعور عام غير جيد أو غير سوي

نعاس، صداع نصفي

احمرار الجلد، طفح جلدي، تم التبليغ عن حالات نادرة جداً من ردود

فعل جلدية وخيمة.

خفقان قلب، ضيق تنفس، صعوبات فجائية في التنفس وشعور بالضغط في

الصدر مع أزيز أو سعال (ربو)

ألم بطن، إيزعاج بطني بعد الوجبات

ارتفاع في الزيمات الكبد

إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقم أحد الأعراض الجانبية أو عندما تعاني

من عرض جانبي لم يذكر في هذه النشرة، عليك استشارة طبيبك.

#### التبليغ عن أعراض جانبية:

يمكن التبليغ عن أعراض جانبية لوزارة الصحة بواسطة الضغط على

الرابط "التبليغ عن أعراض" عقب علاج دوائي "الموجود في صفحة

البيت لموقع وزارة الصحة ([www.health.gov.il](http://www.health.gov.il)) الذي يوجه

لنموذج الإنترنت للتبليغ عن الأعراض الجانبية، أو عن طريق الدخول

للرابط: <https://sideeffects.health.gov.il>

بالإضافة، يمكن التبليغ لشركة بيريجو بواسطة العنوان التالي:

[www.perrigo-pharma.co.il](http://www.perrigo-pharma.co.il)

#### 5. كيفية تخزين الدواء؟

تجنب التسمم! هذا الدواء وكل دواء آخر يجب حفظه في مكان مغلق بعيداً

عن متناول أيدي الأطفال و/أو الرضع ومجال نظرهم وبذلك تمنع التسمم.

لا لتسبب التقيؤ دون أمر صريح من الطبيب.

لا يجوز استعمال الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية (exp. date)

الذي يظهر على العبوة. تاريخ انتهاء الصلاحية يرجع إلى اليوم الأخير

من نفس الشهر.

حزن الدواء في درجة حرارة حتى 25 درجة مئوية.

بعد الفتح لأول مرة يمكن الاستعمال خلال 9 أشهر، لكن في موعد لا

يتجاوز تاريخ انتهاء الصلاحية.

#### 6. معلومات إضافية

إضافة إلى المواد الفعالة يحتوي إكسيدول أيضاً:

Microcrystalline cellulose, hypromellose, stearic acid, crospovidone, titanium dioxide, pregelatinized starch, propylene glycol, povidone, carnauba wax, saccharin sodium, blue No. 1 FD&C lake.

كيف يبدو الدواء وما هو محتو العبوة: الدواء يأتي بعبوات تحتوي 24،

50 أو 100 حبوبلة مع الوسم "L374" في جهة واحدة. قد لا تكون

جميع أحجام العبوة متوفرة. تحتوي العبوة ماض للارتوية. لا يجوز بلعه

أو إخراجها من القنبية.

صاحب التسجيل وعنوانه: وكالات بيريجو إسرائيل م.ض، شارع

راكيفيت 1 شوهم

إسم المنتج وعنوانه: شركة بيريجو، أليجان، ميشيجان، الولايات المتحدة.

تم الإصدار في تموز 2020.

رقم تسجيل الدواء في سجل الأدوية الحكومي في وزارة الصحة: 13677.310955

من أجل التبسيط وتسهيل القراءة، تمت صياغة هذه النشرة بصيغة المنكر.

بلازم من ذلك، الدواء مخصص لكلا الجنسين.