

ماكاييمول حبسولات (حبوب بشكل كبسولة)

تحتوي كل كبسولة (حبة بشكل كبسولة) على: پاراسيتامول (أسيتامينوفين) 500 ملغ

Paracetamol (Acetaminophen) 500 mg

المواد غير الفعالة ومولدات الحساسية في المستحضر - أنظر الفقرة 6.

اقرأ النشرة بتمعن حتى نهايتها قبل إستعمالك للدواء.

تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء. إذا توفرت لديك أسئلة إضافية، راجع الطبيب أو الصيدلي.

بصرف هذا الدواء بدون حاجة لوصفة طبيب وهو مخصص للكبار وللأطفال من عمر 12 سنة وما فوق. عليك تناول الدواء بصورة صحيحة. إستشر الصيدلي إذا كنت بحاجة لمعلومات إضافية.

يجب مراجعة الطبيب إذا إستمرت السخونة لأكثر من 3 أيام أو إذا لم تزول الأعراض خلال 5 أيام على الرغم من إستعمال الدواء.

1) لأي غرض مخصص الدواء؟

الدواء مخصص للتخفيف بصورة مؤقتة من الآلام والسخونة الناتجين عن أسباب مختلفة مثل: صداع، رشح، إنفلوانزا، آلام الدورة الشهرية، آلام الأسنان والآلام الروماتومية الخفيفة.

الفصيلة العلاجية: مسكّن للآلام وخافض للسخونة.

2) قبل إستعمال الدواء

❗ لا يجوز إستعمال الدواء إذا:

- أنت حساس (البرجي) للمادة الفعالة پاراسيتامول (أسيتامينوفين) أو لكل واحد من المركبات الإضافية التي يحتويها الدواء. أنظر الفقرة 6.

تحذيرات خاصة تتعلق بإستعمال الدواء

- إذا تطورت لديك في الماضي أعراض جانبية جلدية نتيجة تناول مستحضرات تحوي پاراسيتامول (أسيتامينوفين) لا يجوز تناول مستحضرات تحوي پاراسيتامول (أسيتامينوفين)، حتى لا تسبب ثانية أعراض جلدية شديدة.
- يحوي المستحضر پاراسيتامول (أسيتامينوفين) حيث قد يسبب ضرراً للكبد عندما:
 - يعطى بجرعة دوائية أكبر من الموصى بها أو لفترة مطوّلة.
 - يتم شرب مشروبات كحولية أثناء العلاج.
 - يتم تناول أدوية إضافية تؤثر على نشاط الكبد.
- لا يجوز إستعمال هذا الدواء في فترات متقاربة بدون إستشارة الطبيب.
- لا يجوز تناول أدوية إضافية لتخفيف السخونة وتسكين الآلام أو أدوية للرشح بدون إستشارة الطبيب أو الصيدلي، وذلك لتجنب جرعة دوائية مفرطة أو التسمم بالپاراسيتامول (أسيتامينوفين).

- لا يجوز تناول أدوية إضافية من «فصيلة مأكاييمول» و/أو مستحضرات إضافية تحوي پاراسيتامول (أسيتامينوفين).
- يجب الإمتناع عن تناول جرعة دوائية عالية (ضمن الحدود الموصى بها) من هذا الدواء أثناء الصوم.
- إذا كنت حساساً لأي طعام أو لأي دواء، عليك إبلاغ الطبيب عن ذلك قبل تناول الدواء.
- يجب إستشارة الطبيب قبل بدء العلاج إذا كنت تعاني أو عانيت في الماضي من:

- مرض في الكبد أو خلل في وظيفة الكبد
- خلل في وظيفة الكلية
- الإدمان على الكحول
- يرقان
- إذا كنت في فترة الحمل أو مرضعة

❗ التداخلات/التفاعلات بين الأدوية

- إذا كنت تتناول، أو إذا تناولت مؤخراً، أدوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبية وإضافات غذائية، إبح للطبيب أو للصيدلي عن ذلك. يجب إبلاغ الطبيب أو الصيدلي بالأخص إذا كنت تتناول دواء من المجموعات التالية أو إذا أنهيت الآن العلاج بدواء:
 - أدوية مضادة لتخثر الدم - خاصة وأرفارين.
 - مستحضرات تنشط إنتاج الإنزيمات في الكبد (مثل: ريفامپيسين، باربيتورات).
 - أدوية للصرع - فينيتوئين، كاربامازيبين.
 - مستحضرات مضادة للالتهاب لاستيروئيدية.
 - ميتوكلوبراميد أو دومبيريدون (لعلاج الغثيان، التقيؤ ومشاكل هضمية إضافية).
 - كلورامفينيكول (مضاد حيوي).
 - بروبينسيد (لعلاج النقرس).
 - كوليستيرامين (لتخفيض فرط الشحوم في الدم).

❗ إستعمال الدواء وإستهلاك الكحول

لا يجوز إستهلاك الكحول أثناء العلاج بالدواء بسبب زيادة الخطورة لحدوث ضرر للكبد.

❗ الحمل والإرضاع

إذا كنت في فترة الحمل أو مرضعة يجب إستشارة الطبيب قبل بدء إستعمال الدواء.

❗ الإستعمال لدى الأطفال

هذا الدواء مخصص للكبار وللأطفال فوق عمر 12 سنة. أنظر الفقرة 3. على الوالدين إبلاغ الطبيب المعالج عن كافة الأعراض الجانبية وكذلك عن كل دواء إضافي يعطى للطفل.

❗ معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء

كمية الصوديوم في كل كبسولة: حتى 1 ملغ، لذا فمن الناحية العملية الدواء خالٍ من الصوديوم.

3) كيفية استعمال الدواء؟

عليك الإستيضاح من الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكن واثقاً.

الجرعة الدوائية الإعتيادية في حال عدم وجود تعليمات أخرى من الطبيب:

الكبار والأطفال من عمر 12 سنة وما فوق:

حبسولة - حبسولاتان كل 6-4 ساعات حسب الحاجة.

لا تتجاوز جرعة دوائية قدرها 8 حبسولات في 24 ساعة.

لا تتجاوز الجرعة الدوائية الموصى بها.

عليك مراجعة الطبيب إذا استمرت السخونة لأكثر من 3 أيام أو إذا لم تزول الأعراض

خلال 5 أيام على الرغم من استعمال الدواء.

طريقة الإستعمال

لا يجوز المضغ أو سحق!

يجب بلع الدواء مع القليل من الماء.

إذا تناولت جرعة دوائية مفرطة أو إذا بلع طفل أو شخص آخر بالخطأ من الدواء، يجب

التوجه حالاً إلى الطبيب أو إلى غرفة الطوارئ في المستشفى وأحضر عبوة الدواء معه. لا تسبب

التقيؤ بدون تعليمات واضحة من الطبيب! حتى ولو كنت تشعر بحالة جيدة، فإن العلاج الفوري

هو ضروري، بسبب خطورة تطور ضرر خطير للكبد. الأعراض الجانبية يمكن أن تكون

غثباناً وتقيؤ، إسهال، فقدان الشهية للطعام، آلام في البطن، إنتفاخ، تعرق زائد، ألم أو حساسية

في أعلى البطن ومن الجائز أنها لا تعكس خطورة الضرر الحاصل للكبد.

لا يجوز تناول أدوية في العتمة! يجب تشخيص طابع الدواء والتأكد من الجرعة الدوائية

في كل مرة تتناول فيها دواء. ضع النظارات الطبية إذا لزم الأمر ذلك.

إذا توفرت لديك أسئلة إضافية حول استعمال الدواء، إستشر الطبيب أو الصيدلي.

4) الأعراض الجانبية

كما بكل دواء، إن استعمال ماكابمول قد يسبب أعراضاً جانبية مثل الدوار عند بعض المستعملين.

لا تندهم من قائمة الأعراض الجانبية. من الجائز ألا تعاني أياماً منها.

أعراض جانبية شديدة:

يجب التوقف عن العلاج ومراجعة الطبيب حالاً:

• إذا ظهرت ردود فعل تحسسية شديدة مثل طفح وحكة، إنتفاخ الوجه، الشفتين،

اللسان، الحنجرة و/أو الأطراف حيث قد تسبب صعوبات في التنفس أو في البلع.

• يمكن أن يسبب پاراسيتامول (أسيتامينوفين) في حالات نادرة ظهور أمراض جلدية

حادة حيث يمكن أن تكون علامات: إحمرار، طفح، حويصلات، إصابة جلدية واسعة.

أعراض جانبية جلدية شديدة قد تظهر أيضاً حتى إذا تناولت في الماضي مستحضرات

تحتوي المركب الفعال پاراسيتامول (أسيتامينوفين) بدون مشكلة.

إذا ظهرت أعراض جانبية جلدية، يجب التوقف عن العلاج ومراجعة الطبيب بشكل فوري.

• إذا ظهرت علامات لتغيرات في جهاز الدم مثل: أنزفة، كدمات، تطور التهابات بسهولة

أكثر.

إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقم إحدى الأعراض الجانبية، أو إذا كنت تعاني من عرض جانبي لم يذكر في هذه النشرة، عليك إستشارة الطبيب حالاً.

التبليغ عن أعراض جانبية:

بالإمكان التبليغ عن أعراض جانبية لوزارة الصحة بواسطة الضغط على الرابط "تبليغ عن أعراض جانبية

عقب علاج دوائي" الموجود على الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة (www.health.gov.il)

الذي يوجهك إلى النموذج المباشر للتبليغ عن أعراض جانبية، أو عن طريق تصفح الرابط:

<https://sideeffects.health.gov.il>

بالإضافة لذلك، بالإمكان تبليغ شركة بيريجو بواسطة العنوان التالي:

www.perrigo-pharma.co.il

5) كيفية تخزين الدواء؟

• تجنب التسمم! يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء آخر في مكان مغلق بعيداً عن متناول

أيدي ومجان رؤية الأطفال و/أو الرضع وذلك لتفادي إصابتهم بالتسمم. لا تسبب

التقيؤ بدون تعليمات صريحة من الطبيب.

• لا يجوز إستعمال الدواء بعد إنقضاء تاريخ الصلاحية (exp. date) الذي يظهر على

ظهر العبوة والتقنية. يشير تاريخ إنقضاء الصلاحية إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.

• بالإمكان إستعمال الدواء لمدة 12 شهراً بعد الفتح للمرة الأولى، لكن ليس بما يتجاوز

تاريخ إنقضاء الصلاحية.

• يجب التخزين بدرجة حرارة الغرفة، دون 25 درجة مئوية.

6) معلومات إضافية

• يحتوي الدواء بالإضافة للمادة الفعالة أيضاً:

Corn starch, pregelatinized starch, povidone, sodium starch

glycolate, hypromellose, stearic acid, polyethylene glycol,

carnauba wax.

• كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العبوة: قناني صغيرة تحوي 24 أو 50 حبسولة

بيضاء مطبوع عليها «L484» في جانب واحد.

• صاحب الإمتياز: وكالات بيريجو إسرائيل م.ض.، شارع ريكفيت 1، شوهام

• إسم المنتج: شركة بيريجو، أليجان، ميشيجان، الولايات المتحدة.

• تم إعدادها في كانون الأول 2020.

• رقم سجل الدواء في سجل الأدوية الحكومي في وزارة الصحة:

132-31-31121

• من أجل سهولة وتبوين القراءة، تمت صياغة هذه النشرة بصيغة المذكور. على الرغم

من ذلك، فإن الدواء مخصص لكلا الجنسين.