

إيداسيو® بطاقة معلومات للمريض

تحتوي هذه البطاقة على معلومات سلامة مهمة ومختارة التي تحتاج إلى معرفتها قبل وخلال العلاج بـ إيداسيو

- احتفظ بهذه البطاقة معك دائمًا وحتى 70 يومًا بعد الحقنة الأخيرة من إيداسيو®
- اعرض هذه البطاقة على أي طبيب أو أخصائي طبيّ تقابله
- سجّل معلومات حول أيّ اختبارات سل أو علاجات حصلت عليها على ظهر هذه البطاقة.

مقدمة

إيداسيو® هو دواء معدّ لعلاج بعض الأمراض التي تؤثر على جزء من جهاز المناعة. في حين أنّ إيداسيو® قد يكون فعالًا في علاج هذه الأمراض، من الممكن أن يعاني بعض الأشخاص عارضًا واحدًا أو أكثر من الأعراض الجانبية. من الضروري التحدّث مع طبيبك حول الفوائد المحتملة والأعراض الجانبية المحتملة من تناول إيداسيو®. من الممكن أن يكون هذا مختلفًا من شخص لآخر.

- الهدف من هذه البطاقة هو إخبارك عن بعض الأعراض الجانبية لـ إيداسيو®.
- بعض الأعراض الجانبية الخطيرة التي ممكن أن تحدث تشمل حالات عدوى، سرطان ومشاكل في الجهاز العصبي. هذه ليست جميع الأعراض الجانبية المحتملة لـ إيداسيو®.

قبل العلاج بـ إيداسيو®

أخبر طبيبك عن أيّ مشاكل صحيّة أنت تعاني منها وعن أيّ أدوية تتناولها. فهذا سيساعدك وسيساعد طبيبك في تحديد ما إذا كان إيداسيو® مناسبًا لك.

أخبر طبيبك إذا:

- كنت تعاني من عدوى أو إذا كانت لديك أي أعراض عدوى (مثل سخونة، جروح، شعور بالتعب، مشاكل في الأسنان)
- أنت مصاب بمرض السل أو إذا كنت بتواصل مع شخص يعاني من السل
- أنت مصاب بالسرطان أو إذا عانيت منه في السابق
- أنت تعاني من تنميل أو وخز أو إذا لديك مشكلة تؤثر على جهازك العصبي، مثل التصلب المتعدد

يجب أن يفحصك طبيبك بحثًا عن علامات وأعراض لمرض السل قبل البدء بـ إيداسيو®.

قد تحتاج إلى الحصول على علاج لمرض السل قبل أن تبدأ في تناول إيداسيو®.

تطعيمات

- قد تحصل على تطعيمات باستثناء التطعيمات الحيّة.
- إذا حصلت على إيداسيو® أثناء الحمل، من المهم أن تخبري طبيبك بذلك قبل حصول الطفل على أي تطعيم. يجب أن لا يحصل طفلك على "تطعيم حي"، مثل BCG (الذي يُستعمل لمنع مرض السل) لمدة 5 أشهر بعد حقنتك الأخيرة من إيداسيو® خلال الحمل.

خلال العلاج بـ إيداسيو®

للتأكد من أنّ إيداسيو® يعمل بشكل صحيح وآمن بالنسبة لك، يجب عليك الفحص مع طبيبك بانتظام لمناقشة حالتك. أخبر طبيبك فورًا بأي تغييرات في حالتك.

أخبر طبيبك دائمًا عن كيفية عمل إيداسيو® بالنسبة لديك.

- من المهم أن تتصل بطبيبك فورًا بخصوص أي أعراض غير اعتيادية قد تظهر لديك. هذا سيساعد في التأكد من أنك تحصل على الرعاية المناسبة. كما وسيقلل من احتمال تفاقم عارض جانبي.
- العديد من الأعراض الجانبية، بما في ذلك حالات العدوى، ممكن الاهتمام بها إذا أخبرت طبيبك فورًا.
- إذا ظهر لديك عارض جانبي، سيقرر طبيبك فيما إذا كان يجب عليك الاستمرار أو إيقاف العلاج بـ إيداسيو®. من المهم أن تتحدث مع طبيبك لتعرف ما المناسب لك.
- نظرًا إلى أنه قد تحدث أعراضًا جانبية بعد جرعتك الأخيرة من إيداسيو®، أخبر طبيبك عن أي مشاكل قد تواجهك حتى 70 يومًا بعد حقنتك الأخيرة من إيداسيو®.

أخبر طبيبك عن:

- أي حالات طبية جديدة قد تظهر لديك
- أدوية جديدة تتناولها
- أي عملية جراحية أو عملية كنت قد خططت لها

بعض الأشخاص الذين يتناولون إيداسيو® قد تظهر لديهم أعراض جانبية خطيرة، التي تشمل:

حالات عدوى

- يساعد إيداسيو® الأشخاص الذين يعانون من أمراض التهابية معينة. وهو يقوم بذلك من خلال حجب جزء من جهاز المناعة. مع ذلك، هذا الجزء من جهاز المناعة يساعد أيضًا في محاربة العدوى. هذا يعني بأن إيداسيو® قد يجعلك معرضًا أكثر للإصابة بالعدوى أو قد يؤدي إلى تفاقم أي عدوى موجودة لديك. هذا يشمل حالات عدوى مثل نزلة البرد أو حالات عدوى أكثر خطورة مثل السل.

سرطان

- إذا كنت تتناول إيداسيو®، قد يزداد خطر الإصابة بأنواع معينة من السرطان.

مشاكل الجهاز العصبي

- لقد تطوّر لدى بعض الأشخاص الذين يتناولون إيداسيو®، مشاكل في الجهاز العصبي أو تفاقم تلك الموجودة لديهم. هذا يشمل التصلب المتعدد.

لمزيد من المعلومات، اقرأ من فضلك نشرة عبوة إيداسيو®. هذه ليست جميع الأعراض الجانبية المحتملة التي ممكن أن تحدث خلال العلاج بـ إيداسيو®.

اتصل بطبيبك أو توجه للحصول على رعاية طبية فورًا إذا ظهرت لديك أي من الأعراض الجانبية التالية:

حالات عدوى

- سخونة؛ قشعريرة؛ تعرّق غير اعتيادي؛ شعور غير جيد أو بالتعب أكثر من المعتاد؛ الشعور بالمرض أو المرض فعليًا (مثل الغثيان أو التقيؤ)، إسهال، ألم في المعدة، فقدان الشهية، فقدان الوزن، سعال أو سعال دموي أو مخاطي، ضيق تنفس؛ مشاكل في التبول؛ تقرحات جلدية، جروح؛ آلام عضلية، مشاكل في الأسنان.

سرطان

- تعرّق ليلي؛ تورّم العقد الليمفاوية (تورّم الغدد) في الرقبة، تحت الإبط، أربية الفخذ أو في مناطق أخرى، فقدان الوزن، آفات جلدية جديدة أو تغير في آفات جلدية (مثل شامات أو نمش) موجودة لديك، حكة شديدة لا يمكن تفسيرها.

مشاكل في الجهاز العصبي

- خدر أو وخز؛ تغييرات في الرؤية؛ ضعف عضلي؛ دوار غير مفسّر.

أخبر طبيبك عن أي أعراض غير اعتيادية التي قد تلاحظها خلال العلاج بـ إيداسيو®. هذه ليست جميع العوارض المحتملة لهذه الأعراض الجانبية.

معلومات لك ولأخصائي الرعاية الطبية المشاركين في رعايتك الطبية أو في العلاج

اختبارات السل (TB) والعلاج

ضع إشارة في هذه الخانة إذا كنت قد خضعت لفحص السل (TB) من قبل:

نعم (افحص مع طبيبك إذا كنت لا تعلم)

ضع إشارة في هذه الخانة إذا كنت قد حصلت على إجابة إيجابية لفحص السل (TB) من قبل:

نعم (افحص مع طبيبك إذا كنت لا تعلم)

ضع إشارة في هذه الخانة إذا كنت قد تناولت أية أقرص لعلاج أو لمنع مرض السل (TB) من قبل:

نعم (افحص مع طبيبك إذا كنت لا تعلم)

لمزيد من المعلومات، اقرأ من فضلك النشرة الموجودة في عبوة إيداسيو®. إذا كانت لديك المزيد من الأسئلة، تحدث مع طبيبك أو مع أي أخصائي طبي آخر.

اسمك: _____

اسم الطبيب (الذي وصف إيداسيو®): _____

رقم هاتف الطبيب: _____

دواعي الاستعمال: _____

تاريخ حقنتك الأولى من إيداسيو®: _____

المقدار الدوائي من حقنة إيداسيو®: _____

تاريخ حقنتك الأخيرة من إيداسيو® (إذا لم تعد تتناول إيداسيو®): _____

يرجى تعبئة المعلومات الخاصة بك وبأخصائى الصحة المشاركين في رعايتك الطبيّة أو في علاجك.

من الممكن تبليغ وزارة الصحة عن أعراض جانبية من خلال الضغط على الرابط "التبليغ عن أعراض جانبية نتيجة لعلاج دوائي" الموجود على الصفحة الرئيسية في موقع وزارة الصحة (www.health.gov.il) الذي يحوّلك إلى استمارة عبر الإنترنت للتبليغ عن الأعراض الجانبية، أو عبر دخول الرابط:

<https://sideeffects.health.gov.il>

وبواسطة إرسال بريد إلكتروني إلى وحدة سلامة المريض التابعة لصاحب التسجيل على العنوان:

drugsafety@neopharmgroup.com

هاتف رقم: 1-800-250-255



تمّ التصديق على هذا المستند من قِبل وزارة الصحة في تاريخ: أكتوبر 2020