

- مك. إن العلاج الطبي الفوري هو أمر حاسم نظراً للخطر المحتمل
- ضرر غير قابل للالتجاع على الكبد بسبب الإلإسيتامول. لا تنتظر حتى ظهور الأعراض، لأن فرط الحرارة قد لا يسبب في البداية أعراضًا يمكن ملاحظتها.
- إذا ظهرت أعراض فرط الحرارة قد تكون:
- بالنسبة لحمض الأسيتيل ساليسيليك (الآسيبرين): الدوار، الطنين في الأذنين، الصمم التعرق، فرط التنفس، الحرارة المرتفعة الشديدة، التقيؤ، الصداع، الإرثريك أو انعدام الراحة، هبوط الدورة التمهيدية، أو القفل التنفسى.
 - بالنسبة لپاراسيتامول: الأعراض الأولى التي قد تظهر - الشد، التقيؤ، انعدام الشهية، الشعوب، نعاس، التعرق، وبذلة المفهوم البطن.
 - بالنسبة للأكتيفين: القلق، العصبية، انعدام الراحة، الأرق، الانفعال، تقلص العضلات، الإرثراك، الاختلاجات، فرط السكر في الدم، تسارع القلب (نظم القلب السريع) أو أضطرابات في نظم القلب.
 - حتى إذا لم تظهر هذه الأعراض أو إذا اختفت، فمن الضروري التوجة للفحص المساعدة الطبية بشكل فوري.
- إذا نسبت تناول بارامول تارجت
- يجب تناول اللواء عند تذكره لكن لا تتناول جرعة مضادة للتعويض عن جرعة مناسبة.
 - لا يجوز تناول أكثر من 8 حبسولات خلال فترة 24 ساعة.
 - كل مرة تتناول فيها دواء، ضع النظارات الطبية إذا كنت بحاجة لها.
 - إذا كانت لديك أسلمة إضافية بخصوص استعمال اللواء، استشر الطبيب أو الصيدلي.
- #### 4. الأعراض الجانبية
- كم في أي دواء، قد يسبب استعمال بارامول تارجت أعراضًا جانبية لدى جزء من المستخدمين. لا تفرز من فرقة قائمة الأعراض الجانبية لدى الممكن أن لا تصاب بأي واحدة منها.
- يجب إيقاف الاستعمال والتوجه إلى الطبيب فوراً إذا:
- ظهرور رد فعل تحسس مع انتفاخ في الوجه، في الشفتين، في الف، في اللسان أو في الحنجرة. قد يسبب ذلك مشكلة في التنفس أو التلم، أزيزًا عند التنفس وشعور بالضغط في الصدر (علامات الربو). قد يكون لديك أيضًا طفح جلدي أو حكة، أو قد تصلب بالإغماء، طفح جلدي (يشمل الشري، الحكة، أحمر الرجل، حويصلات في الشفتين، العينين أو الف، تقرح الجلد حروق، تقرحات في الف).
 - تزيف في المعدة أو في الأمعاء فرحة المعدة أو فرحة الأمعاء، وقد تكون هذه الأعراض مصحوبة بالم بطن حار، تقيؤ دموي، براز دموي أو أسود. كما هو الحال عند العلاج بجميع مسكنات الألام وخاضفات الحرارة، قد يحدث هذا الأمر في أي وقت خلال فترة العلاج دون سابق ودون مسبق.
 - مميتاً هذا العرض الجلدي خطير لدى المرضى الذين يأخذونه.
 - اصغرار الجلد أو العينين (علامات على القفل الكبدي).
 - دوار (علامة على ضغط الدم المنخفض).
 - نظم قلب غير منظم.
- أعراض جانبية إضافية
- الأعراض الجانبية التالية تم التبليغ عنها بـ 16 بحث سريري التي تم إجراؤها على أكثر من 4,800 متعالج. أخير طبيبك إذا كنت تلاحظ أي من هذه الأعراض الجانبية:
- أعراض جانبية شائعة (common)- تظهر في لغاية 1 من بين 10 مستخدمين:
- عصبية دوار
 - غثيان، ازدجاج بطيء
 - اعراض جانبية غير شائعة (uncommon)- تظهر في لغاية 1 من بين 100 مستخدمين:
 - أرق، ارتحان، شعور بالخذر، صداع
 - طنين في الأذنين
 - حفاف في الف، تقيؤ
 - تعب، شعور بالعصبية
 - ارتفاع في نظم القلب
- أعراض جانبية نادرة (rare)- تظهر في لغاية 1 من بين 1,000 مستخدمين:
- ألم حاد، صعوبات بلع، شعور بالذعر أو تنقل حول الفم، فلتض ألعاب
 - انخفاض في الشهية، تغيرات في حالة النوم
 - فاق، شمعق، توتر
- اضطرابات في التركيز، فقدان الذاكرة، تغير في التنسيق الحركي (تنسيق المركبات)
- شعر بالألم في الوجهين والجبين
- العينين، اضطرابات رؤية وهجات حر، مشاكل في اوعية الدم المحيطية (مثل في الزرعين أو الرجال)، تزيف في الأنف، تنفس بطيء وسطحي، سيلان الأنف
- احتشاء، انتفاخ فرط التعرق، حكة، طفح جلدي مثير للحكمة، ارتفاع في حساسية الجلد
- تضليل العضلات، العظام والمفاصل: المرفقة، المظهر، تشنج عضلات الصدر، ضعف، ازدجاج في الصدر اعراض جانبية شيوها غير معروفة (اعراض جانبية لم يتم تحديد شيوها بعد)
- عدم راحه، شعور عام غير جيد أو غير سوي
- نعمان، صداع نصفي احرار الجلد، طفح جلدي. تم التبليغ عن حالات نادرة جداً من ردود فعل جلدية وخيمية.
- خفقان قلب صفيق تنسص، صعوبات فجائية في التنفس وشعور بالضغط في الصدر مع أزيز وسعال (ربو) المبطن، ازدجاج بطيء بعد الوجبات ارتفاع في ازديادات الكبد
- إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقم أحد الأعراض الجانبية أو عندما تعلقى من عرض جانبي لم يكن في هذه التشرة، عليك استشارة طيبك.
- التبليغ عن اعراض جانبية:
- يمكن التبليغ عن اعراض جانبية لوزارة الصحة بواسطة الضغط على الرابط "التبليغ عن اعراض اعقب علاج دواني" الموجود في صفحة البيت الموقعة وزارة الصحة (www.health.gov.il) الذي يوجه إلى الانترنت للتخلص عن الاعراض الجانبية، او عن طريق الدخول للرابط: <https://sideeffects.health.gov.il> بالإضافة، يمكن التبليغ لشركة بيريجو بواسطة العنوان التالي: www.perrigo-pharma.co.il
- #### 5. كيفية تخزين الدواء؟
- تجنب التسمم هذا اللواء وكل دواء آخر يجب حفظه في مكان مغلق بعيداً عن متناول أيدي الأطفال وأو الرضيع ومحظوظ نظرهم وبذلك تمنع التسمم لا تسبب التقيؤ دون مرصد من الطبيب.
- لا يجوز استعمال الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية (exp. date) الذي يظهر على العبوة. تاريخ انتهاء الصلاحية يرجع إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.
- خرن اللواء في درجة حرارة حتى 25 درجة مئوية.
- بعد الفتح لأول مرة يمكن الاستعمال خلال 9 أشهر، لكن في موعد لا يتجاوز تاريخ انتهاء الصلاحية.
- #### 6. معلومات إضافية
- اضافة إلى المواد الفعالة تحتوى بارامول تارجت أيضًا:
- Microcrystalline cellulose, hypromellose, stearic acid, crospovidone, titanium dioxide, pregelatinized starch, propylene glycol, povidone, carnauba wax, saccharin sodium, blue No. 1 FD&C lake.
- كيف يبدو اللواء وما هو محتوى العبوة: اللواء يأتي بعثنيات تحتوي 24, 50 أو 100 ميسولة مع الوسم "L374" في جهة واحدة. قد لا تكون جميع أحجام العبوة ممتوقة. تحتوي العبوة ماص للرطوبة. لا يجوز بلعه أو أخراجه من البعثنة.
- صاحب التسجيل وعنوانه: وكالات بيريجو إسرائيل، م.ض، شارع راكينت 1 شوهر.
- اسم المنتج و عنوانه: شركة بيريجو، اليجان، ميشيغان، الولايات المتحدة.
- تم الإعداد في تموز 2020.
- رقم تسجيل اللواء في سجل الأدوية الحكومي في وزارة الصحة: 14079.32024
- من أجل التبسيط وتسهيل القراءة، نعمت صياغة هذه النشرة بصيغة المذكرة.
- بالغ من ذلك، اللواء مخصص لكلا الجنسين.