



משרד ראשי

רח' החרש 4
הוד השרון 45240
ת.ד. 10 ת"א 61000

Head Office

4 Haharash St.
Hod-Hasharon 45240
P.O.Box 10 Tel-Aviv 61000
Israel

Tel. +972-9-7626333
Fax. +972-9-7626300

רופא/ה, רוקח/ת נכבד/ה,

הנדון: עדכון עלון לצרכן עצירות X Atzirut

אנו מבקשים להודיעכם כי העלון לצרכן של התכשיר עצירות X עודכן. עדכון העלון כולל החמרות.

ההתוויה המאושרת:

All types of constipation in ambulatory and bedridden patients over the age of 6 years.
Preparation of patients for abdominal radiography and proctoscopy.

Bisacodyl 5 mg

הרכב וחוזק חומר פעיל:

Tablets enteric coated

צורת מינון:

בפירוט שלהלן מובא המידע בו בוצעו שינויים מהותיים בלבד.
תוספת טקסט או טקסט בעל שינוי משמעותי מסומן בצבע. מחיקת טקסט מסומנת בקו חוצה.

העדכונים העיקריים בעלון לצרכן הינם בפרקים הבאים:

2. לפני השימוש בתרופה:

X אין להשתמש בתרופה אם:

- יש לך אי-סבילות (רגישות) לסוכרים מסוימים או שאינך יכול לעכל סוכרים מסוימים (שכן הטבליה מכילה כמות קטנה של לקטוז).
- הינך סובל מבעיית מעי שנקראת איליאוס "ileus" (חסימה במעי).

3. כיצד תשתמש בתרופה?

אם נטלת בטעות מינון גבוה יותר:

אם נטלת כמות גדולה מדי של טבליות עצירות X או נטלת טבליות עצירות X למשך זמן ממושך, עלול להיגרם נזק והתסמינים הבאים עלולים להופיע:

- חוסר איזון של נוזלים ומלחים בגוף העלול להשפיע על מתח השרירים (כגון שרירי המעי) ועל המלחים בדם.
- רמות נמוכות של אשלגן בדם (נקרא היפוקלמיה), עלולות לגרום לחולשה בשרירים ולדופק לא סדיר.
- התייבשות, עלולה להתבטא בתחושת צימאון, עילפון, כאבי ראש ומיעוט במתן שתן.

4. תופעות לוואי:

תופעות לוואי נדירות (rare) – תופעות שמופיעות - משתמשים מתוך 10,000:

- קוליטיס (דלקת של המעי הגס הגורמת לכאב בטן ולשלשול)
- תגובה אלרגית העלולה לגרום לפריחה



העלונים המעודכנים נשלחו לפרסום במאגר התרופות שבאתר משרד הבריאות
<http://www.health.gov.il>
ניתן לקבלם מודפסים על ידי פניה לחברת כצט בע"מ, רח' החרש 4 הוד השרון, 09-7626323

בברכה,
אלון אופיר
רוקח ממונה
כצט תעשיות כימיות בע"מ