

- ١. تحذيرات خاصة تتعلق باستعمال الدواء**
- قبل العلاج بفيريغول أقراص، أخیر الطبيب إذا:
 - كنت تعاني من تلوث أو من ورم.
 - كنت تعاني من نقص فيتامين B12. قد يقوم حمض الفوليك الموجود في هذا الدواء بإيقاف نقص فيتامين B12.
 - تلقيت نفلاً للدم، لوجود خطير نشوء فالرض الحديد نتيجة للتلقيح الجديد إضافي.
 - كنت تعاني من أمراض أخرى أو من أرجحيات.

٢. الفحوصات والمقابلة:

قبل البدء باستعمال الدواء، سيقوم الطبيب بالتحالك إلى إجراء فحص لمستويات الحديد والبيوموجلوبين في الدم. إذا لم تتجه أعراضك عن نقص الحديد فإن يكون الدواء فعالاً بالنسبة لك.

سيجري الطبيب فحوصاً دورية طوال فترة العلاج بهذا الدواء وقد تتلقي أيضًا إجالة منه لإجراء فحوص للدم. هذه الإحالات طبيعية ولا يجرد بها من تلقفك.

٣. التفاعلات بين الأدوية:

إذا كنت تستعمل الأن، أو قد استعملت مؤخرًا أدوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبيب وإضافات غذائية، فأخير الطبيب أو الصيدلي بذلك. خاصةً إذا كنت تستعمل:

مستحضرات الحديد الحقن - لا يوصى باستعمال هذه المستحضرات بالتزامن مع هذه الدواء.

أدوية لعلاج الصرع، خاصةً فينوتونين.

كلور أمفيتيكول - دواء لعلاج اللثارات الجرثومية. سيقوم الطبيب بإجراء متابعة إذا استعملت الدواعين بشكل متزامن.

٤. استعمال الدواء والطعام:

يجب تناول الدواء أثناء وجبة الطعام أو بعدها.

٥. الحمل، الإرضاع والخصوصية:

لم يشأد تأثير سلبي لفيريغول أقراص على الجنين أو على المرأة خلال فترة الحمل.

من غير المعلوم ما إذا كان الحديد يؤثر في حليب الأم.

إذا كنت حاملة، تخططين للحمل أو من رضاعًا، فيجب استشارة الطبيب قبل الاستعمال.

٦. المساعدة واستعمال الماكنتات

لا يوصى بفيريغول أقراص على الفترة على الساقية وأو استعمال الماكنتات. معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء

يحتوي كل قرص من فيريغول على 1.5 ملجم أسيمارتام.

أسيمارتام عبارة عن مصدر لفينيل الالينين وقد يسبب الضغط إذا كنت تعاني من بيلة الفينيل كيتون (اضطراب وراثي نادر يسبب تراكم الفينيل الالينين، لأن الجسم لا يستطيع التخلص منه بشكل سوي).

٣. كيف تستعمل الدواء؟

عليك استشارة الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكون متأكداً من الجرعة الدوائية ومن

كيفية العلاج بالدواء.

نشرة طبية للمستهلك بموجب أنظمة المساعدة (مستحضرات) 1986

يُسوق هذا الدواء بدون وصفة طبية

فيريغول أقراص

يحتوي كل قرص على:

100 ملجم من الحديد (كمعدّ هيدروكسيد الحديد III بولي متلوز) -

4.0 ملجم حمض الفوليك Folic acid 0.4 mg

معلومات العامة المواد غير الفعالة ومستabilants الأرجية في الدواء - انظر البند 6 "معلومات اضافية" والنذر 2 "معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء".

اقرأ النشرة بأمعان حتى نهايتها قبل استعمالك للدواء. تحتوي هذه النشرة على معلومات ملخصة عن الدواء. إذا توفرت لديك أسلمة إضافية، فراجع الطبيب أو الصيدلي.

يجب عليك استعمال الدواء وفقاً للتليميات الواردة في بند الجرعة الدوائية في هذه الشترة.

استشر الصيدلي إذا كنت بحاجة إلى معلومات إضافية.

يتوخج عليك مراجعة الطبيب إذا ثقفت أعراض المرض أو لم تتحسن بعد ثلاثة أيام.

الدواء مخصص عادة للبالغين والأولاد الذين سنهما فوق الـ 12.

١. لأي غرض مخصوص هذا الدواء؟

الدواء مخصص لمنع وعلاج فقر الدم (الأنيميا) الناتج من نقص الحديد ومن نقص حمض الفوليك، بما في ذلك خالل فترة الحمل وفترة الإرضاع.

الفصيلة العلاجية: حديد بالدم مع حمض الفوليك.

إن الحديد مركب ضروري في خلايا الدم الحمراء (البيوموجلوبين)، في الخلايا العضلية (ميوجلوبين)، وفي الإنزيمات التي تحتوي على الحديد. حمض الفوليك

عبارة عن فيتامين مهم لنمو الجنين. قد يسبب نقص حمض الفوليك في أسباب الحمل الأولي عيباً خلقياً لدى الولد.

٢. قبل استعمال الدواء (إذا:

لا يجوز استعمال الدواء (إذا:

كانت لديك حساسية (ارجحة) للمواض الفعالة أو لأيٍ من المركبات الأخرى التي يحتوي عليها الدواء.

كنت تعاني من فائض الحديد في الجسم (متلاً النقص الناجم عن مرض نادر لاختزان الحديد مما قد يؤدي إلى تراكم الحديد في الأنسجة).

كنت تعاني من اضطراب في الاستغلال الفعال للحديد (متلاً عندما ينجم فقر الدم عن الاستغلال غير الفعال للحديد).

كنت تعاني من فقر الدم الذي لا ينجم عن نقص الحديد (مثل فقر الدم الناجم عن ازدياد احتلال البيوموجلوبين أو عن نقص فيتامين B12).



الجرعة الدوائية المتبعة عادة هي:

البالغين والأولاد الذين ستم فرق الما-12:

لمنع فرق الدافع: قرص واحد في اليوم.

لعلاج فرق الدافع: 3 أقراص في اليوم بجرعة دوائية واحدة في اليوم أو بجرعات

مقطمة.

لمنع تجاوز الجرعة الموصى بها

يمكن مضاعف أو بلع القرص باكمله.

كم من الوقت يستمر العلاج عادة؟ يتلقى ذلك مدى نفس الحديد/مضمض الغوليك.

إذا تناولت جرعة مفرطة أو إذا قام ببلع الدواء خطأ، فتوجه فوراً إلى

الطبيب أو إلى غرفة الطوارئ في المستشفى وأصطحب معك عنوة الماء.

قد يتسبب جرعة حمض الغوليك الوائية الأعلى من اللازم تغيرات في الحالة

النفسية، تغيرات في أنماط النوم، هيجوبة وفتر الشاشة، غثيان، انتفاخ البطن

والغازات.

إذا نسبت تناول هذا الدواء في الوقت المحدد، فلا تناول جرعة مضاعفة.

تناول الجرعة التالية في الوقت الافتيداري.

لا يجوز تناول الأدوية في المائة رابع الملحق وتتأكد من الجرعة في كل مرة

تناول فيها دواء. ضع النظارات الطبية إذا كنت بحاجة إليها.

إذا توفرت لديك أسللة إضافية حول استعمال الدواء، فاستشر الطبيب أو

المصيلين.

4. الأعراض الجانبية:

مثل أي دواء، قد يؤدي استعمال فريقول أقراص إلى نشوء أعراض جانبية عند

بعض المستعملين. لا تتفاقم عند قراءة قائمة الأعراض الجانبية. قد لا تتعانى من

أي واحد منها.

أعراض جانبية شائعة جداً (very common) - أعراض ظهر عن أكثر من

مستعمل واحد من بين عشرة:

تتغير في لون البراز ينجم عن إفراز الحديد. هذا العرض غير ضار.

أعراض جانبية شائعة (common) - أعراض ظهر عن 10-1 مستعملين

من بين 100:

غثيان، إمساك، إسهال والآلام في البطن.

أعراض جانبية غير شائعة (uncommon) - أعراض ظهر عن 1-10

مستعملين من بين 10000: تغير في لون الأسنان، التهاب المعدة، حكة، طفح جلدي، تبرق، أحمرار

الجلد، صداع.

أعراض جانبية نادرة (rare) - أعراض ظهر عن 10-1 مستعملين من بين

10000: تقلصات في العضلات وألم في العضلات.

تكون هذه الأعراض عادة مؤقتة.

إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقم أحد الأعراض الجانبية أو إذا عانيت من عرض

جانبي لم يذكر في هذه النشرة، فعليك استشارة الطبيب.

التالي عن الأعراض الجانبية:

بإمكانك التبليغ عن أعراض جانبية لوزارة الصحة بواسطة الضغط على الرابط

"التبليغ عن أعراض جانبية عقب العلاج الدوائي" الموجود في الصفحة الرئيسية

لموقع وزارة الصحة (www.health.gov.il) والذي يوجه إلى الاستماراة

المخصصة للت bliغ عن أعراض جانبية، أو عن طريق الدخول إلى الرابط:

<https://sideeffects.health.gov.il/>

5. كيف يجب تخزين الدواء؟

امنع التسمم هذا الدواء، وكل دواء آخر، يجب حفظه في مكان مغلق بعيداً عن

متناول أيدي الأولاد وأو الأطفال الرضيع ومحال زوتهم، وبذلك تستمتع النسم.

لا تسبّب التسمم بدون تعليمات صريحة من الطبيب.

لا يجوز استعمال الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية (exp. date) المدون على

العنبة. يشير تاريخ انتهاء الصلاحية إلى اليوم الأخير من نفس الشهير.

يجب تخزين في درجة حرارة أقل من 25 درجة مئوية، في مكان مظلم.

6. معلومات إضافية:

بالإضافة إلى المواد الفعالة، يحتوي الدواء أيضاً على:

Dextroes, Polyethylene Glycol 6000, Purified Talc,

Aspartame, Magnesium Stearate, Chocolate Essence

كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العبوة

تحتوي العبوة على 20 أو 30 قرصاً معيناً في لوحيات.

قرص منمر باللون النبيـ الأبيض براـحة الشوكولاتة.

قد لا تـسوق جميع أحـام العـوات.

صاحب الـمتـبارـ المصـنـعـ وـعـونـهـ: كـصـطـلـ الصـنـاعـاتـ الـكـيـمـيـاتـ مـضـ،ـ شـارـعـ

هـذـهـ النـشرـةـ فـحـصـتـ وـأـفـرـقـتـ مـنـ قـبـلـ وزـارـةـ الصـخـةـ فـيـ 2015ـ وـتـحدـيـهاـ

يـمـوجـ بـتـعـلـيمـاتـ وـأـفـرـقـتـ مـنـ قـبـلـ وزـارـةـ الصـخـةـ فـيـ 2020ـ .12ـ .00ـ

رـقـمـ تـسـجـلـ الدـاوـهـ فـيـ سـجـلـ الـدوـيـ الرـسـميـ فـيـ وزـارـةـ الصـخـةـ:

131-01-30647-00 من أجل التيسير ولتسهيل القراءة، تمت صياغة هذه النشرة بصيغة المذكـرـ علىـ الرـغـمـ ذـلـكـ،ـ فـإـنـ الدـاوـهـ مـخـصـصـ لـكـلـ الـجـنـسـينـ.