

עליך להשתמש בתרופה על פי ההוראות בסעיף המינון בעלון זה.

היועץ ברוקח אם הינך זקוק למידע נוסף.

עליך לפנות לרופא במידה ותסמיני המחלה (סימפטומים) מחמירים או שאינם משתפרים לאחר שלושה שבועות.

התרופה מיועדת בדרך כלל למבוגרים ולילדים מעל גיל 12.

1. למה מיועדת התרופה?

התרופה מיועדת למניעה ולטיפול באנמיה הנובעת מחוסר ברזל ומחוסר בחומצה פולית, כולל במהלך הריון ובתקופת ההנקה.

קבוצה תרפויטית: ברזל בשילוב חומצה פולית.

ברזל הינו מרכיב חיוני בתאי הדם האדומים (המוגלובין), בתאי השריר (מיוגלובין) ובאנזימים המכילים ברזל. חומצה פולית הינה ויטמין חשוב להתפחות העובר. מחסור בחומצה פולית בשבועות הראשונים של ההריון עלול להוביל למומים בילד.

2. לפני השימוש בתרופה:

⚠ אין להשתמש בתרופה אם:

- הינך רגיש (אלרגי) לחומרים הפעילים או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה.
- הינך סובל מעודף ברזל בגוף (למשל מחסור הנגרם על ידי מחלה נדירה של אגירת ברזל אשר עלולה להוביל להצטברות של ברזל ברקמות).
- הינך סובל מהפרעה בניצול יעיל של הברזל (למשל כאשר אנמיה נגרמת כתוצאה מניצול לא יעיל של הברזל).
- הינך סובל מאנמיה שלא נגרמה כתוצאה מחוסר ברזל (כגון בוויטמין B12).

⚠ אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה

לפני הטיפול בפריפול טבליות ספר לרופא אם:

- הינך סובל מזיהום או גידול.
- הינך סובל מחוסר בוויטמין B12. החומצה הפולית שבתרופה זו עלולה למסך על חסר בוויטמין B12.
- קיבלת עירויי דם, היות וקיים סיכון לעודף ברזל כתוצאה מקבלת ברזל נוסף.
- הינך סובל ממחלות אחרות או מאלרגיות.

⚠ בדיקות ומעקב:

לפני תחילת השימוש בתרופה, הרופא יפנה אותך לבדיקת רמות ברזל והמוגלובין בדם. אם תסמיניך לא נגרמו בשל מחסור בברזל התרופה לא תהיה יעילה עבורך.

במשך תקופת הטיפול בתרופה זו, הרופא יבצע בדיקות תקופתיות וייתכן גם שתופנה על ידו לבדיקות דם. הפניה זו היא נורמלית ואינה צריכה להדאגך.

⚠ אינטראקציות/תגובות בין תרופתיות:

אם אתה לוקח, או אם לקחת לאחרונה, תרופות אחרות כולל תרופות לגרמם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח.

במיוחד אם אתה לוקח:

- תכשירי ברזל להזרקה - שימוש בתכשירים אלו ביחד עם תרופה זו אינו מומלץ.
- תרופות לטיפול באפילפסיה, במיוחד פניטואין.
- כלורופניקול - תרופה לטיפול בדיהומים חיידקיים. הרופא יבצע מעקב במידה והינך נוטל את שתי התרופות יחד.

⚠ שימוש בתרופה ומזון:

יש ליטול את התרופה במהלך או אחרי ארוחה.

⚠ הריון, הנקה ופוריות:

לא נצפתה השפעה שלילית של פרפילוס טבליות על העובר או על האישה בזמן ההריון.

לא ידוע אם הברזל מופרש בחלב האם.

אם הינך בהריון, מתכננת להיכנס להריון או מניקה, יש להיועץ ברופא לפני השימוש.

⚠ נהיגה ושימוש במכוונת

פרפילוס טבליות אינו משפיע על יכולת הנהיגה ו/או השימוש במכוונת.

⚠ מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה

כל טבליה של פרפילוס מכילה 1.5 מ"ג אספרטם.

אספרטם הינו מקור לפנילאלנין ועלול להזיק אם הינך סובל מפנילקטונוריה (הפרעה תורשתית נדירה הגורמת להצטברות של פנילאלנין, מכיוון שהגוף אינו יכול לסלקו באופן תקין).

3. כיצד תשתמש בתרופה?

עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אינך בטוח בנוגע למינון ואופן הטיפול בתרופה.

המינון המקובל בדרך כלל הוא:

למבוגרים ולילדים מעל גיל 12:

למניעת אנמיה: טבליה אחת ביום.

לטיפול באנמיה: 3 טבליות ביום במינון חד יומי או במנות מחולקות.

אין לעבור על הימנ המומלצת

ניתן ללעוס או לבלוע את הטבליה בשלמותה.

כמה זמן בדרך כלל נמשך הטיפול? תלוי במידת החוסר של הברזל/החומצה הפולית.

אם נטלת מנת יתר או אם בטעות בלע ילד מן התרופה, פנה מיד לרופא או לחדר מיון של בית חולים והבא את אריזת התרופה איתך. מינון גבוה מדי של חומצה פולית עלול לגרום לשינויים במצב הנפשי, בדפוסי שינה, לנרגנות ולהיפראקטיביות, לבחילות, לנפיחות בבטן ולגזים.

אם שכחת ליטול תרופה זו בזמן המיועד, אין ליטול מנה כפולה. קח את המנה הבאה בזמן הרגיל.

אין ליטול תרופות בחושך! בדוק התווית והמנה בכל פעם שהינך נוטל תרופה. הרכב משקפיים אם הינך זקוק להם.

אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היועץ ברופא או ברוקח.

4. תופעות לוואי:

כמו בכל תרופה, השימוש בפריפול טבליות עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשימת תופעות הלוואי. ייתכן ולא תסבול מאף אחת מהן.

תופעות לוואי שכיחות מאוד (very common) - תופעות

שמופיעות ביותר ממשתמש אחד מעשרה:

שינוי בצבע הצואה הנגרם מהפרשת הברזל. התופעה אינה מזיקה.

תופעות לוואי שכיחות (common) - תופעות שמופיעות ב-10-1 משתמשים מתוך 100:

בחילות, עצירות, שלשול וכאבי בטן.

תופעות לוואי שאינן שכיחות (uncommon) - תופעות שמופיעות ב-10-1 משתמשים מתוך 1,000:

הקאות, שינוי בצבע השיניים, דלקת בקיבה, גרד, פריחה, סרפדת, אדמומיות בעור, כאב ראש.

תופעות לוואי נדירות (rare) - תופעות שמופיעות ב-10-1 משתמשים מתוך 10,000:

התכווציות שרירים וכאבי שרירים.

תופעות אלו הן בדרך כלל זמניות.

אם הופיעה תופעת לוואי, אם אחת מתופעות הלוואי מחמירה

או כאשר אתה סובל מתופעת לוואי שלא צוינה בעלון, עליך להתייעץ עם הרופא.

דיווח על תופעות לוואי:

ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי עקב טיפול תרופתי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות (www.health.gov.il) המפנה לטופס המקוון לדיווח על תופעות לוואי, או ע"י כניסה לקישור: https://sideeffects.health.gov.il/

5. איך לאחסן את התרופה?

מנע הרעלה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם וטווח ראייתם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעלה. אל תגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא. אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (exp. date) המופיע על גבי האריזה. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו חודש.

יש לאחסן בטמפרטורה הנמוכה מ-25°C, במקום חשוך.

6. מידע נוסף:

נוסף על החומרים הפעילים, התרופה מכילה גם:

- Dextrates, Polyethylene Glycol 6000, Purified Talc,
- Aspartame, Magnesium Stearate, Chocolate Essence

כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה

- האריזה מכילה 20 או 30 טבליות ארוזות במגשיות.

- טבליה מנומרת בצבע חום-לבן עם ריח שוקולד.

- ייתכן שלא כל גדלי האריזות משווקים.

- בעל הרישום/היצרן וכתובתו:** כצט תעשיות כימיות בע"מ, רחוב הקדמה 3, קרית מלאכי.

עלון זה נבדק ואושר ע"י משרד הבריאות בתאריך 06/2015 ועודכן בהתאם להוראות משרד הבריאות בתאריך 12/2020.

מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד

הבריאות: 00-131-01-30647

לשם הפשטות ולהקלת הקריאה, עלון זה נוסח בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.