

نشرة للمستهلك لمستحضر بيطري
يسوق الدواء بموجب وصفة طبيب بيطري فقط
للاستعمال في الحيوانات فقط

1. اسم الدواء البيطري، شكله ومعياره
درونثال أقراص بيطرية للقطط

2. المواد الفعالة وكميتها في وحدة جرعة :
بيرانتيل ايمبونات (Pyrantel Embonate) - 230 ملغ في القرص
برازيكوانتيل (Praziquantel) - 20 ملغ في القرص

المواد غير الفعالة- كل قرص يحتوي على:
تيتانيوم ديوكسيد 1.8 ملغ.
للقائمة الكاملة بالمواد غير الفعالة أنظر البند 13: "معلومات إضافية".

3. لماذا مخصص الدواء
لعلاج القطط ضد الديدان المدورة والمسطحة.

الفئة العلاجية: مضاد للديدان.
بيرانتيل ايمبونات- مضاد للديدان المدورة
برازيكوانتيل - مضاد للديدان المسطحة

4. موانع الاستعمال
يمنع اعطاء المستحضر سوية مع مستحضرات تحتوي على بيبيرازين (Piperazine).
يمنع استعمال المستحضرات في الجراء التي دون جيل 6 أسابيع.
لا يجوز الاستعمال في الحمل.

5. أعراض جانبية
في حالات نادرة جدا قد تظهر اضطرابات خفيفة وعابرة في جهاز الهضم مثل زيادة افراز اللعاب و/أو التقيؤ، وكذلك
اضطرابات عصبية عابرة مثل الرنح (قلة التوازن في الأطراف).

التبليغ في حال الشك بوجود أعراض جانبية
يمكن التبليغ عن أعراض جانبية لوزارة الصحة من خلال الضغط على الرابط "التبليغ عن أعراض جانبية عقب علاج
دوائي" الموجود في صفحة المنزل التابعة لوزارة الصحة (www.health.gov.il) الذي يوجه للنموذج الانترنتي للتبليغ
عن الأعراض الجانبية، أو من خلال دخول الرابط: <https://sideeffects.health.gov.il>
كذلك، يمكن التبليغ عن أعراض جانبية لشركة ليدور المنتس على عنوان البريد الالكتروني lidorvet@lidorr.com

6. حيوانات الهدف
قطط.

7. جرعة وطريقة الإعطاء
حسب تعليمات الطبيب البيطري. قرص واحد لكل 4 كغم وزن جسم كما هو مفصل فيما يلي:

<u>وزن القط</u>	<u>عدد الأقراص التي أعطيت:</u>
2 كغم	0.5 قرص
4 كغم	1 قرص
6 كغم	1.5 قرص

8. طريقة استعمال المستحضر

للإعطاء مرة واحدة عن طريق الفم. يجب اعطاء القرص مباشرة للحيوان، أو إذا دعت الحاجة، يجب اعطاء القرص سوية مع طعام لاختفاء المذاق.

9. فترة الانتظار

لا صلة.

10. تحذيرات

• تحذيرات خاصة تتعلق باستعمال الدواء في حيوانات الهدف

يعتبر البق مستضيفاً لنوع شائع من الديدان المسطحة - *Dipylidium caninum*. انتقال عدوى الديدان المسطحة هو أمر حتمي إلا إذا تم اتخاذ تدابير للسيطرة على مستوى المستضيفات مثل البق، الفئران والخ.

• تحذيرات خاصة تتعلق بسلامة استعمال الدواء في الحيوانات

لا يوجد.

• تحذيرات خاصة تتعلق بسلامة الشخص الذي يستعمل المستحضر في الحيوانات

بغية الحفاظ على النظافة، على الشخص الذي يعطي القرص للقط مباشرة أو بواسطة اضافة الأقراص لطعام القطط، أن يغسل يديه مباشرة بعد اعطاء الدواء.

• الحمل والارضاع في الحيوانات التي تخضع للعلاج

يمنع استعمال الدواء خلال الحمل ولكن يمكن استعماله خلال الارضاع.

• تفاعلات مع أدوية أخرى، وأنواع أخرى من التفاعلات

يمنع استعمال الدواء سوية مع أدوية تحتوي على مركبات بيبيرازين.

• جرعة زائدة

لا معلومات.

• قلة ملائمة (incompatibilities)

لا صلة.

11. تعليمات التخزين

• امنع التسمم! هذا الدواء وأي دواء آخر يجب أن يحفظ في مكان مغلق بعيداً عن متناول الأطفال و/أو الرضع وبذلك تمنع التسمم.

• لا يجوز استعمال الدواء بعد انتهاء تاريخ الصلاحية (exp. Date) الذي يظهر على العبوة. تاريخ انتهاء الصلاحية يشير إلى اليوم الأخير من الشهر.

• شروط التخزين: يخزن تحت درجة حرارة C 25⁰.

• يمنع اخراج الأقراص من عبوة الصينية حتى تكون هناك حاجة للاستعمال.

• يجب رمي أجزاء القرص الغير مطلوبة.

12. تعليمات بخصوص التخلص من المستحضر/بقايا المستحضر في نهاية الاستعمال

كل ما يتبقى من مستحضر بيطري أو أي نفايات ناجمة عن استعمال مستحضر بيطري يجب أن تتلف على انها نفايات سامة، لا يجوز رميها في المجاري.

13. معلومات إضافية

- إضافة للمواد الفعالة، يحتوي الدواء كذلك على:

Maize starch, Microcrystalline cellulose, Polyvidone,
Methylhydroxypropylcellulose, Polyethylene glycol 4000, Titanium dioxide,
Magnesium stearate, Colloidal anhydrous silica.

- كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العبوة:
قرص مطلي مع شق بلون أبيض-يميل إلى الأصفر. يمكن شطر القرص لأنصاف متساوية.
تحتوي العبوات على 2، 4، 6، 8، 20، 24، 96، 100 أو 144 قرصاً، مغلفة في عبوات.
قد لا تسوق كل أحجام العبوات.

- صاحب التسجيل وعنوانه:
ليدور المنتس م.ض
شارع هنفينيم 63، المنطقة الصناعة مورشا، رمات هشارون.

- اسم المنتج وعنوانه:

Bayer Animal Health GmbH
LEVERKUSEN, GERMANY 51368-D

- رقم تسجيل الدواء في سجل المستحضرات الحكومي في وزارة الصحة:

083-22-92224-00

حررت النشرة في كانون الأول 2020