

דצמבר 2020

רופא/ה, רוקח/ת נכבד/ה,

הנדון: עדכון עלון לצרcn של התכשיר **MERFEN SPRAY FIRST AID**

מרכיב פעיל:

Benzoxonium chloride	1 mg/ml
Chlorhexidine gluconate	5 mg/ml

Solution, Dermal

צורת מינון ומתקן:

התויה מאושרת:

To disinfect wounds and injuries, such as cuts, scratches, mild burns and insect stings.

חברת מדיטrnd שיווק בע"מ מבקשת להודיעיכם על העדכנים הבאים בעלון לצרcn של התכשיר. בהודעה זו מציינים השינויים המהווים החמרה בלבד, והם מסומנים בקו תחתית.

2. לפני שימוש בתרופה:

אין להשתמש בתרופה:

אם אתה רגיש (אלרגי) לחומרים הפעילים (בנזוקסוניום קלוריד ו- קלורהקסידין גלוקונאט), או لتרכובות אמוניום רביעניות או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה (ראה סעיף 6).

אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה
לפני הטיפול במר芬 ספרי לעזרה ראשונה, ספר לרופא או לרוקח אם:

- אתה סובל ממחלות אחרות
- יש לך אלרגיה כלשהי
- אתה נוטל תרופות אחרות ככלשן או משתמש בתרופות לשימוש חיצוני (כולל תרופות ללא מרשם)

פנה לרופא:

- אם יש לך פצעים מזוהמים או עמוקים מאד הפרושים על פני שטח גדול, נשיכות או פצעי דקירה - נדרש טיפול רפואי (בגלא סיכנים הכלולים בטנו).
- אם גודל הפגיעה אינו קטן או שהפצע אינו נרפא לאחר 14-10 ימים. כמו כן, אם השולטים של הפגיעה אדומים מאוד, הפגיעה מתנפח באופן פתאומי, כאב מאוד או שהפצעה מלאה בחום (בגלא סיכון לחיותם בדם).
• אם אתה זקוק לטיפול בפציעות או כוויות המכוסות שטח גדול.

ażhorot nospotot:

- יש להימנע מגע עם העיניים, האוזניים (תעלת השמע) וركמות ריריות (כגון הפה והאף). אם בטעות מרפן ספרי לעזרה ראשונה נכנס לעיניים, יש לשטוף אותן מיד עם כמות גודלה של מים.
- אין להשתמש בתרופה זו לעתים קרובות או לתקופה ממושכת מבליל להיעוץ רפואי.
- הפסיק את השימוש במרפן ספרי לעזרה ראשונה אם הינך מבחין בגירוי בעור או רגשות חריגות.**

תינוקות ופגימות:

נדרשת זהירות בשימוש בתרופה בתינוקות ובמיוחד בפגימות. מרפן ספרי לעזרה ראשונה יכול לאגרום כויות כימיות בעור.

הריאן והנקה:

הריין: אין נתונים מספקים בנוגע לשימוש ב- בנזוקסוניום קלורייד - קלורהקסידין גליקונאט בנים בהריין. ניתן להשתמש בכמות קטנות של תרופה (על פצעים קטנים) במהלך הריאן. הסיכון הפוטנציאלי לבני אדם אינו ידוע. למרות זאת, ההנחה היא כי הסיכון נמוך מאוד היוות וכמות קטנות בלבד של בנזוקסוניום קלורייד - קלורהקסידין גליקונאט לאחר שימוש מקומי. יש להיעוץ רפואי במידה ואת רצוחה להשתמש בתרופה במהלך ההריין, במיוחד במהלך החודשים הראשונים.

הנקה: אין מידע בנוגע להפרשת בנזוקסוניום קלורייד - קלורהקסידין גליקונאט בחלב אם. ניתן להשתמש בכמות קטנות של התכשיר (על פצעים קטנים) במהלך ההנקה, אולם אין להשתמש על החזה. כאמצעי זהירות כללי, מומלץ לשטוף את הפטמות בייסדיות עם מים לפני הנקה.

3. כיצד תשתמש בתרופה?

... מרפן ספרי לעזרה ראשונה מיועד לשימוש על העור בלבד.

... יש לוודא שמרפן תרסיס לעזרה ראשונה אינו מצטרב בקפל עור. יש לאפשר לעור להתיבש לאחר החיטוי, לפני שימוש בתחבושת קלה. אין להשתמש במרפן ספרי לעזרה ראשונה מתחת לחבישה הדוקה על מנת למנוע גירוי בעור.

4. תופעות לוואי:

תופעות לוואי נדירות מאוד (תופעות שמויפות לפחות מעתה אחד מתוך 10,000), אך אפשרות להיוות חמורות:

קשה נשימה, סחרחות (תגובה אנפיפילקטית), נפיחות של הפנים והגרון (אנגיאו אדמה). יש להפסיק את השימוש בתרופה ולפנות מיד לרופא אם אתה מבixon באחד מהתסמינים שמצוינו לעליה (שעלולים להיות סימנים של תגובה אלרגית).

תופעות לוואי שכיחותן אינה ידועה (תופעות שכיחותן טרם נקבעה):

כויות כימיות בתינוקות

העלון המאושר נשלח לפרסום במאגר התרופות שבאתר משרד הבריאות www.health.gov.il וניתן לקבלו מודפס על ידי פניה לבעל הרישום, מדיטренд שיוק (2004) בע"מ.

בברכה,
מדיטrends שיוק (2004) בע"מ.