

كليكسان

- محلول للحقن ضمن محقنة جاهزة للإستعمال ذات نظام أمان
20 ملغ (2,000 وحدة)
40 ملغ (4,000 وحدة)
60 ملغ (6,000 وحدة)
80 ملغ (8,000 وحدة)
100 ملغ (10,000 وحدة)

SANOPI

المادة الفعالة وكميتها:

تحتوي كل محقنة على التوالي على:
إينوكساپارين صوديوم
Enoxaparin Sodium 20 mg, 40 mg, 60 mg, 80 mg, 100 mg.

- المواد غير الفعالة، أنظر الفقرة 6.
إقرأ النشرة يتمعن حتى نهايتها قبل إستعمالك للدواء.
إحفظ هذه النشرة. من الجائز أن تحتاج لقراءتها ثانية.
تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء. إذا توفرت لديك أسئلة إضافية، راجع الطبيب أو الصيدلي.
وصف هذا الدواء للعلاج من أجله. لا تعطيه للأخرين فهو قد يضرهم حتى ولو بدا لك أن حالتهم الطبية مشابهة لحالتك.
إذا تقام عرض جانبي أو إذا ظهر عرض جانبي لم يذكر في هذه النشرة، الرجاء راجع الطبيب أو الصيدلي.

1) لأي غرض مخصص للدواء؟

يستعمل هذا الدواء لدى الكبار لـ:

- معالجة الخثرات الدموية التي تشكلت في دمك
- منع تشكل خثرات دموية في دمك في الحالات التالية:
 - قبل وبعد عملية جراحية
 - عندما تكون مريضاً بمرض يمنعك من الحركة أو تقيد حركتك لفترة معينة
- منع تشكل خثرات دموية عندما تعاني من ذبحة صدرية (angina) غير مستقرة (حالة لا يصل فيها ما يكفي من الدم إلى القلب) أو بعد نوبة قلبية
- منع تشكل خثرات دموية في أنابيب جهاز الديليزة (يستعمل لدى الأشخاص الذين يعانون من مشاكل شديدة في الكلية).

الفصيلة العلاجية:

يحتوي الدواء على مادة فعالة تسمى إينوكساپارين صوديوم وتنتمي لفصيلة الأدوية السمماة «الهيبارين ذو وزن جزئي منخفض» أو LMWH.

يعمل الدواء بطريقتين:

1. منع خثرات دموية حالية أو تصبح أكبر، الأمر الذي يساعد الجسم على تفكيكها ومنعها من إلحاق الضرر بك.
2. منع تشكل خثرات دموية جديدة في دمك.

2) قبل إستعمال الدواء:

متى لا يجوز إستعمال الدواء؟

- إذا كنت حساساً (الرجي) لـ:
 - إينوكساپارين صوديوم أو لكل واحد من المركبات الإضافية التي يحتويها الدواء (أنظر الفقرة 6).
 - الهيبارين أو مستحضرات أخرى للهيبارين ذات وزن جزئي منخفض مثل نادروپارين، تينزلاپارين أو دالتياپارين.
- علامات لرد فعل تحسسي تشمل: طفح، صعوبات في البلع أو التنفس، إنتفاخ في الوجه، في الشفتين، في اللسان، في تجويف الفم، في الحنجرة أو في العينين.
- إذا وجد لديك رد فعل للهيبارين أدى لإنخفاض حاد في عدد الصفائح الدموية لديك، خلال الـ 100 يوم الأخيرة.
- إذا وجد لديك أجسام مضادة لـ إينوكساپارين في دمك.
- إذا كنت تعاني من نزف شديد أو كنت في حالة تنطوي على خطورة زائدة لنزف، مثل قرحة معدية، عملية جراحية في الدماغ أو في العينين في الآونة الأخيرة أو سكتة على خلفية نزف حدثت مؤخراً.
- إذا كنت تستعمل كليكسان من أجل علاج الخثرات الدموية في جسمك وأنت مقدماً في غضون 24 ساعة على إجتياز:
 - بزل (وخز) في النخاع الشوكي أو بزل (وخز) قطني
 - عملية جراحية تتضمن تخدير فوق الجافية (epidural) أو نخاعي

لا يجوز إستعمال كليكسان إذا كان ينطبق عليك إحدى ما ذكر أعلاه. عليك التحدث مع الطبيب أو الصيدلي الخاص بك قبل الإستعمال إذا لم تكن واثقاً.

تحذيرات خاصة تتعلق بإستعمال الدواء:

لا يجوز التبديل بين كليكسان وبين مستحضرات أخرى تنتمي لفصيلة «الهيبارين ذو وزن جزئي منخفض» مثل نادروپارين، تينزلاپارين أو دالتياپارين. هذا لأنها غير متطابقة وليس لديها بالضبط نفس العمل ونفس تعليمات الإستعمال. قبل العلاج بالدواء إحك للطبيب إذا:

- وجد لديك ذات مرة رد فعل لـ هيبارين الذي أدى إلى إنخفاض حاد في عدد الصفائح الدموية لديك
- تم تركيب لديك صمام في القلب
- يوجد لديك التهاب الشغاف (التهاب غشاء القلب الداخلي)
- يوجد لديك سابقة لقرحة معدية
- عانيت من سكتة مؤخرًا
- كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم
- كنت تعاني من السكري أو مشاكل في الأوعية الدموية في العينين نتيجة السكري (مرض يسمى إعتلال الشبكية السكري)
- إجرت مؤخرًا عملية جراحية في العينين أو الدماغ
- كنت مسنًا (فوق عمر 65 سنة) وخاصة إذا تجاوزت عمر 75 سنة
- يوجد لديك مشاكل في الكلى
- يوجد لديك مشاكل في الكبد
- كنت تعاني من نقص الوزن أو زيادة في الوزن
- يوجد لديك نسب مرتفعة لليوتاسيوم في الدم (بالإمكان رؤية ذلك في فحوص الدم)

أنت تستعمل حالياً أدوية تؤثر على النزف (أنظر في سياق الفقرة حول تفاعلات بين الأدوية).

كنت تعاني من مشكلة في العمود الفقري أو أنك قد إجرت عملية جراحية في القناة الشوكية (epidural) (نخاعي).

إذا كان ينطبق عليك إحدى ما ذكر أعلاه (أو إذا لم تكن واثقاً)، تحدث مع الطبيب أو الصيدلي الخاص بك قبل إستعمال كليكسان.

بالنسبة للمرضى الذين يتلقون مقادير دورانية أكثر من 210 ملغ في اليوم، يحتوي هذا الدواء على أكثر من 24 ملغ من الصوديوم (المركب الأساسي في ملح الطبخ / الطعام) في كل مقدار دوراني. هذا يعادل 1.2% من الإستهلاك الأقصى اليومي الموصى به من الصوديوم للبالغ.

الفحوص والمتابعة

من الجائز أن تجري فحص دم قبل أن تبدأ إستعمال هذا الدواء وبغواصل زمنية مختلفة خلال فترة إستعمالك للدواء، وهذا من أجل فحص نسبة خلايا الخثر (الصفائح الدموية) واليوتاسيوم في دمك.

الإستعمال لدى الأطفال والمراهقين

لم تفحص سلامة وفعالية كليكسان لدى الأطفال أو المراهقين.

التداخلات/التفاعلات بين الأدوية

إذا كنت تستعمل، أو إذا إستعملت مؤخراً، أدوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبية وإضافات غذائية، إحك للطبيب أو الصيدلي عن ذلك. بالأخص إذا كنت تستعمل:

- وارفارين - دواء لتمييع الدم
- أسبيرين (يعرف أيضاً كحمض الأسيتيل ساليسيليك أو ASA)، كلويدوجريل أو أدوية أخرى المستعملة لمنع تشكل خثرات دموية (أنظر الفقرة 3 - تغيير في دواء مضاد للتخثر)
- حقن ديكستران - يستعمل كبدل للدم
- إيپوروفين، ديكلوفيناك، كيتورولاك أو أدوية أخرى تعرف كأدوية مضادة للالتهاب، ليست ستيررويدية والتي تستعمل لعلاج الألم والإنتفاخ في التهاب المفاصل وحالات أخرى
- پريدنيزولون، ديكساميثازون أو أدوية أخرى لعلاج الربو، التهاب المفاصل الروماتيزمي وحالات أخرى
- أدوية التي ترفع نسب اليوتاسيوم في دمك مثل أملاح اليوتاسيوم، مدرات بولية وأدوية معينة لمشاكل القلب

العمليات الجراحية والتخدير

إحك لطبيبك أنك تستعمل كليكسان، إذا كنت مقدماً على إجراء بزل (وخز) نخاعي أو بزل قطني أو عملية جراحية توجب التخدير فوق الجافية (epidural) أو نخاعي.

الحمل، الإرضاع والخصوبة

إذا كنت في فترة الحمل، تعتقدن أنك حامل أو تخططين للحمل، إستشيري الطبيب أو الصيدلي قبل إستعمال هذا الدواء.

إذا كنت في فترة الحمل ويوجد لديك صمام قلبي إصطناعي، فأنت قد تكونين معرضة لخطورة زائدة لتطوير خثرات دموية. يتوجب على الطبيب التحدث معك بهذا الشأن.

إذا كنت مرضعة أو تنوين الإرضاع، فعليك إستشارة الطبيب قبل إستعمال هذا الدواء.

السياقة وإستعمال الماكينات

لا يؤثر كليكسان على قدرتك على السياقة أو إستعمال الماكينات.

يوصى بتدوين الإسم التجاري ورقم دفعة المستحضر الذي تستعمله من قبل الطاقم الطبي الخاص بك.

3) كيفية إستعمال الدواء؟

يجب الإستعمال دائماً حسب تعليمات الطبيب. عليك إستشارة الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكن واثقاً.

- عندما تكون في المستشفى، عادة من يعطي لك الدواء هم الطبيب أو الممرضة، نظراً لأنه يعطى عن طريق الحقن. عند وصولك إلى البيت من الجائز أن تحتاج مواصلة حقن كليكسان بنفسك (أنظر تعليمات الحقن في السياق).
- يعطي كليكسان عادة بالحقن تحت الجلد.
- يمكن إعطاء كليكسان بالحقن في الوريد (عن طريق الوريد) بعد أنواع مختلفة من النوبات القلبية أو العمليات الجراحية.
- يمكن إضافة الدواء للأنبوبة الخارجة من الجسم (خط شرياني) في بداية الديليزة.
- لا يجوز حقن كليكسان لداخل العضل.

المقدار الدوائي

المقدار الدوائي وطريقة العلاج يحددان من قبل الطبيب فقط. يتعلق المقدار الدوائي بالسبب الذي من أجله تستعمل الدواء.

إذا كنت تعاني من مشاكل في الكلى، فمن الجائز أن تحتاج مقداراً دوائياً أخفض من الدواء.

لا يجوز تجاوز المقدار الدوائي الموصى به.

الحقن الذاتي لـ كليكسان

إذا كنت قادراً على حقن الدواء بشكل ذاتي، سيرشدك الطبيب أو الممرضة كيفية فعل ذلك. لا تحاول حقن نفسك إذا لم تتلقى إرشاداً كيفية فعل ذلك. توجه حالا للطبيب أو للممرضة إذا لم تكن واثقاً ما عليك فعله. إن إجراء الحقن كما هو مطلوب تحت إشراف الطبيب أو الممرضة على تقليل الألم والكدمات في منطقة الحقن.


قبل الحقن

- حضر الأعراض التي أنت بحاجة إليها: محقنة، ضمادة كحولية أو ماء وصابون، ووعاء لجمع الأشياء الحادة.
- تأكد من تاريخ إنتضاء الصلاحية المدوّن على الدواء. لا تستعمله إذا إنتقض تاريخ الصلاحية.
- تأكد من عدم تضرر المحقنة وأن الدواء بداخلها هو محلول رائق. إذا لم يكن كذلك، إستعمل محقنة أخرى من الدواء.
- تأكد من كونك تعرف كم يتوجب عليك حقنه.
- إخص بطنك لرؤية إذا ما سببت الحقنة السابقة إحمراراً، تغيير بلون الجلد، إنتفاخ، إفراز عن طريق الجلد، أو ما زال هناك شعور بألم، إذا حصل ذلك، راجع الطبيب أو الممرضة.

تعليمات للحقن الذاتي:


تحضير موقع الحقن

1. إختار منطقة بأحد جانبي بطنك الأيمن أو الأيسر. يجب أن يكون على بعد 5 سم على الأقل من السرة وابتجاة جانبي الجسم.
- لا تحقن لنفسك نطقاً 5 سم من السرة أو من حول ندبات أو كدمات حالية.
- يجب تغيير مكان الحقن بين جانبي البطن من اليمين إلى اليسار، كأمراً يتعلق بالمنطقة الذي حقنت فيها، في المرة السابقة.
2. إغسل يديك. نظف بلطف (لا تفرك)
3. إجلس أو استلق بوضعية مريحة بحيث تكون مسترخياً. تأكد من أنك ترى منطقتي الحقن المخصصة. سيكون من المناسب إستعمال كرسي بذراعين أو سرير مبطن بوسادة.



إختيار المقدار الدوائي الخاص بك


1. إنزع بحدز غطاء الإبرة من المحقنة وارمه.
2. لا تضغط على المكبس قبل الحقن لتخلص من فقاعات الهواء. هذه العملية ممكن أن تؤدي لفقدان بعض الدواء.
3. بعد نزع الغطاء تأكد من عدم ملامسة الإبرة لأي شيء. وذلك للحفاظ على نظافتها (مقمنة).



2. عندما تكون كمية الدواء في المحقنة ملائمة للمقدار الدوائي المخصص، فلا حاجة في ملاءمة المقدار الدوائي. أنت جاهز للحقن.
3. عندما يتعلق المقدار الدوائي بوزن جسمك، من الجائز أنه يتوجب عليك ملاءمة المقدار الدوائي في المحقنة ليلتزم المقدار الدوائي المخصص. في هذه الحالة، تستطيع أن تتخلص من كمية الدواء الزائدة عن طريق إمساك المحقنة وهي موجهة نحو الأسفل (لحفظا على فقاعة الهواء داخل المحقنة) وإخراج الكمية الزائدة لداخل الوعاء.
4. قد تظهر قطرة في طرف المحقنة، إذا حدث هذا، أزل القطرة قبل الحقن بواسطة الطرق على المحقنة بحيث تكون الإبرة موجهة نحو الأسفل. الآن أنت جاهز للحقن.

عملية الحقن

1. إمسك المحقنة باليد التي تكتب بها (الكالم). وباليد الثانية أقرص بلطف طية الجلد التي تم تنظيفها في مكان الحقن في بطنك، وذلك بواسطة الإبهام والسبابة من أجل تشكيل طية الجلد.
2. تأكد من مسك لطية الجلد طيلة عملية الحقن.



3. إمسك المحقنة بحيث تتجه الإبرة نحو الأسفل (بشكل عمودي بزواوية 90 درجة). أدخل كامل طول الإبرة لداخل طية الجلد. إمسك على المكبس نحو الأسفل بواسطة الإبهام. بحيث يدخل الدواء إلى السنجع الهنئي للبطن. أكل الحقن باستعمال كل الدواء الموجود في المحقنة.
4. أخرج الإبرة من موقع الحقن بسحبها بشكل مستقيم إلى الخارج. سيغطي الغطاء الواقعي الإبرة بشكل الآن. بالإمكان الآن تحرير طية الجلد. إن نظام الأمان يحذر غطاء الأمان فقط بعد إفراغ المحقنة بواسطة ضغط المكبس حتى الأسفل.

بعد أن إنتهيت

1. لمنع حدوث كدمات، لا يجوز فرك مكان الحقن بعد الحقن.
2. إرم المحقنة المستعملة مع الغطاء الواقعي لوعاء لجمع الأشياء الحادة. أغلق غطاء الوعاء ووضعه بعيدا عن متناول أيدي الأطفال. عندما يمتلئ الوعاء، تخلص منه حسب تعليمات الطبيب الصيدلي.

تغيير دواء مضاد للتخثر:

- **تغيير من كليسان لمميعات دم تسمى مناهضات فيتامين K (antagonist) (مثلا وارفارين)**
يطلب منك الطبيب إجراء فحوص دم تسمى INR ووفقاً لذلك يخبرك متى عليك التوقف عن حقن كليسان بما يتناسب.
- **تغيير من ممييعات دم تسمى مناهضات فيتامين K (مثلاً وارفارين) لـ كليسان**
توقف عن تلقي مناهضات فيتامين K. يطلب منك الطبيب إجراء فحوص دم تسمى INR ووفقاً لذلك يخبرك متى عليك البدء في حقن كليسان بما يتناسب.
- **تغيير من كليسان لعلاج مضاد التخثر الفموي المباشر**
توقف عن إستعمال كليسان. إبدأ تناول مضاد التخثر الفموي المباشر 0 حتى 2 ساعة قبل الموعد الذي من المفترض أن تتلقى فيه الحقنة القادمة، وبعد ذلك إستمر كالمعتاد.

- **تغيير من علاج مضاد التخثر الفموي المباشر لـ كليسان**
توقف عن تناول مضاد التخثر الفموي المباشر. لا تبدأ العلاج بـ كليسان قبل مرور 12 ساعة من الجرعة الدوائية الأخيرة من مضاد التخثر الفموي المباشر.

إذا حقنت بالخطأ مقدراً دوائياً أكبر من المطلوب:

إذا كنت تظن بأنك إستعملت أكثر أو أقل مما ينبغي من كليسان، إستشر الطبيب، المرصدة أو الصيدلي الخاص بك حالا، حتى ولو لم تكن تقاسي من أعراض شاذة. إذا حقن طفلاً أو بلع بالخطأ من الدواء، خذ فوراً إلى غرفة الطوارئ في المستشفى.

إذا نسيت حقن الدواء

إذا نسيت حقن كليسان في الوقت المطلوب، يتوجب عليك حقن مقدراً دوائياً حال تذكرك.

لا تحقن مقدراً دوائياً مضاعفاً بنفس اليوم كتعويض عن المقدار الدوائي المنسي. إن التسجيل في المذكرة اليومية يساعدك في التأكد من عدم نسيانك لمقدار دوائي.

في حال توقفت عن إستعمال الدواء

من المهم مواصلة الحقن إلى أن يقرر طبيبك بوقفها. في حال توقفت عن العلاج فأنت قد تطور حدوث خثرة دموية والتي قد تكون خطيرة جداً.

لا يجوز إستعمال أدوية في العتمة! يجب تشخيص طابع الدواء والتأكد من المقدار الدوائي في كل مرة تستعمل فيها دواء. ضع العنظرات الطبية إذا لزم الأمر ذلك.

إذا توفرت لديك أسئلة إضافية حول إستعمال هذا الدواء، إستشر الطبيب، الصيدلي أو المرصدة.

4) الأعراض الجانبية

كما بكل دواء، إن إستعمال كليسان قد يسبب أعراضاً جانبية عند بعض المستعملين.
لا تندم من قائمة الأعراض الجانبية. من الجائز ألا تعاني أياً منها.

أعراض جانبية خطيرة:

توقف عن إستعمال الدواء وتوجه حالاً للطبيب أو للمرصدة إذا وجدت لديك علامات ارد، فعل تحسسي خطير (مثل طفح، صعوبات في التنفس أو البلع، إنتفاخ في الوجه، في الشفتين، في اللسان، في تجويف الفم، في الحنجرة أو في العينين).

كما هو في أدوية شبيهة أخرى المخصصة لتقليل الخثرات الدموية، فإن كليسان من شأنه أن يسبب لنزف. قد يشكل هذا خطراً على الحياة. قد يكون النزف غامضاً في حالات معينة.

تحدث حالاً مع الطبيب إذا:

- كنت تعاني من نزف لا يتوقف من تلقاء نفسه.
- وجدت لديك علامات لنزف مفرط مثل ضعف شديد، إرهاق، شحوب، دوام يترافق بصداق أو إنتفاخ غير مبرر.
- من شأن الطبيب أن يقرر إبقاءك تحت المراقبة الحثيئة أو تغيير دواءك.

عليك إبلاغ الطبيب حالا إذا:

- وجدت لديك علامات لإنسداد وعاء دموي من قبل خثرة دموية مثل:
 - ألم تشنجي، إحمرار، الشعور بشف أو إنتفاخ بإحدى رجليك - هذه علامات خثار الأوردة العميقة.
 - ضيق التنفس، ألم في الصدر، إغماء أو سعال دموي - هذه علامات إنصمام رئوي.

● تعاني من طفح مؤلم أو بقع حمراء غامقة تحت الجلد، والتي لا تزول عند الضغط عليها.
● من الجائز أن يطلب منك الطبيب إجراء فحص دم لفحص تعداد الصفيحات الدموية لديك.

أعراض جانبية أخرى:

- شائع جداً (من شأنه أن يؤثر على أكثر من 1 من كل 10 أشخاص)
● نزف
- إرتقاع بإنزيمات الكبد

● شائع (من شأنه أن يؤثر على حتى 1 من بين 10 أشخاص)
● تصاب بجرح بسهولة أكثر من المعتاد. يمكن أن يكون هذا نتيجة مشكلة في الدم جراء إنخفاض تعداد الصفيحات الدموية- ظهور مناطق زهرية على جلدك. من المرجح أن تظهر هذه في المناطق التي حقنت فيها كليسان
- طفح جلدي (شرى، urticaria)
- جلد أحمر وحك
- كدمات أو آلم في منطقة الحقن
- إنخفاض في تعداد خلايا الدم الحمراء

- إرتقاع نسبة الصفيحات الدموية في الدم

صداق

غير شائع (من شأنه أن يؤثر على حتى 1 من بين 100 شخص)

- صداع شديد ومفاجئ. قد يكون هذا علامة لنزف في الدماغ
- شعور لحساسية وإنتفاخ في بطنك. من الجائز حدوث نزف في المعدة لديك
- آفات حمراء كبيرة ذات شكل غير عادي في الجلد، مع أو بدون حويصلات
- تهيج في الجلد (تهيج موضعي)
- إصفرار الجلد أو العينين لديك، يصبح بولك داكناً أكثر. هذا يمكن أن يكون مشكلة في الكبد

● نادر (من شأنه أن يؤثر على حتى 1 من بين 1,000 شخص)

- رد فعل تحسسي خطير. العلامات قد تشمل: طفح، مشاكل في البلع أو التنفس، إنتفاخ في الشفتين، في الوجه، في الحنجرة أو في اللسان.
- إرتقاع البوتاسيوم في دمك - من المرجح أن تحدث أكثر لدى أشخاص يعانون من مشاكل في الكلى أو السكري. يستطيع طبيبك التحقق من ذلك عن طريق إجراء فحص دم.

● إرتقاع عدد الحمضات في دمك. يستطيع طبيبك التحقق من ذلك عن طريق إجراء فحص دم.

تساقط الشعر.

● كثالة العظام (حالة تزداد فيها احتمالية تعرض عظامك للكسر) بعد إستعمال طويل المدى.

● وخز، خدر وضعف عضلي (خصوصاً في الجزء السفلى من جسمك) بعد إجتيارزك لوزل (لوزخ) أو تخدير نخاعي.

● فقدان السيطرة على المصراة (لا يمكنك التحكم في الحاجة للذهاب إلى الحمام).

● كثالة صلبة في مكان الحقن

إذا تفاقمت إحدى الأعراض الجانبية أو إستمرت لأكثر من بضعة أيام أو عندما تعاني من عرض جانبي لم يذكر في هذه النشرة، عليك إستشارة الطبيب.

بالإمكان التبليغ عن أعراض جانبية لوزارة الصحة بواسطة الضغط على الرابط «تبلغ عن أعراض جانبية عقب علاج دوائي» الموجود على الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة (www.health.gov.il) الذي يوجهك إلى النموذج المباشر للتبليغ عن أعراض جانبية، أو عن طريق تصفح الرابط: <https://sideeffects.health.gov.il/>

5) كيفية تخزين الدواء؟

تجنب التسمم! يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء آخر في مكان مغلق بعيداً عن متناول أيدي الأطفال و/أو الرضع، وذلك لتفادي إصابتهم بالتسمم.

لا تسبب التقيؤ بدون تعليمات صريحة من الطبيب.

لا يجوز إستعمال الدواء بعد إنتقضاء تاريخ الصلاحية (exp.date) الذي يظهر على ظهر العبوة. يشير تاريخ الصلاحية إلى اليوم الأخير من نفس الشهر. لا يجوز التخزين في درجة حرارة تزيد عن 25 درجة مئوية، لا يجوز التخزين في البراد أو حجرة التجميد.

6) معلومات إضافية

يحتوي الدواء بالإضافة للمادة الفعالة أيضاً على ماء للحقن.

كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العبوة:

كليسان هو محلول رائق، الموجود ضمن محاقن جاهزة للإستعمال مع إبرة وغطاء واقعي.

كل عبوة تحتوي على محقنتين إثنين.

لا تحتوي هذه النشرة على كافة المعلومات عن المستحضر. إذا توفرت لديك أية أسئلة وإذا لم تكن واثقاً من شيء ما، الرجاء مراجعة الطبيب.

صاحب الإمتياز وعنوانه:

سانوفي-أفنتيس إسرائيل م.ص، بني جازون 10 نتانيا 4250499

المنتج:

سانوفي وينتروپ للصناعات، فرنسا

رقم سجل الدواء في سجل الأدوية الحكومي في وزارة الصحة:

كليسان: 467726037

من أجل سهولة وتهوين القراءة، تمت صياغة هذه النشرة بصيغة المذكر. على الرغم من ذلك، فإن الدواء مخصص لكلا الجنسين.

تم إعدادهما في أيلول 2020.